

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovirax 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension

aciclovir

01-2024
P48886A-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax
3. Sådan skal du tage Zovirax
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovirax er et middel mod herpesvirus, som virker ved at hæmme formering af virus.

Zovirax anvendes til behandling af *herpes simplex* infektioner i hud og slimhinder (med undtagelse af nyfødte og svær *herpes simplex* infektion hos børn med nedsat immunforsvar), samt til forebyggelse og behandling af gentagne udbrud af herpes i ansigtet, på munden (*herpes labialis*) eller på kønsorganerne (*herpes genitalis*).

Zovirax kan desuden anvendes mod helvedesild (*herpes zoster*) og skoldkopper (*herpes varicella*).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Zovirax:

- hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovirax (angivet i afsnit 6)
- hvis du er allergisk over for valaciclovir.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zovirax:

- hvis du har nedsat nyrefunktion
- hvis du er over 65 år, da du derfor har større risiko for at have nedsat nyrefunktion
- hvis du får høj dosis. Sørg for at drikke rigelig med væske under behandlingen
- hvis du har stærkt nedsat immunforsvar. Kontakt lægen inden opstart af behandling mod infektion.

Hvis du tager Zovirax mod helvedesild, skoldkopper eller *herpes simplex*, skal du starte behandlingen hurtigst muligt efter første tegn på udbrud.

Langvarig eller gentagen behandling med aciclovir hos patienter med nedsat immunforsvar kan resultere i, at nogle virusstammer får nedsat følsomhed og som følge deraf ikke kan behandles med Zovirax.

Brug af andre lægemidler sammen med Zovirax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Tal med lægen, hvis du bruger lægemidlet mod:

- urinsyreigt (probenecid)
- for meget mavesyre (cimetidin)
- astma eller KOL (theophyllin)
- afstødning af organer efter transplantation (mycophenolatmofetil).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax påvirker som regel ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Nogle bivirkninger, såsom træthed og svimmelhed, kan dog have indflydelse på din koncentrations- og reaktionsevne. Sørg for, at du ikke er påvirket af sådanne bivirkninger, når du skal færdes i trafikken eller betjene maskiner.

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som begge kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Zovirax indeholder sorbitol (E420)

Dette lægemiddel indeholder 1575 mg sorbitol pr. 5 ml oral opløsning.

Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis din læge har fortalt dig at du (eller dit barn) har intolerance over for nogle sukkerarter eller hvis du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan nedbryde fructose, skal du tale med din læge før du (eller dit barn) tager eller får dette lægemiddel.

Sorbitol kan medføre gastrointestinale ubehag og en mild afførende virkning.

Zovirax indeholder benzylalkohol

Zovirax 80 mg/ml oral suspension indeholder mindre end 1 mg benzylalkohol pr. 5 ml oral opløsning.

Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner.

Benzylalkohol er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger inklusive åndedrætsbesvær (kaldet "gasping syndrome") hos små børn.

Giv ikke til dit nyfødte barn (op til 4 uger), medmindre det anbefales af din læge.

Må ikke anvendes til børn (under 3 år) i mere end én uge uden lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er gravid eller ammer. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose").

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du har en lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose").

Zovirax indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 5 ml oral suspension, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du tage Zovirax

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den orale suspension (mikstur) skal omrystes grundigt før brug.

Måleske er vedlagt i pakningen.

Behandling af helvedesild skal påbegyndes ved første tegn på udbrud og senest 3 døgn efter første tegn.

Den anbefalede dosis er

Hvis du får oral suspension 40 mg/ml

Voksne

Helvedesild og skoldkopper: 20 ml (800 mg) 5 gange dagligt i 7 dage.

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 5 ml (200 mg) 5 gange dagligt i 5 dage.

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 20 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 5 ml (200 mg) 4 gange dagligt.

Børn

Behandling af herpesudbrud:

2 - 14 år: 5 ml (200 mg) 5 gange dagligt i 5 dage.

Under 2 år: 2,5 ml (100 mg) 5 gange dagligt i 5 dage.

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:

Ingen erfaringer med børn.

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar:

2 - 14 år: 5 ml (200 mg) 4 gange dagligt.

Under 2 år: 2,5 ml (100 mg) 4 gange dagligt.

Skoldkopper:

Over 6 år: 20 ml (800 mg) 4 gange dagligt i 5 dage.

2 - 6 år: 10 ml (400 mg) 4 gange dagligt i 5 dage.

Under 2 år: 5 ml (200 mg) 4 gange dagligt i 5 dage.

Hvis du får oral suspension 80 mg/ml

Voksne

Helvedesild og skoldkopper: 10 ml (800 mg) 5 gange dagligt med 4 timers interval i 7 dage.

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 2,5 ml (200 mg) 5 gange dagligt med 4 timers interval i 5 dage.

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 10 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 2,5 ml (200 mg) 4 gange dagligt med 6 timers interval.

Børn

Behandling af herpesudbrud:

2 – 14 år: 2,5 ml (200 mg) 5 gange dagligt i 5 dage.

Under 2 år: 1,25 ml (100 mg) 5 gange dagligt i 5 dage.

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:

Ingen erfaringer med børn.

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar:

2 – 14 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange dagligt.

Under 2 år: 1,25 ml (100 mg) 4 gange dagligt.

Behandling af skoldkopper:

Over 6 år: 10 ml (800 mg) 4 gange dagligt i 5 dage.

2 – 6 år: 5 ml (400 mg) 4 gange dagligt i 5 dage.

Under 2 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange dagligt i 5 dage.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er her nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Ældre

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Zovirax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zovirax, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Overdosering kan forårsage kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hallucinationer, rastløs uro, kramper eller dyb bevidstløshed (koma).

Hvis du har glemt at tage Zovirax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag Zovirax, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det snart er tid til den næste dosis skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis som planlagt.

Hvis du holder op med at tage Zovirax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

- Åndenød. Tal med lægen.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Forhøjede levertal (ingen symptomer). Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- Blegthed og træthed pga. blodmangel. Tal med lægen.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Forvirring, uro, svær hovedpine, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
- Almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Hallucinationer. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

- Hovedpine.
- Svimmelhed.
- Kvalme.
- Opkastning.
- Diarré.
- Mavesmerter.
- Kløe.
- Udslæt.
- Øget følsomhed for lys på huden.
- Træthed.
- Feber.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

- Nældefeber.
- Hårtab.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

- Stigninger i nyretal.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- Rysten.
- Usikre bevægelser.
- Talebesvær.
- Smerter i området omkring dine nyrer.
- Uro.
- Forvirring.
- Døsighed.
- Vrangforestillinger eller forvrænget virkelighedsopfattelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Zovirax utilgængeligt for børn.

Zovirax 40 mg/ml må ikke opbevares over 25 °C.

Zovirax 80 mg/ml må ikke opbevares over 30 °C.

Holdbarhed efter åbning: 15 dage ved temperatur under 25 °C.

Brug ikke Zovirax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovirax indeholder:

- Aktivt stof: aciclovir.
1 ml oral suspension indeholder 40 mg/ml eller 80 mg/ml aciclovir.
- Øvrige indholdsstoffer: sorbitolopløsning 70% (E420), glycerol, mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216) og rensset vand.
- Oral suspension 40 mg/ml indeholder desuden: vanillin og banansmagsstof.
- Oral suspension 80 mg/ml indeholder desuden: appelsinsmagsstof (indeholder benzylalkohol).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Zovirax oral suspension (mikstur) er en hvid suspension i en brun glasflaske.

Pakningsstørrelser.

40 mg/ml: 125 (2x62,5) ml i brun glasflaske.

80 mg/ml: 100 ml i brun glasflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4

Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V

Varemærker tilhører eller er licenseret til GSK-koncernen.

Zovirax svarer til Zovir.

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2024

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovirax 80 mg/ml oral suspension

aciclovir

01-2024
P488886-6

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax
3. Sådan skal du tage Zovirax
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovirax er et middel mod herpesvirus, som virker ved at hæmme formering af virus.

Zovirax anvendes til behandling af *herpes simplex* infektioner i hud og slimhinder (med undtagelse af nyfødte og svær *herpes simplex* infektion hos børn med nedsat immunforsvar), samt til forebyggelse og behandling af gentagne udbrud af herpes i ansigtet, på munden (*herpes labialis*) eller på kønsorganerne (*herpes genitalis*). Zovirax kan desuden anvendes mod helvedesild (*herpes zoster*) og skoldkopper (*herpes varicella*).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Zovirax:

- hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovirax (angivet i afsnit 6)
- hvis du er allergisk over for valaciclovir.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zovirax:

- hvis du har nedsat nyrefunktion
- hvis du er over 65 år, da du derfor har større risiko for at have nedsat nyrefunktion
- hvis du får høj dosis. Sørg for at drikke rigeligt med væske under behandlingen
- hvis du har stærkt nedsat immunforsvar. Kontakt lægen inden opstart af behandling mod infektion.

Hvis du tager Zovirax mod helvedesild, skoldkopper eller *herpes simplex*, skal du starte behandlingen hurtigst muligt efter første tegn på udbrud.

Langvarig eller gentagen behandling med aciclovir hos patienter med nedsat immunforsvar kan resultere i, at nogle virusstammer får nedsat følsomhed og som følge deraf ikke kan behandles med Zovirax.

Brug af andre lægemidler sammen med Zovirax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Tal med lægen, hvis du bruger lægemidler mod:

- urinsyreigt (probenecid)
- for meget mavesyre (cimetidin)
- astma eller KOL (theophyllin)
- afstødning af organer efter transplantation (mycophenolatmofetil).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Zovirax påvirker som regel ikke arbejdsikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Nogle bivirkninger, såsom træthed og svimmelhed, kan dog have indflydelse på din koncentrations- og reaktionsevne. Sørg for, at du ikke er påvirket af sådanne bivirkninger, når du skal færdes i trafikken eller betjene maskiner.

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som begge kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Zovirax indeholder sorbitol (E420)

Dette lægemiddel indeholder 1575 mg sorbitol pr. 5 ml oral opløsning. Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis din læge har fortalt dig at du (eller dit barn) har intolerance over for nogle sukkerarter eller hvis du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan nedbryde fructose, skal du tale med din læge før du (eller dit barn) tager eller får dette lægemiddel. Sorbitol kan medføre gastrointestinalt ubehag og en mild afførende virkning.

Zovirax indeholder benzylalkohol

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mg benzylalkohol pr. 5 ml oral opløsning. Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner. Benzylalkohol er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger inklusive åndedrætsbesvær (kaldet "gasping syndrome") hos små børn.

Giv ikke til dit nyfødte barn (op til 4 uger), medmindre det anbefales af din læge. Må ikke anvendes til børn (under 3 år) i mere end én uge uden lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er gravid eller ammer. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose").

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du har en lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan medføre bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose").

3. Sådan skal du tage Zovirax

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den orale suspension (mikstur) skal omrystes grundigt før brug.

Måleske er vedlagt i pakningen.

Behandling af helvedesild skal påbegyndes ved første tegn på udbrud og senest 3 døgn efter første tegn.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Helvedesild og skoldkopper: 10 ml (800 mg) 5 gange dagligt med 4 timers interval i 7 dage.

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 2,5 ml (200 mg) 5 gange dagligt med 4 timers interval i 5 dage.

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 10 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser.

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 2,5 ml (200 mg) 4 gange dagligt med 6 timers interval.

Børn

Behandling af herpesudbrud:

2 – 14 år: 2,5 ml (200 mg) 5 gange dagligt i 5 dage.

Under 2 år: 1,25 ml (100 mg) 5 gange dagligt i 5 dage.

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:
Ingen erfaringer med børn.

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar:

2 – 14 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange dagligt.
Under 2 år: 1,25 ml (100 mg) 4 gange dagligt.

Behandling af skoldkopper:

Over 6 år: 10 ml (800 mg) 4 gange dagligt i 5 dage.

2 – 6 år: 5 ml (400 mg) 4 gange dagligt i 5 dage.

Under 2 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange dagligt i 5 dage.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er her nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Ældre

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Zovirax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zovirax, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Overdosering kan forårsage kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hallucinationer, rastløs uro, bevidstløshed, kramper eller dyb bevidstløshed (koma).

Hvis du har glemt at tage Zovirax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag Zovirax, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det snart er tid til den næste dosis skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis som planlagt.

Hvis du holder op med at tage Zovirax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorte b i v i r k n i n g e r

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

- Åndenød. Tal med lægen.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Forhøjede levertal (ingen symptomer). Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- Bleghed og træthed pga. blodmangel. Tal med lægen.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Forvirring, uro, svær hovedpine, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
- Almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyrsvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Hallucinationer. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

- Hovedpine.
- Svimmelhed.
- Kvalme.
- Opkastning.
- Diarré.
- Mavesmerter.
- Kløe.
- Udslæt.
- Øget følsomhed for lys på huden.
- Træthed.
- Feber.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

- Nældefeber.
- Hårtab.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

- Stigninger i nyretal.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- Rysten.
- Usikre bevægelser.
- Talebesvær.
- Smerter i området omkring dine nyrer.
- Uro.
- Forvirring.
- Døsighed.
- Vrangforestillinger eller forvrænget virkelighedsopfattelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Zovirax utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C.
Holdbarhed efter åbning: 15 dage ved temperatur under 25 °C.

Brug ikke Zovirax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovirax indeholder:

- Aktivt stof: aciclovir.
1 ml oral suspension indeholder 80 mg aciclovir
- Øvrige indholdsstoffer: Sorbitolopløsning 70% (E420), glycerol, mikrokrySTALLINSK cellulose, appelsinsmagsstof (indeholder benzylalkohol), methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Zovirax oral suspension (mikstur) er en hvid suspension i en brun glasflaske.

Pakningsstørrelser.

100 ml i brun glasflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Varemærker tilhører eller er licenseret til GSK-koncernen.

Zovirax svarer til Zovir.

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2024