

Indlægsseddel: Information til brugeren
Verapamilhydrochlorid 2care4 240 mg depottabletter
verapamilhydrochlorid

05-2021
P458407-3

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verapamilhydrochlorid 2care4
3. Sådan skal du tage Verapamilhydrochlorid 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Verapamilhydrochlorid 2care4 er medicin af typen calciumantagonister med virkning på hjerte og kredsløb.

Du kan bruge Verapamilhydrochlorid 2care4 til:

- forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris)
- behandling af for højt blodtryk
- forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerteforkammerrytme
- forebyggelse efter blodprop i hjertet

Behandling med Verapamilhydrochlorid 2care4 bør ikke afbrydes pludseligt efter lang tids brug. Det anbefales at nedtrappe dosis langsomt.

Lægen kan have givet dig Verapamilhydrochlorid 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verapamilhydrochlorid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Verapamilhydrochlorid 2care4, hvis du

- er allergisk over for verapamilhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Verapamilhydrochlorid 2care4 (angivet i afsnit 6)
- har langsom puls i form af AV-blok II eller III grad og syg sinusknudesyndrom uden fungerende pacemaker
- lider af hjertesvigt
- har svær hjertesvækkelse (kardiogen shock)
- har for hurtig hjerterytme
- lider af forstyrrelser i hjerterytmen (fx som følge af Wolff-Parkinson-White eller Lown-Gonong-Levine syndrom)
- har meget lavt blodtryk
- har fået for meget hjertemedicin (digoxin), kan vise sig ved kvalme
- er overfølsom overfor anden medicin der ligesom Verapamilhydrochlorid 2care4 tilhører gruppen af calciumantagonister
- får medicin for hjertet (ivabradin)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Verapamilhydrochlorid 2care4 hvis du:

- har meget langsom puls
- lider af sygdomme i hjerte eller kredsløb
- lider af forsnævring af aorta
- har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen
- lider af sygdomme hvor der er forstyrrelse i forbindelsen mellem nerverne og musklerne (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom eller fremskreden Duchennes muskeldystrofi)
- lider af grøn stær og er i behandling med øjendråber (betablokker).

Fortæl lægen hvis du har nedsat nyrefunktion, da du skal monitoreres tæt af lægen, hvis du skal have Verapamilhydrochlorid 2care4.

Hvis du har udtalt nedsat leverfunktion skal Verapamilhydrochlorid 2care4 anvendes med forsigtighed.

Verapamilhydrochlorid 2care4 kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

Fortæl altid lægen at du tager Verapamilhydrochlorid 2care4, hvis du skal bedøves.

Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal kontrolleres både før og under behandling med Verapamilhydrochlorid 2care4.

Oplys altid ved blodprøve- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Verapamilhydrochlorid 2care4.

Brug af anden medicin sammen med Verapamilhydrochlorid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

- for hjertet (digoxin, digitoxin, ivabradin)
- andre non vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK), såsom Xarelto, Eliquis og Pradaxa
- mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid, kinidin)
- mod forhøjet blodtryk (betablokkere, metoprolol, propranonol, prazosin, terazosin, vanddrivende medicin)
- efter transplantation (ciclosporin, sirolimus, everolimus, tacrolimus)
- mod urinsyreigt (sulfinpyrazon, colchicin)
- mod mani (lithium)
- mod depression (imipramin)
- mod sukkersyge (type II) (glibenclamid)
- mod forhøjet kolesterol (simvastatin, lovastatin, atorvastatin)
- mod astma (theophyllin)
- mod depression (perikum, naturmedicin)
- mod kræft (doxorubicin)
- mod migræne (almotriptan)
- mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, fenytoin)
- forebyggende mod migræne (clonidin)
- mod infektion (erythromycin, clarithromycin, rifampin, telithromycin)
- mod mavesår (cimetidin)
- mod angst og uro (buspiron, midazolam)
- der er muskelafslappende
- mod HIV (ritonavir)
- til bedøvelse (inhalationsanæstetika)
- mod smerter (acetylsalicylsyre)
- forebyggende/behandling mod blodpropper (dabigatran)
- Verapamil kan nedsætte metformins blodsukkersænkende virkning.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Brug af Verapamilhydrochlorid 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Verapamilhydrochlorid 2care4 med et glas vand.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.

Du skal være opmærksom på at Verapamilhydrochlorid 2care4 kan øge virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Verapamilhydrochlorid 2care4. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Verapamilhydrochlorid 2care4 efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Verapamilhydrochlorid 2care4 kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Verapamilhydrochlorid 2care4 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 37,1 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr. dosis. Dette svarer til 1,9% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3. Sådan skal du tage Verapamilhydrochlorid 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne: 240 mg 1-2 gange daglig.

Du skal synke Verapamilhydrochlorid 2care4 hele. Du må ikke knuse eller tygge dem.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn

Børn må normalt ikke få Verapamilhydrochlorid 2care4.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Verapamilhydrochlorid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Verapamilhydrochlorid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være: døsighed, forvirring, kramper, opkastning, feberdøs, for lavt blodtryk og alvorlig ændring af hjertets funktion med langsom hjerterytme. Ved mistanke om overdosering kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Verapamilhydrochlorid 2care4

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Verapamilhydrochlorid 2care4

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Verapamilhydrochlorid 2care4.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter:

- Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:

- Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Besvimelse eller bevidstløshed pga. dårlig hjertefunktion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Forstyrrelser i hjertets funktion

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter:

- Depression

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter:

- Blæreformet udslæt og betændelse i huden især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.
- Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112.
- Hjerterumpesvigt (kardiogent shock). Ring 112.
- Hjertestop

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter:

- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.
- Alvorlig hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
- Kramper i svelget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Kvalme, opkastninger, almen sløvhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt.
- Lammelser (også af arme og ben)
- Slagtilfælde.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter:

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Svimmelhed
- Sløvhed
- Hovedpine
- Forstoppelse
- Kvalme
- Fordøjelsesbesvær
- Kløe
- Eksem
- Nældefeber
- Hårtab
- Impotens
- Uregelmæssig menstruation
- Brystspændinger
- Træthed
- Varmefølelse
- Hævelse af ankler
- Lavt blodtryk
- Ansigtsrødme med varmfølelse

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:

- Søvnforstyrrelser og livlige drømme
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter:

- Overfølsomhed
- Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens.
- Appetitmangel/madlede
- Forvirring
- Mareidit
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
- Rysten
- Synsforstyrrelser
- Tinnitus
- Svimmelhed (vertigo)
- Hjerterbanken
- Mundtørhed
- Diarre
- Mavesmerter
- Maveubehag
- Opkastning
- Tarmslyng
- Forhøjede leverenzymmer
- Muskelkrampe
- Hyppige vandladninger
- Brystmerter
- Rødmen og varmekølelse i ansigtet
- Vindueskigger syndrom (smerter i benene ved gang)
- Rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter:

- Overvækst af tandkød
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben
- Øget svedtendens
- Muskelsmerter
- Ledsmerter
- Brystudvikling hos mænd
- Blå mærker

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter:

- Øget lysfølsomhed i huden
- Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
- Mindre blødning i hud og slimhinder.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Pletformet udslæt
- Muskelsvaghed
- Mælkeflåd
- Hævelser i fx ben
- Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser
- Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
- Åndenød / åndedrætsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Verapamilhydrochlorid 2care4 utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Tag ikke Verapamilhydrochlorid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Verapamilhydrochlorid 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: verapamilhydrochlorid.
1 depottablet indeholder 240 mg verapamilhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: mikrokrySTALLinsk cellulose, natriumalginat, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400, macrogol 6000, montanglycol voks, titandioxid (E171), talcum.
- Farve: quinolingult (E104) samt indigotin I (E132).

Udseende og pakningsstørrelser**Udseende**

Verapamilhydrochlorid 2care4 depottabletter er lysegrønne med delekærv og mærket med Δ på begge sider af delekærven på den ene side.

Pakningsstørrelser

Verapamilhydrochlorid 2care4 depottabletter 240 mg: 120 stk.

**Indehaver af markeds-
føringstilladelsen:**

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Verapamilhydrochlorid 2care4 svarer til Isoptin Retard.

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2021.