

Indlægsseddel: Information til patienten

Mebeverinhydrochlorid Aristo 200 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

mebeverinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mebeverinhydrochlorid Aristo
3. Sådan skal du tage Mebeverinhydrochlorid Aristo
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mebeverinhydrochlorid Aristo 200 mg er kapsel med modiceret udløsning der indeholder mebeverinhydrochlorid,. Det er et lægemiddel der tilhører gruppen spasmolytika. Lægemidlet anvendes til behandling af symptomer irritabel tyktarm (IBS) hos voksne.

Dette er en meget almindelig tilstand, der forårsager kramper og smerter i maven eller tarmen.

Tarmen er et langt muskulært rør, hvor maden passerer ned så den kan fordøjes. Du vil opleve smerter, hvis tarmen kramper, trækker sig sammen og klemmer. Dette lægemiddel virker ved at lindre kramper, smerter og andre symptomer af IBS.

De vigtigste symptomer på irritabelt tyktarmssyndrom (IBS) omfatter:

- mavesmerter og kramper
- følelse af oppustethed og luft i maven
- diaré (med eller uden forstoppelse)
- små, hårde kugler eller båndlignende afføring (fæces).

Disse symptomer kan variere fra person til person.

Din diæt og livsstil kan også hjælpe med at behandle irritabelt tyktarmssyndrom (IBS):

Hvordan IBS påvirker dig, afhænger af din kost/diæt. Hvis du opdager at visse fødevarer er grunden til at symptomerne opstår, er det fornuftigt ikke at spise dem. En diæt med højt fiberindhold kan lindre symptomerne, men spørg din læge eller apotekspersonalet for mere information.

Nogle mennesker oplever, at symptomerne på IBS mindskes ved at lære at slappe af. Det kan være en hjælp for dig, at afsætte nogle tidspunkter hver dag til afslapning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mebeverinhydrochlorid Aristo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Mebeverinhydrochlorid Aristo

- hvis du er allergisk over for det aktive indholdsstof, mebeverinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)
- ved sygdomme i mave-tarmkanalen, der kan lede til delvis eller fuldstændig hæmning af tarmens peristaltiske aktivitet, såsom paralyse (lammelse) af tarmbevægelser.

Advarsler og forsigtighedsregler

Rådfør dig med din læge eller apotekspersonalet før du tager mebeverin.

Brug af andre lægemidler sammen med Mebeverinhydrochlorid Aristo

Men fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Mebeverin vides ikke at interagere med andre lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Anvendelse af Mebeverinhydrochlorid Aristo anbefales ikke under graviditet.

Amning

Anvendelse af Mebeverinhydrochlorid Aristo anbefales ikke mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tidligere erfaring indikerer at dette lægemiddel generelt ikke påvirker din evne til at køre bil eller anvende værktøjer eller maskiner.

Mebeverinhydrochlorid Aristo indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Mebeverinhydrochlorid Aristo

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Til voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis er én kapsel to gange om dagen, en om morgenen og en om aftenen.

Brug til børn og unge

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn og unge.

Indtagelse

Kapslerne skal indtages i intervaller på 12 timer (f.eks. om morgenen og om aftenen). De skal sluges uden at tygges med en tilstrækkelig mængde vand (minimum 100 ml).

Hvis du har taget for mange Mebeverinhydrochlorid Aristo

Hvis du er kommet til at tage for mange kapsler eller hvis andre eller et barn er kommet til at tage lægemidlet, skal du straks informere lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Mebeverinhydrochlorid Aristo

Hvis du har glemt en kapsel, skal du tage den så snart som du kommer i tanker om det. Men hvis det næsten er tid til næste dosis, skal du springe den glemte kapsel over og fortsætte som vanligt med behandlingen fra næste dosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte kapsel.

Hvis du holder op med at tage Mebeverinhydrochlorid Aristo

Du må ikke stoppe med at tage Mebeverinhydrochlorid Aristo før du har talt med din læge, selvom du har fået det bedre.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogle af de følgende alvorlige bivirkninger, skal du straks stoppe med at tage lægemidlet og konsultere en læge, da du kan have behov for behandling.:

- åndedrætsbesvær, hævelser af ansigt, nakke, læber, tunge eller svælg (alvorlige allergiske reaktioner).

Andre bivirkninger kan være:

- nældefeber
- hævelse af ansigt, tunge og svælg
- hududslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Spørg apotekspersonalet hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mebeverinhydrochlorid Aristo indeholder

- Aktivt stof: Mebeverinhydrochlorid. Hver kapsel indeholder 200 mg mebeverinhydrochlorid i en hård kapsel med modificeret udløsning.
- Øvrige indholdsstoffer:
 - Kerne: Saccharosekugler (saccharose, majs), povidon (E1201), hypromellose (E464).
 - Filmovertrek: Ethylcellulose N-45, macrogol 6000 (E1521), Magnesiumstearat (E470b).
 - Kapselskal: Gelatine, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

De hårde kapsler med modificeret udløsning består af en hvid cremefarvet overdel og underdel størrelse nummer "1". De hårde kapsler er fyldt med hvide til cremefarvede sfæriske kugleformede pellets.

Mebeverinhydrochlorid Aristo 200 mg er tilgængelig i pakninger af 20, 30, 50, 60 og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10
13435 Berlin
Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2024