

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucicort® Lipid 20 mg/g + 1 mg/g creme

Fusidinsyre/betamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Fucicort Lipid til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort Lipid
3. Sådan skal du bruge Fucicort Lipid
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucicort Lipid er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethasonvalerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme bakteriers vækst, og betamethason virker ved at hæmme betændelse og dæmpe kløe. Du kan bruge Fucicort Lipid til behandling af hudsygdomme, hvor betændelsen er forårsaget af bakterier, der er sensitive over for fusidinsyre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort Lipid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Fucicort Lipid:

- hvis du er allergisk over for fusidinsyre, beta-methason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort Lipid (angivet i punkt 6).
- til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder bleeksem.
- hvis du har systemisk svampe infektion (dybe infektioner forårsaget af svamp).
- hvis du har hudinfektion som skyldes svamp, bakterier eller virus.
- hvis du har rosacea (svær rødme, særlig i ansigtets midter parti).
- hvis du har eksem rundt om munden.
- hvis du har hudsygdomme relateret til tuberkulose (TB).
- hvis du har akne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort Lipid.

Brug ikke Fucicort Lipid længere end højst nød-vendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig. Du bør ikke bruge Fucicort Lipid i mere end 2 uger.

Undgå at få Fucicort Lipid i øjnene, i åbne sår eller på slimhinder (sarte hudkanter, f.eks. i munden eller i næsebor).

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Fucicort Lipid kan skjule mulige symptomer på infektion.

Fucicort Lipid kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og genaktivere en hvilende infektion.

Børn og unge

Fucicort Lipid skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå store mængder, lufttæt forbindelse (okklusion) og længerevarende behandling, da binyrebarkhæmning kan optræde.

Børn kan være mere følsomme for systemiske bivirkninger af kortikosteroider end voksne.

Brug af anden medicin sammen med Fucicort Lipid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Du kan bruge Fucicort Lipid sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun bruge Fucicort Lipid efter lægens anvisning.

Amning

Du kan bruge Fucicort Lipid i korte perioder, selvom du ammer. Spørg lægen om rådgivning. Du må ikke smøre Fucicort Lipid på brystet, når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucicort Lipid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Fucicort Lipid indeholder methylparahydroxy-benzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), cetostearylalkohol og kaliumsorbat

Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Cetostearylalkohol og kaliumsorbat kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Fucicort Lipid

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 2-3 gange dagligt i op til 2 uger.

Brugervejledning

Du må kun bruge Fucicort Lipid på betændt hud.

Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen, med mindre du skal behandle hænderne.

Hvis du har brugt for meget Fucicort Lipid

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Fucicort Lipid end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Fucicort Lipid

Har du glemt at påsmøre Fucicort Lipid, skal du blot fortsætte behandlingen så snart du kommer i tanke om det og derefter fortsætte som hidtil.

Hvis du holder op med at bruge Fucicort Lipid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

- Allergisk reaktion.
- Rødme og udslæt (kontakteksem).
- Brændende fornemmelser i huden.
- Kløe (pruritus).
- Tør hud.
- Smerte på påføringsstedet.
- Irritation på påføringsstedet.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer):

- Rødmen af huden (erytem).
- Nældefeber (urticaria).
- Udslæt.
- Hævelse på påføringsstedet.
- Blærer på påføringsstedet.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Sløret syn.

Bivirkninger forårsaget af behandling med kortikosteroider, som betamethason omfatter:

- Tynd hud (hudatrofi).
- Eksem.
- Eksem rundt om munden.
- Striber på huden.
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Vedvarende rødme (rosacea).
- Rødmen af huden (erytem).
- Affarvning af huden.
- Uønsket hårvækst (hypertrikose).
- Kraftig sveden (hyperhidrose).
- Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug.

Systemiske bivirkninger forårsaget af behandling med stærke kortikosteroider, som betamethason omfatter:

- Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende behandling på huden.
- Komplikationer ved påføring for tæt på øjet (f.eks. forhøjet tryk indeni øjet og glaukom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Fucicort Lipid utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares over 30 °C.
- Holdbarhed efter åbning: 3 måneder.
- Skriv åbningsdato hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.
- Brug ikke Fucicort Lipid efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucicort Lipid indeholder:

- Aktive stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og betamethason (som valerat) 1 mg/g.
- Øvrige indholdsstoffer: Steareth-21, cetostearylalkohol, hvid blød paraffin, paraffinolie, hypromellose, citronsyremonohydrat, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), kaliumsorbat, all-rac- α -tocopherol og rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucicort Lipid er en hvid creme og findes i pakningsstørrelsen 15 g, 30 g og 60 g (2 x 30g) creme.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Epione Medicine ApS

Kanalholmen 14L

2650 Hvidovre

Fremstiller

Epione Medicine ApS

Kanalholmen 14L

2650 Hvidovre

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Epione Medicine ApS.

Fucicort® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2023