

Indlægsseddel: Information til patienten

Mycophenolsyre Accord 360 mg enterotabletter

mycophenolsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mycophenolsyre Accord
3. Sådan skal du tage Mycophenolsyre Accord
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mycophenolsyre Accord indeholder et stof, der hedder mycophenolsyre. Dette stof tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes immundæmpende lægemidler.

Mycophenolsyre Accord anvendes til at forhindre kroppens immunforsvar i at afstøde en transplanteret nyre. Det bruges sammen med andre lægemidler, som indeholder ciclosporin og kortikosteroider.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mycophenolsyre Accord

ADVARSEL

Mycophenolsyre forårsager medfødte misdannelser og abort. Hvis du er kvinde og kan blive gravid, skal der foreligge en negativ graviditetstest, før behandlingen igangsættes, og du skal følge lægens råd vedrørende prævention.

Lægen vil tale med dig og give dig skriftlig information, især om mycophenolsyres virkninger på fosteret. Læs informationen grundigt og følg vejledningen.

Hvis du ikke helt forstår informationen, skal du bede lægen om at forklare den igen, før du tager mycophenolat. Se også yderligere information i dette afsnit under ”Advarsler og forsigtighedsregler” og ”Graviditet og amning”.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Mycophenolsyre Accord

- hvis du er allergisk over for mycophenolsyre, mycophenolatrium, mycophenolatomofetil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mycophenolsyre Accord (angivet i punkt 6).
- hvis du er kvinde og kan blive gravid, og der ikke foreligger en negativ graviditetstest, før du har fået den første recept, eftersom mycophenolat forårsager medfødte misdannelser og abort.
- hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid eller tror, at du kan være gravid.
- hvis du ikke bruger effektiv prævention (se afsnittene om prævention hos kvinder og mænd).
- hvis du ammer (se også ”Graviditet og amning”).

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du begynder at tage Mycophenolsyre Accord.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Mycophenolsyre Accord:

- hvis du har eller har haft alvorlige fordøjelsesproblemer såsom mavesår.
- hvis du lider af en sjælden arvelig mangel på hypoxanthin-guanin-fosforibosyl-transferase (HGPRT), såsom Lesch-Nyhans syndrom eller Kelly-Seegmiller-syndrom.

Vær også opmærksom på følgende:

- Mycophenolsyre Accord nedsætter hudens evne til at beskytte sig mod sollys. Dette øger risikoen for hudkræft. Du bør begrænse den mængde sollys og ultraviolet lys (UV), du udsætter dig for, ved så vidt muligt at tildække huden og regelmæssigt anvende solcreme med høj beskyttelsesfaktor. Få råd og vejledning om solbeskyttelse af din læge.
- Hvis du allerede har haft hepatitis B eller C, kan Mycophenolsyre Accord øge risikoen for, at disse sygdomme kommer igen. Din læge vil måske tage blodprøver og se efter symptomer på disse sygdomme. Hvis du får symptomer (gul hud og gule øjne, kvalme, tab af appetit, mørk urin), skal du straks fortælle det til din læge.
- Hvis du får vedvarende hoste eller bliver stakåndet, især når du tager andre immundæmpende lægemidler, skal du straks fortælle det til din læge.
- Din læge vil måske kontrollere niveauet af antistoffer i dit blod under behandlingen med Mycophenolsyre Accord, især, hvis infektionerne vender tilbage, og særligt, hvis du også tager andre immundæmpende lægemidler. Din læge vil fortælle dig, om du skal fortsætte med at tage Mycophenolsyre Accord.
- Hvis du får tegn på infektion (såsom feber eller ondt i halsen) eller pludselige blå mærker eller blødninger, skal du straks fortælle det til din læge.
- Din læge vil måske kontrollere dit blods indhold af hvide blodlegemer under behandlingen med Mycophenolsyre Accord og fortælle dig, om du kan fortsætte med at tage Mycophenolsyre Accord.
- Det aktive stof, mycophenolsyre, er ikke det samme som andre stoffer med navne, som minder om dette, såsom mycophenolatomofetil. Du bør ikke skifte til andre lægemidler, medmindre din læge siger, du skal gøre det.
- Brug af Mycophenolsyre Accord under graviditet kan skade fosteret og øge risikoen for abort (spontan abort) (se også afsnittet ”Graviditet og amning”).

Brug af andre lægemidler sammen med Mycophenolsyre Accord

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept.

Det er især vigtigt, at du taler med din læge, hvis du tager nogle af følgende lægemidler:

- andre immundæmpende lægemidler, såsom azathioprin eller tacrolimus.
- lægemidler, der anvendes til behandling af højt kolesterolindhold i blodet, såsom cholestyramin.
- aktivt kul, der bruges til at behandle fordøjelsesproblemer såsom diarré, maveonde og luft i maven.
- antacida (syredæmpende lægemiddel), der indeholder magnesium og aluminium.

- lægemidler til behandling af virusinfektioner, såsom aciclovir eller ganciclovir.

Du bør ligeledes kontakte din læge, hvis du har planer om at blive **vaccineret**.

Du må ikke være bloddonor under behandling med Mycophenolsyre Accord og i mindst 6 uger efter behandlingens ophør. Mænd må ikke være sæddonorer under behandling med Mycophenolsyre Accord og i mindst 90 dage efter behandlingens ophør.

Brug af Mycophenolsyre Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Mycophenolsyre Accord kan tages sammen med eller uden mad. Du skal vælge, om du vil tage tabletterne med eller uden mad, og efterfølgende tage dem på samme måde hver gang. Derved sikres det, at din krop optager den samme mængde lægemiddel hver dag.

Ældre patienter

Ældre mennesker (65 år eller derover) kan tage Mycophenolsyre Accord uden behov for justering af den sædvanlige anbefalede dosis.

Børn og unge

Brug af Mycophenolsyre Accord til børn og unge frarådes, da der ikke foreligger tilstrækkelige data.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Prævention hos kvinder, som tager Mycophenolsyre Accord

Hvis du er kvinde og kan blive gravid, skal du bruge en effektiv præventionsmetode, mens du tager Mycophenolsyre Accord. Dette omfatter:

- Før du starter med at tage Mycophenolsyre Accord
- Under hele behandlingen med Mycophenolsyre Accord
- I 6 uger efter du er stoppet med at tage Mycophenolsyre Accord.

Tal med din læge om den bedst egnede prævention for dig. Dette vil være afhængigt af din personlige situation.

Brugen af to former for prævention er bedre, da dette vil gøre risikoen for utilsigtet graviditet mindre.

Kontakt lægen så hurtig som muligt, hvis du tror at din prævention har svigtet, eller hvis du har glemt at tage de svangerskabsforebyggende tabletter (f.eks. p-piller).

Hvis du er kvinde, kan du ikke blive gravid, hvis et af følgende gælder for dig:

- Du har passeret overgangsalderen, dvs. er mindst 50 år, og din sidste menstruation var for mere end et år siden (hvis din menstruation er stoppet, fordi du er blevet behandlet for kræft, er der stadigvæk mulighed for, at du kan blive gravid)
- Dine æggeledere og begge æggestokke er blevet fjernet ved operation (bilateral salpingooforektomi)
- Din livmoder (uterus) er blevet fjernet ved operation (hysterektomi)
- Dine æggestokke er ophørt med at fungere (for tidligt ovariesvigt, som er blevet bekræftet af en speciallæge i gynækologi)
- Du blev født med en af følgende sjældne tilstande, som gør graviditet umulig: XY-genotype, Turners syndrom eller manglende livmoder
- Du er barn eller teenager og endnu ikke har fået menstruation.

Prævention hos mænd, som tager Mycophenolsyre Accord

Tilgængelige data indikerer ikke øget risiko for misdannelser eller abort hvis faderen tager mycophenolat. En risiko kan dog ikke udelukkes helt. Som en sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at du eller din kvindelige partner bruger pålidelig prævention under behandlingen og i 90 dage efter, at du er stoppet med at tage Mycophenolsyre Accord.

Hvis du planlægger at få et barn, skal du tale med din læge om potentielle risici.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil tale med dig om risici i forbindelse med graviditet og alternative behandlinger, du kan tage for at forhindre afstødning af det transplanterede organ, hvis:

- du planlægger at blive gravid
- du ikke får din menstruation eller tror, du ikke har fået din menstruation eller har en usædvanlig menstruation eller tror, at du er gravid
- hvis du har haft sex uden at anvende effektiv prævention.

Hvis du bliver gravid under behandlingen med mycophenolat, skal du straks kontakte lægen. Fortsæt dog behandlingen, indtil du ser lægen.

Graviditet

Mycophenolat forårsager en meget høj hyppighed af aborter (50 %) og alvorlige misdannelser (23-27 %) hos det ufødte barn. Medfødte misdannelser, som har været rapporteret, inkluderer abnormiteter i ører, øjne og ansigt (læbe-gane-spalte) eller i fingrenes udvikling, samt i hjerte, spiserør, nyrer og nervesystem (f.eks. manglende sammenvoksning af ryggraden (spina bifida). Barnet kan have en eller flere af disse misdannelser.

Hvis du er kvinde og kan blive gravid, skal der foreligge en negativ graviditetstest, før du må påbegynde behandlingen, og du skal følge lægens råd om prævention. Lægen kan kræve mere end én test for at sikre, at du ikke er gravid, før du påbegynder behandlingen.

Amning

Tag ikke Mycophenolsyre Accord, hvis du ammer. Dette skyldes, at små mængder af lægemidlet kan passere over i mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mycophenolsyre Accord påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre grad.

Mycophenolsyre Accord indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 1,21 mmol (27,9 mg) natrium pr. tablet. Dette skal tages i betragtning ved patienter, der er på en natriumkontrolleret diæt.

3. Sådan skal du tage Mycophenolsyre Accord

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Mycophenolsyre Accord vil kun blive ordineret til dig af en læge med erfaring inden for behandling af transplantationspatienter. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Så meget Mycophenolsyre Accord skal du tage

Den anbefalede daglige dosis af Mycophenolsyre Accord er 1440 mg (fire tabletter à 360 mg). Denne dosis tages som to separate doser af 720 mg (to tabletter à 360 mg).

Tabletterne skal tages om morgenen og om aftenen.

Den første dosis på 720 mg vil blive givet inden for 72 timer efter transplantationen.

Hvis du har alvorlige nyreproblemer

Den daglige dosis må ikke overskride 1440 mg (fire tabletter à 360 mg).

Sådan tager du Mycophenolsyre Accord

Tabletterne synkes hele med et glas vand.

Tabletterne må ikke knækkes eller knuses.

Du må ikke tage knækkede eller delte tabletter.

Behandlingen vil fortsætte, så længe du har behov for immundæmpende lægemiddel for at forhindre kroppen i at afstøde dit transplatat.

Hvis du har taget for mange Mycophenolsyre Accord-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mycophenolsyre Accord, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Behandling kan være nødvendig. Medbring tabletterne og vis dem til lægen eller hospitalspersonalet. Hvis du ikke har flere tabletter, skal du medbringe den tomme pakning.

Hvis du har glemt at tage Mycophenolsyre Accord

Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag den, så snart du bliver opmærksom på det. Hvis det næsten er tid til, at du skal tage den næste dosis tabletter, så spring den glemte dosis tabletter over. Spørg din læge til råds. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Mycophenolsyre Accord

Hold ikke op med at tage Mycophenolsyre Accord, medmindre lægen siger det. Hvis du stopper med at tage Mycophenolsyre Accord, kan det forøge risikoen for, at din krop afstøder nyretransplantatet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden lægemiddel give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ældre patienter kan opleve flere bivirkninger på grund af et nedsat immunforsvar.

Immundæmpende lægemidler såsom Mycophenolsyre Accord nedsætter din krops egen forsvarsmekanisme for at forhindre, at du afstøder dit transplanterede organ. Din krop vil derfor ikke være så god som normalt til at bekæmpe virus-, bakterie- og svampeinfektioner. Hvis du tager Mycophenolsyre Accord, kan du derfor få flere infektioner end normalt, såsom infektioner i hjernen, huden, munden, maven og tarmene, lungerne og urinvejene.

Lægen vil regelmæssigt tage blodprøver for at overvåge eventuelle ændringer i antallet af blodlegemer eller mængden af visse stoffer, som transporteres i blodet, såsom sukker, fedt og kolesterol.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige:

- Tegn på infektion, herunder feber, kulderystelser, svedafsondring, træthed, døsighed eller mangel på energi. Hvis du tager Mycophenolsyre Accord, kan du være mere udsat for at få infektioner end sædvanligt. Sådanne infektioner kan påvirke forskellige kropsdele, men de kropsdele, som almindeligvis berøres, er nyrerne, blæren og øvre og/eller nedre luftveje.
- Opkastning af blod, sort eller blodig afføring, sår i mave eller tarm.
- Hævelse af dine kirtler, udvikling af nye hudvækster eller forøgelse af størrelsen på eksisterende hudvækster eller ændringer i eksisterende modermærker. Som det kan ske for alle patienter, som får immundæmpende behandling, har et meget lille antal Mycophenolsyre Accord-patienter udviklet hudcancer eller lymfeknuder

Hvis du oplever et eller flere af ovenstående symptomer efter at have taget Mycophenolsyre Accord, skal du øjeblikkeligt kontakte din læge.

Andre bivirkninger kan omfatte:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- diarré
- lavt indhold af hvide blodlegemer
- lavt niveau af kalcium i blodet (hypokalcæmi)
- lavt niveau af kalium i blodet (hypokaliæmi)
- højt niveau af urinsyre i blodet (hyperurikæmi)
- forhøjet blodtryk (hypertension)
- ledsmerter (artralgia)
- angst

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

- lavt indhold af røde blodlegemer, hvilket kan resultere i træthed, åndenød og blegthed (blodmangel)
- lavt indhold af blodplader, der kan forårsage pludselige blødninger og blå mærker (trombocytopeni)
- hovedpine
- hoste
- underlivssmerter eller mavesmerter, betændelse i maveslimhinden, oppustet mave, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, tarmluft (flatulens), tynd afføring, kvalme, opkastning
- træthed, feber
- unormale lever- eller nyrefunktionstestresultater
- luftvejsinfektioner
- højt niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi)
- lavt niveau af magnesium i blodet (hypomagnesiæmi)
- svimmelhed
- lavt blodtryk (hypotension)
- stakåndethed (dyspnø)
- akne
- svaghed (asteni)
- muskelsmerter (myalgi)
- hævede hænder, ankler eller fødder (perifert ødem)
- kløe

• **Ikke almindelige** (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

- hurtig puls (takykardi) eller uregelmæssig hjerterytme (ventrikulære ekstrasystoler), væske i lungerne (pulmonært ødem)
- en vækst, som ligner en pose (cyste), og indeholder væske (lymfæ) (lymfocèle)
- rysten, søvnbesvær
- rødme og hævede øjne (konjunktivitis), sløret syn
- pibende vejrtrækning
- ræben, dårlig ånde, tilstopning af tarme (ileus), sår på læberne, halsbrand, misfarvning af tungen, tørhed i munden, betændelse i gummerne, betændelse i bugspytkirtelen, som kan føre til stærke smerter i det øverste af maven (pancreatitis), tilstoppede spytkirtler, betændelse i maveslimhinden (peritonitis)
- infektion i knoglerne, blodet eller huden
- blod i urinen, nyreskader, smerter og vandladningsbesvær
- hårtab, blå mærker på huden
- ledbetændelse (arthritis), rygsmerter, muskelkramper
- tab af appetit, øget indhold af lipider, (hyperlipidæmi), sukker (diabetes), kolesterol (hyperkolesterolæmi) eller nedsat fosfatindhold i blodet (hypofosfatæmi)
- tegn på influenza (såsom træthed, kuldegysninger, ondt i halsen, ømme led og muskler), hævede ankler og fødder, smerter, kulderystelser, følelse af tørst og svaghed
- unormale drømme, vrangforestillinger

- manglende evne til at få eller opretholde rejsning
- hoste, vejrtrækningsbesvær, smertefuld vejrtrækning (mulige tegn på interstitiel lungesygdom)

Hyppighed ikke kendt (*hyppigheden kan ikke anslås ud fra de foreliggende data*)

- udslæt
- feber, ondt i halsen, hyppige infektioner, som er mulige symptomer på manglende hvide blodceller (agranulocytose)

Andre bivirkninger indberettet for lægemidler, der svarer til Mycophenolsyre Accord

Yderligere bivirkninger er indberettet i forbindelse med den gruppe af lægemidler, som Mycophenolsyre Accord tilhører: Betændelse i tarmen (tyktarmen), betændelse i mavens slimhinde forårsaget af cytomegalovirus, udvikling af et hul i tarmvæggen, hvilket resulterer i stærke mavesmerter med mulig blødning, mavesår eller sår på tolvfingertarmen, et lavt niveau af hvide blodlegemer eller blodlegemer generelt, alvorlige infektioner såsom betændelse i hjertet og hjerteklapperne og i hjernemembranen og rygmarven, åndenød, hoste, der kan være tegn på en tilstand, hvor luftvejene i lungerne er usædvanligt udvidede (bronkiektasi), samt andre mindre almindelige bakterielle infektioner, der som regel resulterer i en alvorlig lungesygdom (*tuberkulose og atypisk mykobakteriel infektion*). Tal med din læge, hvis du har (eller får) vedvarende hoste eller åndenød.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Brug ikke lægemidlet, hvis pakningen er beskadiget eller ser ud til at have været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mycophenolsyre Accord indeholder:

- Aktivt stof: mycophenolsyre (som mycophenolatnatrium).
Hver tablet indeholder 360 mg mycophenolsyre.

- Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne: Mikrokrystallinsk cellulose (E460), croscarmellosenatrium (E468), povidon K30 (E1201), talcum (E553b), kolloid vandfri silica (E551), magnesiumstearat (E470b).

Tabletovertræk: (methacrylsyre - ethylakrylatcopolymer (1:1), talkum (E553b), titandioxid (E171), triethylcitrat (E1505), kolloid vandfri silica (E551), natriumhydrogencarbonat (E500), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), natriumlaurilsulfat (E487).

Tabletskrift: Shellac glasur, delvist esterificeret (E904), sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520) ammoniak (E527).

Udseende og pakningsstørrelser

Mycophenolsyre Accord 360 mg enterotabletter er ferskenfarvede, aflange, bikonvekse tabletter med syreresistent overtræk, præget med M2 på den ene side med sort blæk og jævne på den anden side.

Mycophenolsyre Accord 360 mg enterotabletter fås i blisterpakninger indeholdende 50, 100, 120 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Holland

Fremstiller

Pharmadox Healthcare Limited
KW20A Kordin Industrial Park,
Paola PLA 3000, Malta

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200,
3526 KV Utrecht,
Holland

STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel
Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i Det Forenede Kongerige (Nordirland) under følgende navne:

Medlemslandets navn	Lægemidlets navn
ES	Ácido micofenólico Stada 360mg comprimidos gastrorresistentes EFG
AT	Mycophenolsäure Accord 360mg magensaftresistente Tabletten
CY	Mycophenolic acid Accord 360mg gastro-resistant tablets

CZ	Mycophenolic acid Accord 360mg Enterosolventní tablety
DE	Mycophenolsäure Accord 360mg magensaftresistente Tabletten
DK	Mycophenolsyre Accord
IT	Acido micofenolico Accord 360mg compresse gastroresistenti
IS	Mycofenolsýra Accord 360mg sýrupolnar töflur
NL	Mycofenolzuur Accord 360mg, maagsapresistente tabletten
NO	Mykofenolsyre Accord
PL	Marelim, 180 mg, tabletki dojelitowe
PT	Mycophenolic acid Accord
SE	Mykofenolsyra Accord 360mg enterotabletter
UK (Nordirland)	Mycophenolic acid 360mg gastro-resistant tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2024