

Indlægsseddel: Information til brugeren
Dexofan® 30 mg filmovertukne tabletter
dextromethorphanhydrobromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Dexofan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dexofan
3. Sådan skal du tage Dexofan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dexofan er et hostestillende lægemiddel, som hæmmer hosterefleksen. Du kan bruge Dexofan ved tør hoste uden slim.

Denne medicin kan være vanedannende. Behandling bør derfor være af kort varighed.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dexofan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisninger og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dexofan:

- hvis du er allergisk overfor dextromethorphanhydrobromid eller et af de øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6)
- ved samtidig behandling eller, hvis du for nylig har været i behandling med en MAO- hæmmer (mod depression eller Parkinson's sygdom). Tal med lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dexofan:

- Hvis du tager medicin såsom visse antidepressiva eller antipsykotika, kan Dexofan interagere med disse lægemidler, og du kan opleve ændringer i din mentale tilstand (f.eks. agitation, hallucinationer, koma) og andre virkninger, såsom kropstemperatur over 38°C, øget hjerterefrekvens, ustabilt blodtryk og overdrevne reflekser, muskelstivhed, manglende koordination og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, opkast, diarré).

Hvis du har særlig kraftig slimproduktion i luftvejene eller hoste med slim, skal du stoppe med at tage Dexofan, da medicinen hæmmer din hosterefleks, og du derfor ikke får hostet slimen løs.

Dexofan nedbrydes i leveren af enzymer i det såkaldte cytokrom P450 system (CYP2D6 systemet). Hvis du tager medicin, der hæmmer CYP2D6 systemet eller, hvis du er en "langsom omsætter" (hvis din lever mangler eller har lavt CYP2D6), kan Dexofans virkning være forstærket eller forlænget.

Dexofans søvndyssende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes, hvis du samtidig tager anden medicin, der virker hæmmende på åndedrættet eller er søvndyssende.

Brug af anden medicin sammen med Dexofan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere)
- depression og/eller OCD, panikangst og fobier (SSRI-medicin, f.eks. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin)
- svamp (terbinafin)
- forstyrrelser i hjerterytmen (amiodaron, flecainide, propafenon, quinidin)
- stof-/medicinmisbrug, stærke kroniske smerter og/eller betændelse i bugspytkirtlen (metadon)
- skizofreni og/eller psykoser (haloperidol, perphenazin, thioridazin)
- rygning (bupropion)
- for meget calcium i blodet eller for meget biskjoldbruskkirtelhormon (cinacalcet).

Brug af Dexofan sammen med mad og drikke

Du kan tage Dexofan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Dexofan efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Dexofan efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dexofan kan give bivirkninger (døsighed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dexofan indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Dexofan

Tag altid Dexofan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletten tages hel sammen med rigelig væske. Tabletten kan evt. deles eller knuses.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 11 år: ½ – 1 tablet (15 – 30 mg) 3 – 4 gange daglig.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning

Børn

Børn under 11 år må kun få Dexofan efter lægens anvisning.

Der kan forekomme alvorlige bivirkninger hos børn i tilfælde af overdosering, herunder neurologiske lidelser. Patienters tilsynsførende må ikke overskride den anbefalede dosis.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Dexofan

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Dexofan, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du tager mere Dexofan end ordineret, kan du opleve følgende symptomer: kvalme og opkast, ufrivillige muskelsammentrækninger, agitation (sindsbevægelse), forvirring, somnolens (søvnighed), bevidsthedsforstyrrelser, ufrivillige og hurtige øjenbevægelser, hjerteforstyrrelser (hurtigt hjerteslag), koordinationsforstyrrelser, psykose med visuelle hallucinationer og hyperexcitabilitet.

Andre symptomer i tilfælde af massiv overdosering kan omfatte: koma, alvorligt vejrtrækningsbesvær og krampeanfald.

Kontakt straks din læge eller dit hospital, hvis du oplever nogen af ovenstående symptomer.

Hvis du har glemt at tage Dexofan

Hvis du har glemt en dosis Dexofan, så tag den da så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Dexofan kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Hallucinationer.

Ikke alvorlige: Opstemthed, svimmelhed, døsighed, ufrivillige bevægelser.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Misbrug.

Ikke alvorlige: Hududslæt, afgrænset medikamentelt udslæt (fixed drug eruption).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning, er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Dexofan utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Dexofan ved almindelig temperatur.

Brug ikke Dexofan efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dexofan 30 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er dextromethorphanhydrobromid.

De øvrige indholdsstoffer er gelatine, hypromellose (E 464), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470 b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553 b), og vandfri kolloid silica (E 551). Farve: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Dexofan er en hvid, rund, hvælvet, filmovertrukken tablet med delekærv. Dexofan findes i pakningsstørrelser à 20 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S

Energivej 15

5260 Odense S

info@orifarm.com

Fremstiller

Takeda GmbH

Lehnitzstr. 70 – 98

16515 Oranienburg
Tyskland

eller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2024.