

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trimopan[®], 10mg/ml oral suspension

Trimethoprim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Trimopan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trimopan
3. Sådan skal du tage Trimopan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trimopan er et antibiotikum, der virker ved at hæmme eller dræbe bakterier.

Du kan bruge Trimopan til behandling af blærebetændelse og andre former for betændelse i urinvejene, når bakterierne er følsomme over for trimethoprim.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trimopan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Trimopan

- hvis du er allergisk over for trimethoprim eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trimopan (angivet i punkt 6)
- hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion
- hvis du har visse former for blodmangel eller forandringer i blodets sammensætning
- hvis du har blodmangel (anæmi) på grund af folinsyremangel
- hvis du har vitamin B₁₂-mangel

Du må ikke bruge Trimopan til børn under 6 uger gamle.

Advarsler og forsigtighedsregler

Samtidig brug af trimethoprim med visse lægemidler f.eks. spironolacton, kaliumtilskud og mad rig på kalium kan føre til alvorlig hyperkaliæmi (forhøjet kalium i blodet). Symptomerne på alvorlig hyperkaliæmi kan omfatte muskelkramper, uregelmæssig hjerterytme, diarré, kvalme, svimmelhed eller hovedpine.

Kontakt lægen, før du tager Trimopan:

- hvis du har nedsat nyrefunktion
- hvis du har vedvarende diarré
- hvis du lider af en stofskiftesygdom, som kaldes Føllings sygdom
- hvis du lider af en stofskiftesygdom, som kaldes porfyri.

Lægen vil muligvis undersøge dit blod ved en langtidsbehandling med Trimopan, hvis din nyrefunktion er nedsat, hvis du har risiko for forhøjet indhold af kalium i blodet eller hvis du har mangel på folinsyre. Lægen kan give dig tilskud af folinsyre.

Trimopan kan nedsætte dannelsen af blodceller, specielt når lægemidlet gives i længere tid eller ved høje doser. Dette kan give ømhed i halsen, feber, bleghed eller mindre blødning i hud og slimhinder.

Trimopan er normalt ikke anbefalet til børn under 3 måneder, men din læge kan vurdere at det er nødvendigt. Trimopan må ikke bruges til børn under 6 uger gamle. Mindre børn har ofte svært ved at synke tabletter.

Brug af anden medicin sammen med Trimopan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, da det eventuelt er nødvendigt at ændre dosis, hvis du er i behandling med:

- medicin mod speciel hudsygdom og specielle infektioner (dapson)
- medicin mod tuberkulose (rifampicin)
- medicin mod epilepsi (phenytoin)
- medicin mod HIV (zidovudin)
- hjertemedicin (digoxin)
- medicin, der gives efter en transplantation (ciclosporin)
- blodfortyndende medicin (warfarin)
- medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere)
- medicin mod malaria (pyrimethamin)
- medicin, der hæmmer knoglemarven
- medicin mod kræft, svær psoriasis eller leddegigt (methotrexat)
- vanddrivende medicin (f.eks. spironolacton).

Trimethoprim kan påvirke undersøgelser af kreatinin i kroppen.

Brug af Trimopan sammen med mad og drikke

Trimopan kan tages sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Trimopan, hvis du er gravid. Anvendelse af Trimopan i løbet af de første 20 uger af graviditeten, har været forbundet med øget risiko for spontan abort.

Amning

Trimopan bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Trimopan efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Trimopan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Trimopan indeholder methyl- og propylparahydroxybenzoat samt sorbitol

Trimopan indeholder 0,8 mg methylparahydroxybenzoat og 0,2 mg propylparahydroxybenzoat pr. ml, som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Trimopan oral suspension indeholder 285,7 mg sorbitol pr. ml. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Trimopan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Korttidsbehandling:

Voksne og børn over 12 år: 20 ml (200 mg) 2 gange dagligt.

Børn over 6 år: 10 ml (100 mg) 2 gange dagligt.

Børn over 3 måneder: 6-8 mg/kg/dag for delt på 2-3 doser. Følg lægens anvisning.

Langtidsbehandling:

Voksne og børn over 12 år: 10 ml (100 mg) dagligt.

Børn over 3 måneder: 1-2 mg/kg/dag som enkeltdosis til natten. Følg lægens anvisning.

Eldre:

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Nedsat nyrefunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Ryst altid Trimopan oral suspension før brug.

For at gøre doseringen lettere, findes der en adapter og en doseringssprøjte i pakningen (se brugsanvisning i pakningen med adapteren og doseringssprøjten).

Hvis du har taget for meget Trimopan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Trimopan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomerne på overdosering: Kvalme, diarré, hævelse i ansigtet og hovedpine.

Hvis du har glemt at tage Trimopan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Trimopan

Du skal fortsætte med at tage Trimopan lige så længe, som lægen har foreskrevet, også selvom du skulle føle dig bedre. Det er vigtigt at fortsætte med lægemidlet under hele behandlingsforløbet, da symptomerne kan vende tilbage, hvis du stopper med at tage lægemidlet for tidligt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).
- Hævelse af tunge, læber og ansigt, der kan medføre at luftvejene blokeres (angioneurotisk ødem). Ring 112.
- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, bleghed, infektioner, feber, blødning fra hud og slimhinder samt blå mærker. Søg straks læge.
- Meningitis der ikke er forårsaget af infektion. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Alvorlige hudreaktioner i form af udslæt, betændelse og afskalning af huden. Kontakt lægen eller skadestuen.
- Alvorlig diarré, betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Kvalme og opkastning.
- Betændelse i tungen.
- Kløe og hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Nældefeber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Allergi/overfølsomhedsreaktioner.
- Øget lysfølsomhed i huden med risiko for solskoldning.
- Feber forårsaget af allergisk reaktion over for medicinen.
- Diarré.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Betændelse i øjets regnbue- og årehinde.

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte din læge eller skadestuen.
- Blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet.
- Forstyrrelser i leverenzymværdier.
- Kløe pga. nedsat eller manglende udskillelse af galde i tolvfingertarmen.
- Gulsot med hudkløe.

Trimopan kan herudover medføre visse ændringer i blodet, f.eks. forhøjet indhold af kalium, som igen bliver normalt, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Trimopan efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Efter anbrud skal produktet anvendes inden for 6 uger.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trimopan indeholder:

- Aktivt stof: trimethoprim.
- Øvrige indholdsstoffer: methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), sorbitol 70 % (E420), xylitol, xanthangummi, polysorbat 80, abrikosaroma, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende:

Trimopan er efter omrystning en uklar hvid suspension.

Pakningsstørrelser:

Trimopan 10mg/ml, oral suspension fås i 100 ml flasker med ilagt doseringssprøjte

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation
Orionintie 1

FI-02200 Espoo
Finland

Fremstiller:

Orion Corporation Orion Pharma
Volltikatu 8
FI-70700 Kuopio
Finland

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S
medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2024.