

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kloramfenikol DAK 5 mg/ml øjendråber, opløsning chloramphenicol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4..

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK
3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol DAK øjendråber (herefter kaldet Kloramfenikol) er et bakteriehæmmende lægemiddel (antibiotikum) til behandling af øjenbetændelse.

Øjendråberne kan anvendes til både børn og voksne.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisninger og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Kloramfenikol

- hvis du er allergisk over for chloramphenicol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kloramfenikol (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Kloramfenikol.

Kontakt lægen, før du bruger Kloramfenikol, hvis du har en knoglemarvssygdom, eller nogen i din familie har eller har haft alvorlige blodsygdomme.

Vær opmærksom på, at du:

- ikke må bruge Kloramfenikol sammen med kontaktlinser

- ikke bør bruge Kloramfenikol længere end 2 uger, da der ellers er risiko for udvikling af bivirkninger og resistens (medicinen virker ikke)

Brug af andre lægemidler sammen med Kloramfenikol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Kloramfenikol, eller Kloramfenikol kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Tal derfor med din læge, hvis du tager andre lægemidler mod infektion (penicillin, cefalosporiner, gentamicin, tetracyklin, polymyxin B) eller lægemidler, der kan have en indvirkning på knoglemarven.

Hvis du bruger andre lægemidler i øjnene, skal du vente ca. 5 minutter, efter du har brugt Kloramfenikol, før du bruger det næste lægemiddel.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Kloramfenikol under graviditet.

Amning

Du må gerne bruge Kloramfenikol, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kloramfenikol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kloramfenikol indeholder bor

Dette lægemiddel må ikke anvendes til småbørn under 2 år, med mindre det er aftalt med lægen, da det indeholder bor og kan forringe frugtbarheden i fremtiden.

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brugsanvisning

Bryd flaskens forsegling ved at skrue låget helt til. Herved dannes et lille hul i flaskens spids. Skru låget af. Flasken er nu klar til brug.

Træk ned i nederste øjenlåg, dryp en øjendråbe i lommen mellem øje og øjenlåg. Undgå at beholderens spids kommer i berøring med huden eller øjet. Skru låget på efter brug. Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan til tider afgive smag i mund/svælg.

Selvom der sker en bedring efter få dage, er det vigtigt at fortsætte behandlingen i den periode, lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 dråbe mindst 6 gange daglig. Din læge vil fastlægge din dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn

Dosering som for voksne, dog maksimalt 16 dråber daglig for småbørn under 2 år.

Din læge kan udskrive en lavere dosis til nyfødte for at nedsætte risikoen for bivirkninger.

Behandlingen må højst vare 10 – 14 dage.

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Kloramfenikol, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har brugt for mange øjendråber, kan du skylle øjet med vand eller saltvand.

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Det bedste resultat opnås, når doseringen følges.

Hvis du holder op med at bruge Kloramfenikol

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Brændende, sviende fornemmelse og irritation i øjnene, rødme i det hvide område af øjet, ny infektion (muligvis med bakterier, der ikke kan behandles), allergiske reaktioner.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Betændelse i synsnerven, der kan medføre blindhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Påvirkning af knoglemarven ved langvarig brug, væskeophobning under huden især ved læber og hals.

Ikke alvorlige: Sløjhed, blegthed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker og tendens til infektioner, nældefeber, udslæt, øjenbetændelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk,

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

En **uåbnet** Kloramfenikol skal opbevares i køleskab ved 2 – 8 °C.

Efter åbning må Kloramfenikol højst bruges 1 måned og kan da opbevares ved stuetemperatur.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kloramfenikol DAK 5 mg/ml øjendråber indeholder

Det virksomme indholdsstof er chloramphenicol. De øvrige indholdsstoffer er borax (E 285), borsyre (E 284) og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Kloramfenikol DAK øjendråber er en klar, farveløs opløsning. Produktet findes i plastflasker à 10 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
info@orifarm.com

Fremstiller

Curida AS
Solbærveien 5
N-2409 Elverum

Denne indlægsseddel blev senest ændret Maj 2024.