

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Okicare
3. Sådan skal du bruge Okicare
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Okicare øjensalve indeholder et lægemiddel, der hedder aciclovir, som tilhører den gruppe af lægemidler, der hedder antiviraler. Den bruges til at behandle infektioner i øjnene, som er forårsaget af Herpes simplex-virussen. Den virker ved at dræbe eller stoppe væksten af virusser på forsiden af øjeæblet (hornhinden).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Okicare

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Okicare

- hvis du er allergisk over for aciclovir eller valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Okicare (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Okicare.

- Brug kun Okicare 30 mg/g øjensalve i øjet.
- Du kan opleve en omgående mild sviende og brændende fornemmelse umiddelbart efter påføringen.
- Der kan forekomme omgående overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt (nældefeber) og hævelser o.s.v. Kontakt en læge med det samme, hvis du oplever sådanne overfølsomhedsreaktioner.
- Hvis du oplever allergiske reaktioner såsom kløende øjenlåg, hævet eller rødt øje, skal du afbryde behandlingen med Okicare 30 mg/g øjensalve og kontakte din læge.
- Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever alvorlige eller tilbagevendende symptomer.

Du bør ikke bruge kontaktlinser, når du er i behandling med Okicare 30 mg/g øjensalve.

Børn og unge

Samme som hos voksne.

Brug af anden medicin sammen med Okicare

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Der er endnu ikke observeret nogen signifikante interaktioner ved påføring lokalt i øjet.

Dog er der utilstrækkelig information om brug af Okicare øjensalve og samtidig behandling med øjenlægemidler med cortikosteroider. Din læge vil afgøre om det er passende for dig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Okicare øjensalve kan bruges under graviditet og amning, da der ikke, når den anbefalede dosis overholdes, forventes at være bivirkninger under graviditet, for fostret eller det nyfødte barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

På grund af sin form, kan dette lægemiddel midlertidigt forringe synet. Der bør derfor tages særlige forholdsregler ved kørsel af motorkøretøjer, arbejde uden fastgørelse og betjening af maskiner.

3. Sådan skal du bruge Okicare

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brugsvejledning

Til anvendelse i øjet.

Den anbefalede dosis, hvis andet ikke er anvist af lægen, er: Placer en 1 cm lang streng af salven i den nedre lomme mellem øje og øjenlåg 5 gange om dagen (hver 4 time). Anbefalede tidspunkter: kl. 7.00, 11.00, 15.00, 19.00 og 23.00.

Træk det nederste øjenlåg ned, og placer en streng af salven inde i lommen. Luk øjnene, og bevæg dem rundt, så salven fordeles bedre.

Det er vigtigt, at du påfører Okicare 30 mg/g øjensalve i løbet af dagen med 4 timers mellemrum for at behandlingen kan lykkedes.

Når infektionen i hornhinden er helet, skal behandlingen stadig fortsættes i mindst 3 dage.

Brug til børn og unge

Samme som hos voksne.

Hvis du har brugt for meget Okicare

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Okicare, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Okicare øjensalve er beregnet til brug i øjet. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du sluger noget.

Hvis du har glemt at bruge Okicare

Hvis du har glemt at bruge Okicare, så brug den, så snart du husker det. Men hvis det næsten er tid til næste dosis, skal du springe den glemte over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Okicare

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan opleves en mild, forbigående svien eller brændende fornemmelse umiddelbart efter påføring. Stop med at bruge Okicare, og kontakt omgående lægen, hvis der er udslet (nældefeber) og hævelser eller lignende.

Allergiske reaktioner meget sjældne (kan påvirke mindre end 1 ud af 10.000 personer)
Stop med at bruge Okicare, og kontakt omgående lægen, hvis du oplever en allergisk eller overfølsomhedsreaktion.

Disse tegn kan inkludere:

- udslet, kløe eller nældefeber på din hud
- hævelse af ansigtet, læber, tunge eller andre kropsdele
- stakåndethed, hiven efter vejret eller åndedrætsbesvær
- uforklarlig feber (høj temperatur) og følelse af svaghed, især når du står op.

Andre bivirkninger kan være:

Meget almindelig (kan påvirke 1 ud af 10):

- brændende eller sviende fornemmelse, fotofobi/lysfølsomhed eller en fornemmelse af, at der er noget i ens øje (overfladisk punktvisk keratopati).
Dette forsvinder med det samme igen, og betyder ikke at behandlingen skal stoppes.

Ikke almindelig (kan påvirke 1 ud af 100):

- forbigående mild sviende eller brændende fornemmelse, umiddelbart efter påføring
- opsvulmede, løbende øjne (øjenkatar).

Sjælden (kan påvirke 1 ud af 1000):

- opsvulmede, røde, irriterede, kløende øjenlåg (blefaritis (øjenlågsbetændelse)).

Kontakt venligst din læge eller apotekspersonalet, hvis nogen af disse bivirkninger forværres, eller hvis du oplever bivirkninger, der ikke er opført i denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.
Holdbarhed efter anbud: 28 dage.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Okicare indeholder:

- Aktivt stof: aciclovir. 1 g salve indeholder 30 mg aciclovir.
- Øvrige indholdsstoffer: blød hvid paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser

1 pakning indeholder en aluminiumstube med en polyetylenhætte og polyetylenkanyle (en spids), der indeholder 4,5 g hvid til hvidgrå øjensalve.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2021.