

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cortinova B

15 mg/ml + 5 mg/ml + 1 mg/ml øjen- og øredråber, suspension

hydrocortisonacetat + oxytetracyclinhydrochlorid + polymyxin B sulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cortinova B
3. Sådan skal du bruge Cortinova B
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Cortinova B er et øjen- og øremiddel med binyrebarkhormon og antibiotika i kombination. Cortinova B dæmper betændelse samt kløe og forhindrer bakteriernes vækst.

Du kan bruge dette lægemiddel til behandling af:

- betændelse i øjet.
- øregangseksem.
- betændelser i den ydre øregang.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CORTINOVA B

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Cortinova B:

- hvis du er allergisk over for hydrocortison, oxytetracyclin, polymyxin B eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cortinova B (angivet i punkt 6).
- hvis du har betændelse (infektion) med virus (f.eks. herpes) eller svamp i øjenomgivelserne eller i ørerne.
- hvis du har øjenbetændelse med en særlig bakterie (mykobakterie).
- hvis du skal vaccineres. Tal med lægen.
- hvis du har fået fjernet et fremmedlegeme fra hornhinden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Cortinova B.

Tal med lægen, hvis du

- ikke hurtigt får det bedre eller hvis betændelsen bliver værre.
- får irritation i øjet/øret efter behandling med Cortinova B.
- oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Vær opmærksom på følgende:

- Du må ikke bruge dråberne i øret, hvis du har hul på trommehinden. Tal med lægen.
- Du må ikke bruge kontaktlinser under behandling med Cortinova B.
- Du må kun bruge Cortinova B til børn under 8 år efter aftale med lægen.
- Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Cortinova B. Tal med lægen.
- Cortinova B kan misfarve tøj.

Langvarig brug af Cortinova B i øjet kan give:

- Forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
- Uklarhed i øjets linse (grå stær).
- Virkningen af Cortinova B kan forringes, og dermed kan risikoen for nye infektioner i øjet blive større.

Brug af anden medicin sammen med Cortinova B

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Cortinova B øjendråber og det andet præparat.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Cortinova B efter aftale med lægen.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Cortinova B er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cortinova B kan sløre synet lige efter brug. Vent med at køre bil eller andet køretøj og betjene maskiner, til dit syn er helt klart igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CORTINOVA B


Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tube åbnes på følgende måde:

Tube er forseglet. Når tube skal anvendes for første gang, skal hele tubespidsen skrues af og den inderste ring fjernes.

Skru derefter tubespidsen fast igen så forseglingen på tube brydes.

Derefter kan den øverste tubespids skrues af og tube er klar til brug.



Den anbefalede dosis er

Voksne:

Øjne: 1-2 dråber i øjet 3 gange dagligt.

Ører: 2-4 dråber i øret 3 gange dagligt.

Brugsanvisning

Omryst tube før brug.

Tubespidsen må ikke røre det betændte øje eller øre.

Brug til børn

Du må kun bruge Cortinova B til børn under 8 år efter aftale med lægen.

Hvis du har brugt for meget Cortinova B

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Cortinova B øjen- og øredråber, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Cortinova B

Hvis du har glemt en dosis, så brug dosis så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Brug aldrig dobbeltdosis.

Hvis du holder op med at tage Cortinova B

Det er meget vigtigt, at du gennemfører behandlingen, indtil du er fuldstændigt rask. Ellers kan betændelsen blusse op.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger ved behandling af øjne:

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

- Skade på hornhinden efter langvarig brug. Kontakt lægen.
- Hovedpine, kvalme, synsændelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær) efter langvarig brug. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

- Virusbetændelse i hornhinden.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- Hul i hornhinden. Kontakt lægen.
- Sløret syn.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
- Smerter i øjet.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- Sløret syn.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Problemer med synet pga. skader på synsnerven. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Overfølsomhed.
- Brændende fornemmelse i øjet.
- Øget tåreflåd.
- Kontakteksem.
- Smerte, følelse af fremmedlegeme.
- Tilstødende bakterieinfektioner og/eller svampeinfektioner, som du ikke kan behandle med Cortinova B.
- Langsom heling af sår i øjet.

Bivirkninger ved behandling af ører:

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- Sløret syn.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Langsom heling af sår i øret.
- Kontakteksem.
- Tilstødende bakterieinfektioner og/eller svampeinfektioner, som du ikke kan behandle med Cortinova B.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Cortinova B utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
- Må ikke opbevares koldt.
- Efter åbning af tuben skal dråberne bruges inden for 1 måned.
- Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.
- Brug ikke Cortinova B efter den udløbsdato, der står på æsken (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Cortinova B indeholder:

- Aktive stoffer: Hydrocortisonacetat 15 mg/ml, oxytetracyclinhydrochlorid 5 mg/ml og polymyxin B sulfat 1 mg/ml.
- Øvrige indholdsstoffer: Aluminiumtristearat og paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelser:

Cortinova B er en gul til beige suspension.

Cortinova B findes i en pakning der indeholder 1 tube på 5 ml, forsynet med en tubespids.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Stationsalleen 42, 1. sal

2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack A/S

Stationsalleen 42, 1. sal

DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2022.