

Indlægsseddel: Information til brugeren

Loratadin Teva 10 mg tabletter

loratadin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Teva
3. Sådan skal du tage Loratadin Teva
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

Loratadin Teva indeholder det aktive stof loratadin, der tilhører en gruppe lægemidler kendt som "antihistaminer"

Virkning

Loratadin Teva er medvirkende til at reducere allergiske symptomer ved at forhindre virkningen af "histamin", som produceres i kroppen, når der er noget, du er allergisk overfor.

Hvornår Loratadin Teva skal tages

Loratadin Teva lindrer symptomer, som er forbundet med allergisk rhinit, (f.eks høfeber), såsom nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne hos voksne og børn over 6 år, der vejer mere end 30 kg.

Loratadin Teva kan også lindre symptomer på nældefeber (kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Virkningen af Loratadin Teva holder en hel dag og er medvirkende til, at du kan opretholde de daglige aktiviteter samt få din nattesøvn.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Loratadin Teva

- hvis du er allergisk over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Loratadin Teva, hvis:

- du har en leversygdom
- du skal have taget en hudprøvetest for allergi. Tag ikke Loratadin Teva i to dage før, du skal have foretaget denne test. Dette skyldes, at det kan påvirke testresultatet.

Hvis noget af ovenstående passer på dig (eller hvis du er i tvivl), så kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Loratadin Teva.

Børn

Giv ikke Loratadin Teva til børn under 6 år eller til børn, der vejer 30 kg eller derunder. Der er andre formuleringer, der er mere egnede til børn under 6 år, eller som vejer 30 kg eller derunder.

Børn under 2 år:

Loratadins sikkerhed og virkning er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Brug af andre lægemidler sammen med Loratadin Teva

Der kan være en stigning i bivirkningerne med Loratadin Teva, når det anvendes sammen med lægemidler, der ændrer virkningen af nogle enzymer ansvarlig for lægemiddelmetabolisme i leveren. I kliniske undersøgelser sås imidlertid ingen stigning i bivirkningerne med loratadin i forbindelse med lægemidler, der ændrer virkningen af disse enzymer.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept.

Brug af Loratadin Teva sammen med alkohol

Effekten af alkoholiske drikke forstærkes ikke, når du tager Loratadin Teva.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Af sikkerhedsmæssige grunde bør du undgå at tage Loratadin Teva under graviditet. Tag ikke Loratadin Teva, hvis du ammer. Loratadin udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Loratadin Teva kan virke sløvende eller medføre svimmelhed. Lad være med at køre bil eller betjene maskiner, hvis du er påvirket.

Loratadin Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Loratadin Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn i alderen 6 år og derover, som vejer mere end 30 kg:

1 tablet 1 gang dagligt sammen med et glas vand, med eller uden mad.

Hvis barnet vejer 30 kg eller derunder:

Giv ikke Loratadin Teva. Der er andre formuleringer, der er mere egnede til børn under 6 år, eller som vejer 30 kg eller derunder.

Børn under 2 år:

Børn under 2 år må ikke få Loratadin Teva.

Voksne og børn med alvorlige leversygdomme:

Voksne og børn, der vejer over 30 kg

1 tablet 1 gang hver anden dag sammen med et glas vand, med eller uden mad. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager dette lægemiddel.

Hvis du har taget for meget Loratadin Teva

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Loratadin Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Der forventes ingen alvorlige konsekvenser, men du kan få hovedpine, hurtig hjerterytme eller føle dig søvnig.

Hvis du har glemt at tage Loratadin Teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Dernæst skal du fortsætte, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel Teva kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold **straks** op med at tage medicinen, og kontakt omgående lægen eller tag på nærmeste skadestue, hvis du får et eller flere af følgende symptomer:

- allergiske reaktioner såsom hævelse af læber, tunge eller ansigt
- besvær med at trække vejret og allergiske reaktioner (flade, sviende, kløende mærker på huden med hævelser)
- hævelse af hud og slimhinder.

Der er tale om meget alvorlige bivirkninger, og hvis du får dem, kan du have fået en alvorlig allergisk reaktion. Du kan få brug for akut lægehjælp eller indlæggelse.

Almindelige bivirkninger hos voksne og børn over 12 år (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

- døsighed

Yderligere bivirkninger hos børn i alderen 2 til 12 år:

- hovedpine
- nervøsitet
- træthed.

Ikke almindelige bivirkninger hos voksne og børn over 12 år (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

- hovedpine
- øget appetit
- søvnproblemer.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

- svimmelhed
- kramper
- uregelmæssig eller hurtig puls
- kvalme
- mundtørhed
- mavebesvær
- leverproblemer
- hårtab
- udslæt
- træthed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- vægtforøgelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke Loratadin Teva efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Loratadin Teva indeholder:

- Aktivt stof: loratadin. Hver tablet indeholder 10 mg loratadin.
- Øvrige indholdsstoffer:
lactosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, majsstivelse og magnesiumstearat. Indeholder lactose (se punkt 2).

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er hvide, runde, bikonvekse tabletter med en buet delekærv på den ene side. Tabletterne kan deles i to lige store halvdele.

Medicinen fås i blisterpakninger, der indeholder 2, 7, 10, 14, 20, 20x1, 21, 28, 30, 50, 100 eller 100x1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tlf.: 44 98 55 11
E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under følgende navne:

Denmark	Loratadin Teva
Finland	Loratadin-ratiopharm 10 mg tabletti

Norge	Loratadin ratiopharm
Portugal	Loratadina ratiopharm 10 mg, comprimidos
Spanien	Loratadina ratiopharm 10 mg comprimidos EFG
Sverige	Loratadin ratiopharm, 10 mg, tablett

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2023.