

Indlægsseddel: Information til brugeren

Visc-Ophtal 2 mg/g, øjengel

carbomer

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets eller anvisning.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Visc-Ophtal
3. Sådan skal du bruge Visc-Ophtal
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Visc-Ophtal er en kunstig tårevæske (gel med carbomer), som anvendes ved nedsat tåre- eller slimproduktion (tørhed i øjnene). Visc-Ophtal fugter øjet og danner en beskyttende hinde, som kan vare i op til 6 timer.

Visc-Ophtal kan fås uden recept.

2. Det skal du vide før du begynder at bruge Visc-Ophtal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Visc-Ophtal

- Hvis du er allergisk over for carbomer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Visc-Ophtal (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Visc-Ophtal.

Hvis du oplever øjensmerter, synsforandringer, øjenirritation, vedvarende rødme, eller hvis tilstanden forværres eller varer ved, skal du holde op med at bruge Visc-Ophtal og kontakte lægen.

Børn og unge under 18 år

Sikkerhed og virkning af Visc-Ophtal hos børn og unge i den dosering, der er anbefalet til voksne, er klarlagt i forbindelse med klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske forsøg.

Brug af anden medicin sammen med Visc-Ophtal

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Visc-Ophtal kan anvendes under graviditet og i ammeperioden

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt Visc-Ophtal, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

Visc-Ophtal indeholder cetrimid

Hvis du bruger kontaktlinser:

Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Visc-Ophtal og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

Visc-Ophtal indeholder cetrimid, som kan give øjenirritation og er kendt for at misfarve bløde kontaktlinser.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.

3. Sådan skal du bruge Visc-Ophtal

Brug altid Visc-Ophtal nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets eller anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 dråbe 3-4 gange daglig i hvert øje efter behov.

Børn og unge under 18 år


Sikkerhed og virkning af Visc-Ophtal hos børn og unge i den dosering, der er anbefalet til voksne, er klarlagt i forbindelse med klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske forsøg.

Bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning.

Brug kun Visc-Ophtal til at dryppe i øjet/øjnene.

Sådan skal du bruge Visc-Ophtal

1. Hent Visc-Ophtal-tuben.
2. Vask dine hænder og sæt dig evt. foran et spejl.
3. Skru låget af tuben.
4. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad med en ren finger.
5. Hold tubetubespiden tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
6. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med tubespiden. Det kan forurene gelen i tuben.
7. Hold tuben lodret med spidsen pegende nedad (se billedet) – der ved dannes der en lille dråbe på spidsen og dråben dryppes i øjet (mellem nedre øjenlåg og øjet).
8. Hvis du bruger Visc-Ophtal i begge øjne, gentages trinene 4-7 for det andet øje.
9. Skru til sidst låget på tuben umiddelbart efter brug



Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen.

Hvis du bruger andre øjendråber, øjensalve eller gelpræparater samtidig med Visc-Ophtal, så vent mindst 5 minutter mellem Visc-Ophtal og de øvrige øjenpræparater. Øjensalver og -geler (Visc-Ophtal) skal altid tages sidst.

Hvis du har brugt for meget Visc-Ophtal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Visc-Ophtal, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der forventes ingen bivirkninger med Visc-Ophtal.

Hvis du har glemt at bruge Visc-Ophtal

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan opleve følgende reaktioner i dine øjne:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Sløret syn,

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Ubehag i øjet, skorper på kanten af øjenlåget, øjenirritation

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Hævelse i øjet, øjensmerter, kløe i øjet, rødme i øjet, øget tåreproduktion.

Eller reaktioner i andre dele af kroppen:

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden

Hyppighed ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

Reaktioner i andre dele af kroppen: Allergi (overfølsomhed).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Tuben skal kasseres 4 uger efter åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Visc-Ophtal indeholder:

- Aktivt stof: carbomer. Hvert gram gel indeholder: 2 mg carbomer.
- Øvrige indholdsstoffer: cetrimid (konserveringsmiddel), natriumhydroxid (til justering af pH), sorbitol (E 420) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Visc-Ophtal er en klar, farveløs gel, der leveres i 10 g tuber.

Pakningsstørrelser: 1 x 10 g og 3 x 10 g

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Visc-Ophtal også som Viscotears.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2022