



Indlægsseddel: Information til brugeren

Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin B **15 mg/ml / 5 mg/ml / 1 mg/ml** **Øjen- og øredråber, suspension** **hydrocortisonacetat/oxytetracyclinhydrochlorid/polymyxin B sulfat**

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge dette lægemiddel
3. Sådan skal De bruge dette lægemiddel
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B er et øjen- og øremiddel med binyrebarkhormon og antibiotika i kombination.

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B dæmper betændelse samt kløe og forhindrer bakteriernes vækst.

De kan bruge dette lægemiddel til behandling af:

- betændelse i øjet.
- øregangseksem.
- betændelser i den ydre øregang.

Lægen kan have givet Dem dette lægemiddel for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder af bruge dette lægemiddel

Brug ikke dette lægemiddel hvis De

- er allergisk over for hydrocortison, oxytetracyclin, polymyxin B eller et af de øvrige indholdsstoffer anført i punkt 6.

- har betændelse (infektion) med virus (f.eks. herpes) eller svamp i øjenomgivelserne eller i ørerne.
- har øjenbetændelse med en særlig bakterie (mykobakter).
- har fået fjernet et fremmedlegeme fra hornhinden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B.

Tal med lægen, hvis De

- ikke hurtigt får det bedre eller hvis betændelsen bliver værre.
- får irritation i øjet/øret efter behandling med Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B.
- oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Vær opmærksom på følgende:

- De må ikke bruge dråberne i øret, hvis De har hul på trommehinden. Tal med lægen.
- De må ikke bruge kontaktlinser under behandling med Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B.
- De må kun bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen.
- Hvis De er gravid, skal De normalt ikke bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B. Tal med lægen.
- Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B kan misfarve tøj.

Langvarig brug af Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B i øjet kan give:

- Forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
- Uklarhed i øjets linse (grå stær).
- Virkningen af Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B kan forringes, og dermed kan risikoen for nye infektioner i øjet blive større.

Brug af anden medicin sammen med Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B øjendråber og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis De er gravid, må De kun bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B efter aftale med lægen.

Amning:

De skal stoppe med at amme, hvis behandling med Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B kan sløre synet lige efter brug. Vent med at køre bil eller andet køretøj og betjene maskiner, til Deres syn er helt klart igen.

3. Sådan skal De bruge dette lægemiddel


Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tuben åbnes på følgende måde:

Tuben er forseglet. Når tuben skal anvendes for første gang, skal hele tubespidsen skrues af og den inderste ring fjernes.

Skrue derefter tubespidsen fast igen så forseglingen på tuben brydes.

Derefter kan den øverste tubespids skrues af og tuben er klar til brug



Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Øjne: 1-2 dråber i øjet 3 gange dagligt.

Ører: 2-4 dråber i øret 3 gange dagligt.

Brugsanvisning

Omryst tuben før brug.

Tubespidsen må ikke røre det betændte øje eller øre.

Børn

De må kun bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B til børn under 8 år efter aftale med lægen.

Hvis De har brugt for meget Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B øjen- og øredråber, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Hvis De har glemt at bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B

Hvis De har glemt at bruge en dosis, så brug denne så snart, De kommer i tanker om det. Hvis De snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Brug aldrig dobbeltdosis.

Hvis De holder op med at bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B

Det er meget vigtigt, at De gennemfører behandlingen, indtil De er fuldstændigt rask. Ellers kan betændelsen blusse op.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger ved behandling af øjne:

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

- Skade på hornhinden efter langvarig brug. Kontakt lægen.
- Hovedpine, kvalme, synsnedsettelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær) efter langvarig brug. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

- Virusbetændelse i hornhinden.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- Hul i hornhinden. Kontakt lægen.
- Sløret syn

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
- Smerter i øjet.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- Sløret syn

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Problemer med synet pga. skader på synsnerven. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Overfølsomhed.
- Brændende fornemmelse i øjet.
- Øget tåreflåd.
- Kontakteksem.
- Smerte, følelse af fremmedlegeme.
- Tilstødende bakterieinfektioner og/eller svampeinfektioner, som De ikke kan behandle med Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B.
- Langsom heling af sår i øjet.

Bivirkninger ved behandling af ører:

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- Sløret syn

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Langsom heling af sår i øret.
- Kontakteksem.
- Tilstødende bakterieinfektioner og/eller svampeinfektioner, som De ikke kan behandle med Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Brug ikke Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Efter åbning af tuben må De kun bruge Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B i en måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B 15 mg/ml / 5 mg/ml / 1 mg/ml indeholder:

- Aktive stoffer: Hydrocortisonacetat; oxytetracyclinhydrochlorid; polymyxin B sulfat.
- Øvrige indholdsstoffer: aluminiumtristearat; paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelser:**Udseende**

Hydrocortison med Terramycin og Polymyxin B er en gul til beige suspension.

Pakningsstørrelser

Hver pakning indeholder én tube på 5 ml forsynet med en tubespids.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:**Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Pfizer ApS
Lautrupvang 8

2750 Ballerup

Fremstiller:

Farmasierra Manufacturing, S.L.

Carretera de Irún, Km. 26, 200

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Spanien

Denne indlægsseddel blev senest opdateret januar 2023.