

01-2025
P529820-2

Indlægsseddel: Information til brugeren
Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla 25 mikrogram/250 mikrogram/dosis
inhalationsspray, suspension
salmeterol/fluticasonpropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla
3. Sådan skal du bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla indeholder to slags lægemidler; salmeterol og fluticasonpropionat:

- Salmeterol tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes langtidsvirkende bronkodilatorer. De hjælper med at holde luftvejene i lungerne åbne, hvilket gør det nemmere at trække vejret. Virkningen holder i mindst 12 timer.
- Fluticasonpropionat tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes kortikosteroider, der mindsker hævelse og irritation i lungerne.

Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla er ikke anbefalet til børn.

Lægen har ordineret dette lægemiddel for at forebygge vejrtrækningsproblemer som f.eks. astma.

Du skal bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla hver dag som anvist af lægen for at være sikker på, at din astma kommer under kontrol.

Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla forebygger åndenød og hvæsende vejrtrækning, men må ikke bruges til lindring af pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Hvis det sker, skal du bruge en hurtigtvirkende behovs-inhalator, f.eks. salbutamol. Du bør altid have din behovs-inhalator på dig.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla

- hvis du er allergisk over for salmeterol, fluticasonpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla, hvis du har:

- en hjertesygdom, herunder uregelmæssig eller hurtig hjerteslag
- overaktiv skjoldbruskkirtel
- forhøjet blodtryk
- sukkersyge (Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla kan forhøje dit blodsukker)
- lavt indhold af kalium i blodet
- nuværende tuberkulose, eller tidligere har haft det, eller andre infektioner i lungerne.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af andre lægemidler sammen med Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Hvis du bruger et eller flere af følgende lægemidler, skal du fortælle det til lægen, inden du begynder at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla:

- betablokkere (f.eks. atenolol, propranolol og sotalol). Betablokkere bruges primært til behandling af forhøjet blodtryk eller andre hjertesygdomme.
- lægemidler til behandling af infektioner inklusive visse former for HIV-medicin (f.eks. ritonavir, cobicistat, ketoconazol, itraconazol, telithromycin og erythromycin). Nogle af disse typer af lægemidler kan øge mængden af fluticasonpropionat eller salmeterol i kroppen. Det kan øge risikoen for bivirkninger ved Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla, herunder uregelmæssig hjerterytme, eller det kan forværre bivirkningerne. Det kan være, at din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler.

- kortikosteroider (som tabletter eller injektion). Hvis du for nylig har fået kortikosteroider, kan det øge risikoen for, at dette lægemiddel kan påvirke din hormonproduktion.
- diuretika ("vanddrivende lægemiddel"), der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk.
- andre bronkodilatorer (som f.eks. salbutamol).
- lægemidler, der indeholder xanthiner. Disse lægemidler anvendes ofte til behandling af astma.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla påvirker sandsynligvis ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

- Brug Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla hver dag, indtil lægen siger, at du skal stoppe. Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
- Du må ikke stoppe med at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla eller nedsætte din dosis af Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla uden først at tale med lægen.
- Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla skal inhaleres gennem munden ned i lungerne.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og unge fra 12 år: 2 inhalationer 2 gange dagligt

Hvis dine symptomer er velkontrollerede ved at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla 2 gange dagligt, kan din læge beslutte at nedsætte din dosis til 1 gang dagligt. Dosis kan ændres til:

- 1 inhalation ved sengetid – hvis du har symptomer **om natten**
- 1 inhalation om morgenen – hvis du har symptomer **om dagen**.

Det er meget vigtigt, at du følger lægens anvisninger om antallet af inhalationer, og hvor ofte du skal bruge dit lægemiddel.

Hvis du bruger Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla mod astma, vil lægen regelmæssigt kontrollere dine symptomer.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.

Kontakt straks lægen, hvis din astma bliver værre, eller hvis din vejrtrækning bliver dårligere.

Hvis din vejrtrækning er blevet mere hvæsende, hvis du oftere får en fornemmelse af, at din brystkasse snævrer sig sammen, eller hvis du har brug for mere af din hurtigvirkende anfallsmedicin, skal du fortsætte med at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla, men uden at øge antallet af inhalationer, da det kan føre til en forværring af din tilstand, og du kan blive alvorlig syg. Kontakt lægen, da du måske har brug for yderligere behandling.

Brug til børn

Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla er ikke anbefalet til børn.

Brugsvejledning

- 1 etiket er vedlagt i æsken til påsætning på plastikhylstret, når folieposen åbnes.
- Få lægen eller apotekspersonalet til at vise dig, hvordan du skal bruge din inhalationsspray. De bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger din Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla rigtigt eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke hjælper på din astma, som den skal.
- Lægemidlet er i en trykbeholder, monteret i et plastikhylster med mundstykke.
- Der er dosistæller på inhalationssprayen, der viser, hvor mange doser der er tilbage. Når du bruger inhalationssprayen, vil dosistælleren typisk dreje rundt under hver 5-7. inhalation og tælle ét tal ned. Dosistælleren viser, hvor mange inhalationer der cirka er tilbage i inhalationssprayen.
- Pas på ikke at tabe inhalationssprayen, da det kan få dosistælleren til at tælle ned.


Test af inhalationssprayen

1. Når du bruger din inhalationsspray for første gang, skal du tjekke, at den virker. Tag beskyttelseshætten af ved at klemme let på siderne med tommel- og pegefinger og trække den af.
2. Ryst inhalationssprayen grundigt, og vend mundstykket væk fra dig, og tryk 4 pust ud i luften. Ryst inhalationssprayen før hvert pust. Dosistælleren står på 120, som er antallet af pust i inhalationssprayen. Tryk 2 pust ud i luften, hvis inhalationssprayen ikke har været brugt i en uge eller mere.

Sådan bruger du inhalationssprayen


Det er vigtigt, at du trækker vejret så langsomt som muligt, lige før du skal bruge din inhalationsspray.

1. Du skal sidde ret op eller stå op, når du bruger din inhalationsspray.
2. Fjern beskyttelseshætten (som beskrevet i trin 1 under Test af inhalationssprayen). Sørg for, at mundstykket er rent både indvendigt og udvendigt, og at der ikke sidder noget i det (figur A).




Figur A

3. Ryst inhalationssprayen 4-5 gange for at sikre, at der ikke er løse genstande, og for at indholdet i inhalationssprayen bliver blandet ordentligt (figur B).




Figur B

4. Hold inhalationssprayen lodret med tommelfingeren på beholderen under mundstykket. Pust ud, så meget du kan uden at føle ubehag (figur C).




Figur C

5. Sæt mundstykket i mellem tænderne og lad læberne slutte tæt omkring det uden at bide i mundstykket (figur D).



Figur D

6. Træk vejret gennem munden, langsomt og dybt. Tryk hårdt ned på beholderen i starten af en indånding for at afgive et pust lægemiddel. Inhalér dosis roligt og dybt (figur D).
7. Hold vejret, tag inhalationssprayen ud af munden, og fjern fingeren fra inhalationssprayens øverste del. Hold fortsat vejret i nogle få sekunder eller så lang tid, som det er behageligt (figur E).



Figur E

8. Vent ca. ½ minut mellem hvert pust, og gentag så trin 3-7.
9. Skyl munden med vand og spyt ud og/eller børst tænder bagefter. Dette hjælper med til at modvirke svamp i munden og hæshed.
10. Sæt altid beskyttelseshætten på mundstykket igen straks efter brug for at undgå støv og fnug. Hvis beskyttelseshætten sættes rigtigt på, vil den 'klikke' på plads. Hvis den ikke 'klikker' på plads, kan du prøve igen ved at dreje beskyttelseshætten den anden vej rundt. Undgå at bruge for mange kræfter.

Vær omhyggelig med trin 4, 5, 6 og 7. Det er vigtigt, at du trækker vejret ind så langsomt som muligt, lige før du skal bruge din inhalationsspray. Øv dig foran et spejl de første par gange. Hvis du kan se, at der kommer en "sky" op af inhalationssprayen eller ud ved mundvigene, skal du begynde forfra fra trin 3.

Hvis du har svært ved at bruge inhalationssprayen, kan lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet anbefale, at du bruger en såkaldt spacer, såsom Volumatic eller AeroChamber Plus eller lignende spacer sammen med din inhalationsspray. Lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet bør vise dig, hvordan du bruger spaceren sammen med din inhalationsspray, og hvordan du skal rengøre den, og de kan svare på dine spørgsmål. Hvis du bruger en spacer sammen med din inhalationsspray, er det vigtigt, at du ikke stopper med at bruge den uden først at tale med lægen. Det er også vigtigt, at du ikke skifter spacer-mærke uden at tale med lægen. Hvis du stopper med at bruge spacer eller skifter mærke, kan det være nødvendigt, at lægen ændrer din dosis af lægemidlet for at holde din astma under kontrol.

Kontakt altid lægen, før du ændrer noget i forbindelse med din astmabehandling.

For personer med svage hænder kan det være lettere at holde inhalationssprayen med begge hænder. I så fald placeres begge pegefingre på toppen af inhalationssprayen og begge tommelfingre på bunden under mundstykket.

Når dosistælleren står på '40', og farven på dosistælleren skifter fra grøn til rød, bør du købe en ny inhalationsspray. Stop med at bruge din inhalationsspray, når dosistælleren viser '0', da eventuelt resterende pust måske ikke giver en fuld dosis. Prøv aldrig at ændre tallet i dosistælleren eller på at fjerne dosistælleren fra metalbeholderen. Dosistælleren kan ikke nulstilles og er fastgjort permanent til metalbeholderen.

Rengøring af inhalationssprayen

For at undgå tilstopning af inhalationssprayen er det vigtigt at rengøre den mindst én gang om ugen.

Sådan rengøres inhalationssprayen:

- Fjern beskyttelseshætten.
- Fjern aldrig metalbeholderen fra plastikhylstret.
- Tør mundstykket indvendigt og udvendigt, og tør plastikhylstret med en tør klud eller en serviet.
- Sæt beskyttelseshætten på igen. Den vil 'klikke' på plads, hvis den sættes rigtigt på. Hvis den ikke 'klikker' på plads, kan du prøve igen ved at dreje beskyttelseshætten den anden vej rundt. Undgå at bruge for mange kræfter.

Metalbeholderen må ikke komme i vand.

Hvis du har brugt for meget Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Du kan opleve, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, og du kan føle dig urolig. Du kan også blive svimmel, få hovedpine eller føle dig svag i musklerne og få ømme led.

Hvis du har taget en for høj dosis i en længere periode, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet. Det skyldes, at store doser af Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla kan nedsætte den mængde af steroidhormoner, der bliver dannet i binyrerne.

Hvis du har glemt at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal bare tage din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla

Det er meget vigtigt, at du bruger din Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla hver dag som ordineret. **Bliv ved med at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla, indtil lægen siger, at du skal stoppe. Du må ikke stoppe med at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla eller nedsætte dosis pludseligt, da dette kan forværre din vejrtrækning.**

Hvis du pludseligt stopper med at bruge din Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla eller nedsætter din dosis, kan det desuden (meget sjældent) give dig problemer med din skjoldbruskkirtel (binyrebarkinsufficiens), som nogle gange kan give bivirkninger.

Disse bivirkninger kan omfatte en eller flere af følgende:

- mavesmerter
- træthed og appetitløshed, kvalme
- opkastning
- vægttab
- hovedpine eller døsighed
- nedsat sukkerindhold i blodet
- lavt blodtryk og krampeanfald.

Hvis din krop udsættes for en stresstilstand, f.eks. ved feber, traume (f.eks. efter en bilulykke), infektion eller efter operation, kan der forekomme forværring af binyrebarkinsufficiens, og du kan opleve nogle af bivirkningerne nævnt ovenfor.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever nogle af disse bivirkninger. For at undgå dette kan lægen eventuelt ordinere yderligere behandling med binyrebarkhormoner i tabletform (som f.eks. prednisolon).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For at reducere risikoen for bivirkninger vil lægen ordinere den laveste dosis af Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla, som kan holde din astma under kontrol.

Allergiske reaktioner: Du mærker måske, at du pludseligt får sværere ved at trække vejret umiddelbart efter, at du har brugt din Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla. Din vejrtrækning kan blive hvæsende, du hoster, eller du bliver stakåndet. Du kan muligvis også mærke, at det klør, at du får udslæt (nældefeber), og at du hæver op (sædvanligvis i ansigtet, på læberne, tungen eller i svælget), eller du kan pludselig opleve, at dit hjerte slår meget hurtigt, eller du føler dig svimmel og ør (kan føre til kollaps eller besvimelse). **Hvis du oplever dette, eller hvis symptomerne opstår pludseligt, efter du har brugt din Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla, skal du stoppe med at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla og straks kontakte lægen.** Allergiske reaktioner over for Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede).

Andre bivirkninger er angivet herunder:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

- hovedpine - aftager som regel ved fortsat behandling.
- øget antal forkølelser er set hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

- svamp (ømmе, hvidgullige, hævede pletter) i mund og svælg, ømhed i tunge, hæshed og irritation i svælget. Dette kan afhjælpes ved straks at skylle munden med vand og spytte ud og/eller børste tænder lige efter hver dosis lægemiddel. Lægen kan ordinere lægemidler til behandling af svamp.
- ømme, hævede led og muskelsmerter.
- muskelkramper.

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL):

- lungebetændelse og bronkitis (lungeinfektion). Kontakt lægen, hvis du får et eller flere af følgende symptomer: øget spyttproduktion, ændret farve af spyttet, feber, kuldegysninger, øget hoste, øgede vejrtrækningsproblemer.
- blå mærker og knoglebrud.
- bihulebetændelse (følelse af tilstoppethed eller trykken i næsen, kinderne og bag øjnene - af og til med en dunkende smerte).
- nedsat kaliumindhold i blodet (kan give uregelmæssig hjerterebanken, muskelsvaghed, krampe).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

- forhøjet blodsukker (hyperglykæmi). Hvis du har sukkersyge, kan det være nødvendigt at kontrollere dit blodsukker hyppigere og eventuelt justere doseringen af din sukkersygemedicin.
- grå stær (uklart syn).
- meget hurtig puls (takykardi) og uregelmæssig puls (atrieflimren).
- rysten (tremor) og hurtig og uregelmæssig hjerterebanken (palpitationer). Disse bivirkninger er som regel uskadelige og aftager ved fortsat behandling.
- brystmerter (angina pectoris) og åndenød.
- angst (forekommer især hos børn).
- søvnforstyrrelser.
- allergisk hududslæt.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

- **vejrtrækningsproblemer eller hvæsende åndedræt, der forværres umiddelbart efter inhalation af Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla.** Hvis dette sker, **skal du stoppe med at bruge din Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla.** Brug din hurtigtvirkende behovsmedicin, og **kontakt straks lægen.**
- Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i kroppen, især efter indtagelse af høje doser i længere perioder. Det kan føre til:
 - nedsat vækst hos børn og unge
 - svækkelse af knoglerne
 - forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 - rundt ansigt ("måneansigt") (Cushings syndrom).Lægen vil jævnligt tjekke dig for disse bivirkninger og sikre, at du får Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla i den laveste dosis, der kan holde din astma under kontrol.
- ændret adfærd, herunder hyperaktivitet og irritabilitet (forekommer især hos børn).
- uregelmæssig hjerterytme eller hjertet slår et ekstra slag (arytmi). Tal med lægen, men stop ikke med at bruge Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla, medmindre lægen siger det.
- svampeinfektion i spiserøret, der kan medføre synkebesvær.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data), men som kan forekomme:

- depression eller aggression. Dette forekommer med større sandsynlighed hos børn.
- sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Sæt beskyttelseshætten fast på mundstykket igen og klik den på plads.

Beholderen indeholder væske under tryk.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.

Beholderen må ikke punkteres.

Som med de fleste inhalerede lægemidler i trykbeholdere kan den terapeutiske virkning af lægemidlet blive forringet, når beholderen er kold.

Brug ikke Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla efter den udløbsdato, der står på beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla indeholder:

– Aktive stoffer: salmeterol og fluticasonpropionat.

Hver afmålt dosis afgiver 25 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 250 mikrogram fluticasonpropionat (indgivet fra ventilen). Dette svarer til 21 mikrogram salmeterol og 220 mikrogram fluticasonpropionat indgivet fra aktuator (afgivet dosis).

– Øvrige indholdsstoffer: norfluran (HFA 134a).

Udseende og pakningsstørrelser

Inhalationssprayen er forseglet i en aluminiumspose med et tørremiddel (silicagel). Inhalationssprayen består af en aluminiumsbeholder med en doseringsventil, en plastik aktiveringsdel med dosistæller og en beskyttelsehætte.

1 inhalationsspray indeholder 120 doser.

Salmeterol/Fluticasonpropionat Cipla fås i pakningsstørrelser á 120 eller 360 (3 x 120) doser inhalationsspray, suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4, Stenhuggervej 12, 6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4, Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2025.