

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atenolol Epione Medicine 50 mg tabletter

atenolol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atenolol Epione Medicine
3. Sådan skal du tage Atenolol Epione Medicine
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atenolol Epione Medicine er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker). Atenolol Epione Medicine virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen.

Atenolol Epione Medicine anvendes til behandling af:

- Forhøjet blodtryk.
- Uregelmæssig hurtig hjerterytme.
- Forebyggelse af hjertekrampe (angina pectoris).
- Blodprop i hjertet.
- Forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atenolol Epione Medicine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Atenolol Epione Medicine hvis du:

- Har sygdom i hjerte og pulsårer. Tal med lægen.
- Har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
- Får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne.
- Er overfølsom over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, hvis du:

- Får meget lav puls.
- Har kolde, hvide og følelsesløse fingre og tæer (Raynauds syndrom).
- Har smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens).
- Får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).
- Har diabetes.
- Har astma.
- Tidligere har haft allergiske reaktioner.
- Eller din nærmeste familie har psoriasis.
- Har en alvorlig leversygdom.
- Har en alvorligt nedsat nyrefunktion.

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Atenolol Epione Medicine.

Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvist over 10–14 dage. Tal med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Atenolol Epione Medicine

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Atenolol Epione Medicine, og Atenolol Epione Medicine kan påvirke virkningen af andre lægemidler.

Tal med lægen, hvis du tager følgende medicin:

- Medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, kinidin, amiodaron, lidocain, methylidopa, hjerteglykosider).
- Medicin mod migræne og hestigninger (clonidin).
- Smertestillende medicin (NSAID), (f.eks. ibuprofen, indometacin).
- Insulin eller tabletter mod diabetes.
- Medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).
- Medicin mod epilepsi (barbiturater).
- Medicin mod psykoser (phenothiaziner).
- Kraftigt smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Atenolol Epione Medicine sammen med mad og drikke

Du kan tage Atenolol Epione Medicine sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Atenolol Epione Medicine. Tal med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Atenolol Epione Medicine, da atenolol bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atenolol Epione Medicine kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Atenolol Epione Medicine indeholder lactose

Atenolol Epione Medicine tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Atenolol Epione Medicine

Tag altid Atenolol Epione Medicine nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Atenolol Epione Medicine 50 mg

Voksne:

- Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris): 1–2 tabletter (50–100 mg) 1 gang daglig.
- Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.
- Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis 1–2 tabletter (50–100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.

Børn: Du må ikke give Atenolol Epione Medicine til børn. Følg lægens anvisninger.

Ældre: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 1 døgn før. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Atenolol Epione Medicine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atenolol Epione Medicine, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, svimmelhed, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsbesvær, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder.

Hvis du har glemt at tage Atenolol Epione Medicine

Hvis du har glemt en dosis Atenolol Epione Medicine, tag den, så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Atenolol Epione Medicine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

- **Sjældne bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker.
Hallucinationer, psykoser. Forværring af hjerteproblemer. Leversygdom. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- **Almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Langsom puls, kolde hænder og fødder. Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse. Muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.
- **Ikke almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Søvnforstyrrelser. Forhøjede levertal.
- **Sjældne bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Forværring af en ikke kendt diabetes. Mareridt, depression, forvirring, angst. Svimmelhed, hovedpine, følelse af brænden, kløen og prikken i huden. Øjentørhed, synsforstyrrelser.
Besvimelse pga. meget lavt blodtryk, smerter i benene, hvide fingre og tæer. Åndenød hos astmatikere.
Mundtørhed. Hårtab, udslæt, mindre blødninger i hud og slimhinder, kløe, forværring af psoriasis. Muskelkrampe. Impotens.
- **Meget sjældne bivirkninger** (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
Nedsat sexlyst. Forøget forekomst af antinukleære antistoffer (ANA).
- **Hypigheden ikke kendt:** For lavt blodsukker, sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, lupus lignende syndrom (tilstand med hududslæt og betændelse i bindevæv, led og organer).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares i den originale emballage for at beskytte indholdet mod lys og fugt.

Opbevar Atenolol Epione Medicine utilgængeligt for børn.

Brug ikke Atenolol Epione Medicine efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atenolol Epione Medicine indeholder:

- Aktivt stof: atenolol 50 mg
- Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse; pregelatineret stivelse; lactosemonohydrat; povidon; natriumlaurylsulfat; silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

- Atenolol Epione Medicine 50 mg tabletter er runde, hvide og hvælvede tabletter mærket henholdsvis "C24"

Pakningsstørrelser

Plastbeholder eller blisterpakning med 30 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Epione Medicine ApS
Kanalholmen 14L
2650 Hvidovre

Fremstiller

Epione Medicine ApS
Kanalholmen 14L
2650 Hvidovre

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Epione Medicine ApS.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2024