

Indlægsseddel: Information til brugeren
Fucidine® 20 mg/g (2%) salve
natriumfusidat

03-2025
P179780-5

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidine
3. Sådan skal du bruge Fucidine
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidine indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden. Du kan bruge Fucidine mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidine virker på.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Fucidine

- hvis du er allergisk over for natriumfusidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidine (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidine.

- Brug ikke Fucidine omkring øjnene, da det kan irritere øjet.
- Som med anden antibiotika kan forlænget brug eller gentagen anvendelse øge risikoen for at udvikle resistens overfor antibiotika.

Brug af andre lægemidler sammen med Fucidine

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Du kan bruge Fucidine sammen med andre lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun bruge Fucidine efter lægens anvisning.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Fucidine.
Du bør dog ikke smøre det på brystet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidine salve påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Fucidine indeholder

butylhydroxytoluen (E321), cetylalkohol og lanolin

Butylhydroxytoluen kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.

Cetylalkohol og lanolin kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Fucidine

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Brug til børn og voksne

Påsmør salven 2-3 gange dagligt.

Hvis du har brugt for meget Fucidine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucidine, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidine.

Hvis du har glemt at bruge Fucidine

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fucidine

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

- Eksem
- Udslæt
- Kløe
- Rødmen af huden
- Smerter på påføringsstedet (herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden)
- Irritation på påføringsstedet

Sjældnen (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

- Overfølsomhed
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd
- Udslæt (nældefeber) og hævelse: Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Nældefeber
- Blærer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidine indeholder:

- Aktivt stof: natriumfusidat. 1 g salve indeholder 20 mg natriumfusidat.
- Øvrige indholdsstoffer: cetylalkohol, vandfrit lanolin, paraffinolie, hvid blød paraffin, butylhydroxytoluen E321 og all-*rac*- α -Tocopherol.

Pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser: 15 g, 30 (2 x 15) g og 30 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Fucidine® svarer til Fucidin®.

Fucidine® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2025.