

Indlægsseddel: Information til brugeren
Lacipil 2 mg og 4 mg filmovertrokkne tabletter
Lacidipin

08-2020
P443084-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacipil
3. Sådan skal du tage Lacipil
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lacipil indeholder det aktive stof lacidipin. Dette tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calciumblokkere. Lacipil får blodkarrene til at slappe af, så de udvides. Herved øges blodgennemstrømningen, og blodtrykket falder. Ved regelmæssig anvendelse af Lacipil efter lægens anvisning kan du sænke forhøjet blodtryk (behandle hypertension).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacipil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Lacipil

- hvis du er allergisk over for lacidipin, andre calciumblokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lacipil (angivet i afsnit 6)
- hvis du har en forsnævring af hjerteklapperne (alvorlig aortastenose).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lacipil.

- hvis du har hjerterytmeforstyrrelse eller andre problemer med hjertet
- hvis du har eller har haft leverproblemer
- hvis du har haft et hjerteanfald inden for den seneste måned, eller hvis du får brystmerter (angina).

Børn og unge

Lacipil anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Lacipil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med Lacipil, eller Lacipil kan påvirke behandlingen med anden medicin. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du samtidig tager:

- medicin mod for højt blodtryk
- antibiotika (f.eks. rifampicin)
- cimetidin – medicin mod bl.a. mavesår/tolvfingertarmsår
- ciclosporin – immundæmpende medicin til behandling af bl.a. transplantationspatienter
- kortikoider eller tetracosactid til behandling af betændelsessygdom i tarmen, Crohns sygdom, leddegigt (arthritis) og betændelse i knogler og led (osteoarthritis).

Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle din læge, at du tager Lacipil, da det kan påvirke resultaterne.

Brug af Lacipil sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Lacipil på tom mave eller sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice.

Du bør normalt ikke drikke alkohol, mens du tager Lacipil, da det kan forstærke virkningen af Lacipil. Tal med lægen.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Bør ikke anvendes under graviditet, uden lægens anvisning.

Amning

Bør ikke anvendes under amning, uden lægens anvisning. Lacipil kan udskilles i modermælken.

Frugtbarhed

Lacipil kan nedsætte frugtbarheden hos mænd. Tal med lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan blive svimmel, når du tager Lacipil. Hvis dette sker, må du ikke køre bil, betjene værktøj og maskiner.

Lacipil indeholder lactose

Lacipil indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Lacipil

Tag altid Lacipil efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Det er vigtigt, at du tager det korrekte antal tabletter på det korrekte tidspunkt på dagen.

- Den anbefalede begyndelsesdosis er 2 mg om dagen, som helst skal tages hver morgen med eller uden mad.
- Efter 3-4 uger kan dosis øges til 4 mg hver morgen.
- Hvis det er nødvendigt, kan dosis øges igen til 6 mg hver morgen, der er den maksimale daglige dosis.
- Slug tabletterne hele med vand.
- Tabletterne må ikke tages sammen med grapefrugtjuice.

Lacipil 4 mg tabletter kan deles i 2 lige store doser. Hvis den forskrevne dosis indebærer, at der skal anvendes en halv 4 mg tablet, skal den ubrugte halvdel efterlades i blisteren og indtages indenfor 48 timer.

Hvis du har taget for mange Lacipil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lacipil, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er: Uregelmæssig puls, hurtig, overfladisk vejrtrækning, lavt blodtryk, kold, klam hud eller en følelse af at være svimmel, besvime, svag eller syg.

Hvis du har glemt at tage Lacipil

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte tablet over og fortsæt med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Lacipil

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt lægen med det samme, hvis du oplever følgende bivirkning:

- Brystmerter (angina), herunder forværring af brystmerter. Følgende bivirkninger har været

rapporteret:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- hovedpine
- svimmelhed
- rødme
- hurtig eller unormal hjerterytme
- mavegener, kvalme
- hududslæt
- forøget urinmængde
- kraftsløshed og svaghed
- hævelser (ødemer), især af anklerne
- ændringer i blodprøveresultater i forbindelse med levertest.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- brystmerter (angina), herunder forværring af brystmerter
- lavt blodtryk
- fortykkelse af tandkødet
- besvimelse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- allergiske reaktioner, der giver hævelser af ansigtet (angioødem)
- nældefeber
- muskelkræmper.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- rysten
- depression.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- rysten eller ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger, muskelstivhed og langsomme bevægelser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevar blisterkortet i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lacipil indeholder:

– Aktivt stof: lacidipin.

Lacipil 2 mg tabletter: En tablet indeholder 2 mg lacidipin.

Lacipil 4 mg tabletter: En tablet indeholder 4 mg lacidipin.

– Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne: povidon K30, lactosemonohydrat, magnesiumstearat.

Filmovertræk: titandioxid (E171), hypromellose, macrogol 400, polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er pakket i aluminiumsblisterkort. Lacipil-tabletter findes i pakninger med blisterkort med 98 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4

Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V

Lacipil svarer til Lacidipin Teva.

Varemærker tilhører eller er licenseret til

GSK-koncernen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2020.