

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kloramfenikol Santen 10 mg/g øjensalve

chloramphenicol

10-2023
P399896-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol Santen
3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol Santen
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol Santen indeholder chloramphenicol. Det forhindrer vækst af bakterier, som forårsager øjeninfektioner.

Kloramfenikol Santen bruges til behandling af bakterielle infektioner i øjnene. Den kan også anvendes til at forebygge infektioner i forbindelse med øjenskader og øjenkirurgi.

Både voksne og børn kan bruge produktet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol Santen

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Kloramfenikol Santen

- hvis du er allergisk over for chloramphenicol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kloramfenikol Santen (angivet i afsnit 6).
- hvis du har en kendt personlig eller en familær historie med bloddyskrasi, for eksempel aplastisk anæmi.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Kloramfenikol Santen.

Brug af andre lægemidler sammen med Kloramfenikol Santen

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Hvis du har brug for at anvende flere lægemidler i samme øje, vent mindst 5 minutter mellem inddrypning af de forskellige lægemidler. Øjensalve bør altid administreres til sidst.

Brug ikke Kloramfenikol Santen produkter samtidig med lægemidler, som kan undertrykke funktionen af knoglemarven.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Chloramphenicol bør anvendes med forsigtighed under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Efter at have anvendt øjensalven, kan du midlertidigt få sløret syn. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart. Hvis du er i tvivl, så tal med apotekspersonalet eller lægen.

Kontaktlinser

Du må ikke bære kontaktlinser, mens du bruger Kloramfenikol Santen.

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol Santen

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er cirka 1 cm af salven, flere gange dagligt, i begyndelsen f.eks. hver 3. time, i det(de) berørte øje(øjne). Behandlingen bør ikke fortsættes i mere end 2 uger.

Sådan åbnes tuben med salven første gang

Tuben har en hvid plastikstrimmel, der forsegler hættten mod tuben, og den skal fjernes, inden salven kan anvendes første gang. Fjern den hvide plastikstrimmel omkring halsen på tuben ved at trække i den og derefter vride den af halsen på tuben.

Før påføring af salven:

- fjern udflåd fra øjet.
- vask dine hænder.
- vælg den position, som du finder mest komfortabel, når du skal foretage applikationen af salven (som at sidde ned, ligge på ryggen, stå foran et spejl).

Anvendelse af salven:

1. Åbn tuben. Undgå kontakt med tubens mundstykke.
2. Træk ned i det nedre øjenlåg, placer tubens mundstykke i lommen mellem det nederste af øjenlåget og øjet og se op.



3. Pas på. Rør ikke dine øjenvipper og øjne. Påfør ca. 1 cm af salven mellem det nedre øjenlåg og øjet.



4. Luk dit øje og blink nogle få gange for at få salven fordelt på øjet. Sæt hættten på tuben.



Hvis du bruger både øjendråber og en øjensalve, anvend da salven til sidst.
Hvis du anvender flere lægemidler i et øje, så vent mindst 5 minutter mellem de forskellige produkter.

Brug til børn

Børn kan anvende dette lægemiddel på samme måde som voksne.

Pædiatrisk population

Dosisjustering kan være nødvendig hos nyfødte på grund af reduceret systemisk elimination, som skyldes umoden stofskifte og risiko for dosisrelaterede bivirkninger. Den maksimale varighed af behandlingen er 10–14 dage.

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol Santen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Kloramfenikol Santen, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Overdosering er usandsynligt, da salven anvendes lokalt i øjet.

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol Santen

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brugen af dette lægemiddel, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du holder op med at bruge Kloramfenikol Santen

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til en ud af 100 personer):

- Allergiske reaktioner
- Forbigående øjenirritation, så som kløe, brænden, stikkende følelse eller konjunktival hyperæmi (øget blodtilførsel til øjet, hvilket medfører røde øjne), superinfektioner.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til en ud af 1.000 personer):

- Sygdom i det perifere nervesystem (perifer neuropati)
- Synsnervebetændelse.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til en ud af 10.000 personer):

- To former for undertrykkelse af knoglemarvsfunktionen:
 1. Dosis-relateret, reversibel undertrykkelse af knoglemarvsfunktionen, herunder morfologiske ændringer af knoglemarven;
 2. Svær, irreversibel, aplastisk anæmi (ikke dosis-relateret)
- Allergisk øjenbetændelse.

Andre bivirkninger:

Andre bivirkninger er forekommet i et mindre antal personer, men frekvensen er ukendt:

- Allergiske (anafylaktiske) reaktioner, som kan være livstruende.
- Udslæt og hævelser (angioneurotisk ødem), nældefeber, inflammation i huden med blærer, pletter og vabler.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

Holdbarhed efter anbrud:

Efter åbning kan tuben opbevares under 25 °C i 28 dage.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og tuben efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kloramfenikol Santen indeholder:

- Aktivt stof: chloramphenicol. 1 gram øjensalve indeholder 10 mg chloramphenicol.
- Øvrige indholdsstoffer: paraffinolie og hvid blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser

Lys-farvet, blød og gennemsigtig salve.

Polyfoil tube på 4,3 g, støbt med et polyethylen (PE) mundstykke, med en PE hætte.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2023.