

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dipyridamol 2care4 200 mg depotkapsler, hårde dipyridamol

04-2024
P505640-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol 2care4
3. Sådan skal du tage Dipyridamol 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dipyridamol 2care4 nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen og forhindrer derved dannelsen af blodpropper.

Dipyridamol 2care4 bruges til at forebygge blodpropper i hjernen eller hvis du har haft en blodprop i hjernen eller har haft forbigående lammelser, eller føleforstyrrelser (slagtilfælde eller transitorisk iskæmisk attack - TIA).

Du kan tage kapslerne sammen med andre forebyggende lægemidler (acetylsalicylsyre) eller alene, hvis du ikke kan tåle acetylsalicylsyre.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dipyridamol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dipyridamol 2care4

- hvis du er allergisk over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dipyridamol 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dipyridamol 2care4, hvis du har:

- En alvorlig hjerte-karsygdom
- En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis)

Hvis du skal have foretaget en test af din hjertefunktion, så skal du fortælle lægen, at du tager Dipyridamol 2care4. **Behandling med Dipyridamol 2care4 kan påvirke resultatet af testen.**

For at få et korrekt resultat kan det være nødvendigt at holde pause med Dipyridamol 2care4, inden testen foretages.

Børn

Dipyridamol 2care4 bør ikke anvendes til børn, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med dipyridamol til børn.

Brug af andre lægemidler sammen med Dipyridamol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager lægemidler mod:

- Muskelsygdommen myasthenia gravis.
- Forhøjet blodtryk.
- Uregelmæssig hjerterytme (lægemidler indeholdende adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- Astma eller KOL (f.eks. theophyllin eller andre xantiner).
- Andre lægemidler til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre).

Brug af Dipyridamol 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Dipyridamol Alternova i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Dipyridamol 2care4, hvis du er gravid, medmindre lægen vurderer, at det er strengt nødvendigt. Tal med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Dipyridamol 2care4, da dipyridamol bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen.

Frugtbarhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af dipyridamols virkning på frugtbarheden hos mennesker. I dyreforsøg blev der ikke set nogen skadelige virkninger på frugtbarheden.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Dipyridamol 2care4 kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdsikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan lægemidlet påvirker dig.

3. Sådan skal du tage Dipyridamol 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 1 kapsel 2 gange daglig, som regel én kapsel om morgenen og én kapsel om aftenen.

Kapslen kan tages i forbindelse med eller uafhængigt af måltider. Kapslerne skal synkes hele og må ikke tygges.

Alternativ dosering ved utålelig hovedpine

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med Dipyridamol 2care4, skal du måske have en anden dosis. Tal med lægen. Der kan forsøgsvis doseres med 1 kapsel ved sengetid og en lav dosis acetylsalicylsyre om morgenen. Da hovedpinen normalt forsvinder ved regelmæssig dosering, rådes du kraftigt til at vende tilbage til din normale dosering inden for en uge.

Brug til børn

Det frarådes at anvende Dipyridamol 2care4 til børn.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Dipyridamol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dipyridamol 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du kan få symptomer på overdosering, såsom varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine, hvis du har taget for mange Dipyridamol 2care4. Du kan også få hurtigt puls, hurtigt åndedræt, lavt blodtryk, hjertekramper, bevidstløshed, mavebesvær, svækket vejrtrækning med blåfarvning af læber og negle, forlænget blødningstid og gulfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Dipyridamol 2care4
Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Dipyridamol 2care4
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og hovedpine. I de fleste tilfælde forsvinder disse bivirkninger ved fortsat brug.

Alvortlige bivirkninger:
Følgende bivirkninger er alvortlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Kontakt lægen eller nærmeste skadestue så hurtigt som muligt.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

- Angina pectoris (smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Hurtig puls.
- Et blodproblem, der hedder ”trombocytopeni”, og som kan forårsage blå mærker og langvarig blødning fra sår.
- Øget blødning under eller efter operation.
- Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med strammen for brystet og åndenød, hududslæt og kløe, hævelse af tunge, læber og ansigt.
- Galdesten med pludselige og hurtigt tiltagende smerter i midten af maven eller under højre brystben.
- Bronkospasme (vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald).

Ikke alvortlige bivirkninger:
Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

- Kvalme, hovedpine, svimmelhed, diarré.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

- Opkastning.
- Muskelsmerter.
- Udslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Svimmelhed eller besvimelse på grund af lavt blodtryk.
- Hedeture.
- Nældefeber (urticaria).

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Dipyridamol 2care4 utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Åben ikke beholderen, før du skal starte med at tage kapslerne. Holdbarhed efter anbrud: 6 uger.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dipyridamol 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: dipyridamol.
1 hård depotkapsel indeholder 200 mg dipyridamol.
- Øvrige indholdsstoffer: 96 % vinsyre-pellets (2 % saccharose og 2 % povidon K-30s), hypromellose E15, talcum, spraytørret akaciegummi, triacetin, povidon (PVP K30), simeticon-emulsion indeholdende: simeticon, macrogolcetostearylether, natriumbenzoat og rensed vand, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer og hypromellosephthalat P55.

Kapselskal: gelatine, titandioxid (E 171), rød og gul jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Hårde orange gelatinekapsler med rød hætte.
Dimension: 7,66 x 23,1 mm.

Kapslerne indeholder små gule pellets med langsom udløsning.

Pakningsstørrelser
Tabletbeholder indeholdende 1 stk. tørremiddel.

Pakningsstørrelser: 50 og 60 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringsstilladelsen:
2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:
2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Dipyridamol 2care4 svarer til Dipyridamol Alternova.

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2024.