

Indlægsseddel: Information til brugeren

Haiprex, tabletter, 1 g

methenaminhippurat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Haiprex
3. Sådan skal du tage Haiprex
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Haiprex anvendes til forebyggelse af urinvejsinfektioner, især hos kateterbærere.

Lægen kan have givet dig Haiprex for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Haiprex

Brug ikke Haiprex:

- hvis du er allergisk over for det aktive stof methenamin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
- hvis du er overfølsom over for formalin
- hvis du har dårlig lever
- hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion
- hvis du har nyrebetændelse
- hvis du er kraftig dehydreret
- hvis du har stofskiftet betinget syreophobning
- hvis du har urinsur gigt
- hvis du samtidig tager sulfonamider (som også anvendes til urinvejsinfektioner) eller basiske stoffer f.eks. kaliumcitrat (som anvendes til behandling af nyresten)

Brug af anden medicin sammen med Haiprex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Virningen af Haiprex kan blive reduceret, hvis du samtidig tager syreneutraliserende midler (antacida) eller basiske stoffer som f.eks. kaliumcitrat.

Du bør ikke tage medicin, der indeholder sulfonamider sammen med Haiprex, da det kan danne krystaller i urinen.

Haiprex kan også påvirke resultatet af visse urinprøver. Fortæl derfor altid din læge, at du tager Haiprex, før du skal have undersøgt en urinprøve.

Brug af Haiprex sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Haiprex sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Haiprex kan anvendes under graviditet, hvis det vurderes nødvendigt af din læge.

Amning

Du kan amme, selvom du tager Haiprex.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Haiprex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Haiprex

Brug altid Haiprex nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Haiprex bruges til at forebygge tilbagevendende urinvejsinfektioner forårsaget af visse bakterier. Det bør ikke bruges til at behandle en aktiv infektion. Fortæl din læge, hvis symptomer på en urinvejsinfektion vender tilbage (såsom brændende/smertefuld/hyppig vandladning). Hvis du ser din læge, skal du informere ham/hende om, at du tager Haiprex.

Haiprex bruges til at reducere antallet af tilbagevendende urinvejsinfektioner og er til langtidsbrug op til 12 måneder uden lægens yderligere anvisning. Kontakt din læge eller apotek, hvis du oplever noget af følgende:

- bivirkninger (se afsnit 4),
- hvis du føler, at urinvejsinfektionerne forværres, dvs. bliver hyppigere eller ikke forbedres, dvs. at brugen af Hiprex ikke fører til mindre hyppige urinvejsinfektioner.

Hvis Haiprex virker for dig, så du oplever færre urinvejsinfektioner end før, kan du bruge det over tid. Den anbefalede dosis er én tablet hver morgen og aften. Det anbefales dog, at man stopper behandlingen efter 12 måneder for at se, om urinvejsinfektionerne kan være forsvundet. Hvis de dukker op igen, når du holder op med at tage Haiprex, skal du kontakte din læge for at diskutere fortsat langtidsbrug.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 tablet 2 gange dagligt.

Hvis du har taget for meget Haiprex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Haiprex, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tag ikke mere Haiprex, end lægen har ordineret. Symptomerne på overdosering er de samme, som er nævnt under afsnittet om bivirkninger.

Hvis du har glemt at tage Haiprex

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om den. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at bruge Haiprex

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Haiprex.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige – meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Kvalme
- Opkastning
- Udslæt
- Irritation i blæren

Sjælden – meget sjælden bivirkning (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter):

- Blod i urinen. Kan være alvorligt eller kan blive alvorligt. Tal med lægen.

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Diarré, mavesmerter
- Kløe

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Haiprex utilgængeligt for børn.

Brug ikke Haiprex efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Haiprex 1 g tabletter indeholder:

Aktivt stof:	methenaminhippurat
Øvrige indholdsstoffer:	povidon, kolloid silica og magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Hvid til cremehvid, aflang tablet mærket med "HX" med delekærv på den ene side og delekærv på den anden side.

Pakningsstørrelse

Haiprex findes i pakningsstørrelsen: 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladlsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatis ApS
Borupvang 1
2750 Ballerup

Fremstiller

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M.S.P.A
Via Grignano, 43
240411 Brembate (Bg)
Italien

eller

Mylan Hungary Kft/Mylan Hyngary Ltd
Mylan utca 1,
Komarom 2900
Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2024.