

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin® C 300 mg hårde kapsler

clindamycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Dalacin C til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin C
3. Sådan skal du tage Dalacin C
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin C kapsler indeholder et antibiotikum.
Du kan bruge Dalacin C til behandling af betændelse (infektion), der skyldes bakterier.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin C

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dalacin C

- hvis du er allergisk over for clindamycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin C (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dalacin C, hvis du:

- har eller tidligere har haft en tarmsygdom (f.eks. Crohns sygdom eller colitis ulcerosa).
- har eller tidligere har haft lever- eller nyreproblemer.
- får kløe og svie i hud eller slimhinder. Det kan være tegn på en svampeinfektion, som Dalacin C ikke virker mod.
- får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du tager Dalacin C, eller op til 2 måneder efter du har stoppet behandlingen. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Du må ikke bruge lægemidlet mod diarré uden lægens anvisning.
- får overfølsomhedsreaktioner eller alvorligt hududslæt. Kontakt straks lægen.

Akutte nyresygdomme kan forekomme. Fortæl det altid til lægen, hvis du tager andre lægemidler, og hvis du har forudeksisterende problemer med nyrerne. Du bør straks kontakte lægen, hvis du oplever nedsat urinproduktion, væskeophobning, der medfører hævelse af ben, ankler eller fødder, åndenød eller kvalme.

Ved behandling i længere tid vil lægen tage blodprøver for at kontrollere, om din lever og nyrer fungerer normalt.
På grund af risiko for betændelse i spiserøret (øsofagitis) og sår på spiserøret er det vigtigt, at du altid tager Dalacin C nøjagtigt som beskrevet i punkt 3.

Brug af andre lægemidler sammen med Dalacin C

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept, lægemidler købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl lægen, hvis du samtidig tager:

- muskelafslappende lægemidler.
- andre lægemidler mod betændelse (erythromycin)
- warfarin eller lignende lægemidler – anvendes som blodfortyndende behandling. Du vil være mere tilbøjelig til at bløde. Din læge vil regelmæssigt tage blodprøver for at undersøge dit blods evne til at størkne.
- lægemidler mod tuberkulose (rifampicin). Samtidig behandling med Dalacin C og rifampicin kan medføre, at effekten af Dalacin C bliver mindre.

Brug af Dalacin C sammen med mad og drikke

Du skal tage Dalacin C sammen med mindst
1 helt glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du normalt ikke tage Dalacin C. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Dalacin C, da Dalacin C går over i modermælken. Dalacin C kan medføre diarré, blod i afføringen eller udslæt, hos barnet som ammes. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin C påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dalacin C indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Dalacin C

Tag altid Dalacin C nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal tage Dalacin C hele sammen med mindst 1 helt glas vand, og der skal gå mindst 30 minutter, inden du lægger dig ned. På den måde undgår du mulig irritation af spiserøret.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Dalacin C kapsler 150 mg:

2-3 kapsler 2-4 gange dagligt.

Dalacin C kapsler 300 mg:

1-2 kapsler 2-3 gange dagligt eller 1 kapsel 4 gange dagligt.

Børn over 1 måned:

Dosis afhænger af barnets vægt, uanset om barnet er overvægtigt. Tal med lægen.

Du kan ikke bruge Dalacin C kapsler til børn, der vejer under 15 kg. Dalacin C kapsler bør kun anvendes til børn, der kan synke kapsler.

15-25 kg: 1 kapsel på 150 mg 3-4 gange dagligt.

30-40 kg: 1 kapsel på 150 mg eller 300 mg 3-4 gange dagligt.

Børn under 1 måned:

Du bør ikke bruge Dalacin C til børn under 1 måned.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Dalacin C 300 mg hårde kapsler til alle de anførte doseringer.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Dalacin C

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Dalacin C, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarré.

Hvis du har glemt at tage Dalacin C

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Dalacin C

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin C, da sygdommen ellers kan blusse op igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

- Langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 - Gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene). Kontakt lægen.
 - Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse (Clostridioides difficile colitis). Kontakt lægen.
 - Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 - Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 - Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.
 - Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 - Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 - Væskeophobning, der resulterer i hævede ben, ankler eller fødder, samt åndenød eller kvalme. Kontakt læge eller skadestue.
 - Dalacin C kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din hud eller andre dele af kroppen, f.eks. lever eller blodceller. Du skal muligvis på hospitalet eller stoppe behandlingen med Dalacin C.
- Kontakt straks lægen, hvis du får et af følgende symptomer:
- Hududslæt, nældefeber, feber, hævede kirtler som ikke forsvinder, hævelse af læber og tunge, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, usædvanlige blå mærker eller blødning, stærk træthed eller svaghed, uventede muskelsmerter eller hyppige infektioner.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

- Diarré.
- Hududslæt, plettet hududslæt med små blærer.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

- Mavesmerter, opkastning, kvalme.
- Nældefeber.
- Muskelsvaghed.
- Smagsforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
- Kløe.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

- Sure opstød/halsbrand.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse og sår i spiserøret. (Bivirkninger, som typisk optræder, hvis Dalacin C tages, mens du ligger ned og/eller med for lidt vand.) Tal med lægen.
- Overfølsomhed, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, hududslæt, betændelse i huden med blærer.
- Kløe og udflåd fra skeden (vaginal infektion).
- Akut nyreskade.

Dalacin C kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Dalacin C utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
- Brug ikke Dalacin C efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin C indeholder:

- Aktivt stof: Clindamycin 300 mg som clindamycinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vegetabilsk magnesiumstearat, majsstivelse, talcum, titandioxid (E171), indigotin I (E132), erythrosin (E127).

Gelatinekapsel indeholder sort trykblæk (sort jernoxid (E172))

Udseende og pakningsstørrelser:

Dalacin C 300 mg er en lilla hård gelatinekapsel mærket "Clin 300" og "Pfizer".

Dalacin C 300 mg findes i blisterpakninger i pakningstørrelsen 24 hårde kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Stationsalleen 42, 1. sal
2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack A/S
Stationsalleen 42, 1. sal
DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2025.