

Indlægsseddel: Information til brugeren

Naratriptan Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter

naratriptan

07-2022
P193423-3

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naratriptan Teva
3. Sådan skal du tage Naratriptan Teva
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Din medicin indeholder naratriptan (hydrochlorid), som tilhører den gruppe af lægemidler, som kaldes triptaner (også kendt som 5-HT₁-receptoragonister).

Naratriptan bruges til behandling af hovedpine ved migræne.

Migrænesymptomer kan skyldes midlertidig udvidelse af blodkarrene i hovedet. Naratriptan menes at mindske udvidelsen af disse blodkar. Dette hjælper til at fjerne hovedpinen og lindre andre symptomer på et migræneanfald, såsom kvalme eller opkastning og følsomhed over for lys og lyd.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naratriptan Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Naratriptan Teva:

- **hvis du er allergisk** over for naratriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Naratriptan Teva (angivet i afsnit 6)
- **hvis du har et hjerteproblem**, såsom forsnævring af arterierne eller bryst smerter eller tidligere har haft et hjerteanfald
- **hvis du har problemer med blodcirkulationen i benene**, som kan medføre krampelignende smerter, når du går
- **hvis du har haft et slagtilfælde** eller et mini-slagtilfælde
- **hvis du har højt blodtryk**. Det er muligt, at du kan tage Naratriptan Teva, hvis dit blodtryk er let forhøjet eller bliver behandlet
- **hvis du har alvorlig nyr sygdom eller alvorlig leversygdom**
- **sammen med anden medicin mod migræne**, herunder medicin, som indeholder ergotamin, eller sammen med lignende medicin, såsom methysergid, eller sammen med triptaner eller 5-HT₁-receptoragonister.

Hvis noget af det ovenstående gælder dig, skal du fortælle det til lægen og undlade at tage Naratriptan Teva.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Naratriptan Teva.

Hvis du har en eller flere andre risikofaktorer

- **hvis du er storryger** eller bruger **nikotinsubstitutionsbehandling**, og især
- **hvis du er mand og over 40 år**, eller
- **hvis du er kvinde, og menstruationen er ophørt**.

Nogle personer har i meget sjældne tilfælde udviklet alvorlige hjertelidelser, efter de har taget Naratriptan Teva, også selvom de ikke tidligere har haft tegn på hjertesygdom.

Hvis et eller flere af ovenstående punkter gælder for dig, kan det betyde, at du har en større risiko for at udvikle hjertesygdom - derfor:

Fortæl det til lægen, så din hjertefunktion kan blive undersøgt, før Naratriptan Teva ordineres til dig.

Hvis du er allergisk over for antibiotika, som kaldes sulfonamider

Hvis dette er tilfældet, kan du også være allergisk over for Naratriptan Teva. Hvis du er allergisk over for et antibiotikum, men ikke er sikker på, om det er et sulfonamid: **Fortæl det til lægen eller til apotekspersonalet, før du tager Naratriptan Teva.**

Hvis du ofte tager Naratriptan Teva

Hvis du tager naratriptan for ofte, kan det forværre dine hovedpiner. **Fortæl det til lægen, hvis dette gælder for dig**. Lægen kan anbefale, at du stopper med at tage Naratriptan Teva.

Hvis du får smerter eller trykken for brystet, efter du har taget Naratriptan Teva

Disse bivirkninger kan være intense, men de forsvinder normalt hurtigt. Hvis bivirkningerne ikke forsvinder hurtigt, eller hvis de bliver alvorlige:

Søg omgående lægehjælp.

Afsnit 4 i denne indlægsseddel indeholder mere information om disse mulige bivirkninger.

Hvis du tager antidepressiv medicin, som kaldes SSRI'er (selektive serotoninoptagshæmmere) eller SNRI'er (serotonin noradrenalingenoptagshæmmere). Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Naratriptan Teva.

Brug af anden medicin sammen med Naratriptan Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Noget medicin må ikke tages sammen med Naratriptan Teva, og anden medicin kan forårsage bivirkninger, hvis det tages sammen med Naratriptan Teva. **Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager:**

- triptan eller 5-HT₁-receptoragonister, som anvendes til behandling af **migræne**. Tag ikke Naratriptan Teva samtidig med disse former for medicin. Tag ikke disse former for medicin igen, før mindst 24 timer efter, du har taget Naratriptan Teva
- **ergotamin**, som også anvendes til behandling af **migræne** eller lignende medicin, såsom methysergid. Tag ikke Naratriptan Teva samtidig med disse former for medicin. Stop med at tage disse former for medicin mindst 24 timer før, du tager Naratriptan Teva. Tag ikke disse former for medicin igen, før mindst 24 timer efter, du har taget Naratriptan Teva
- **SSRI'er** (selektive serotoninoptagshæmmere) eller **SNRI'er** (serotonin noradrenalingenoptagshæmmere), som anvendes til behandling af **depression**. Anvendelse af Naratriptan Teva sammen med disse former for medicin kan medføre forvirring, svaghed og/eller manglende koordination. Fortæl det omgående til din læge, hvis du bliver påvirket på denne måde
- **prikbladet perikon** (*hypericum perforatum*). Brug af naturmedicin, som indeholder prikbladet perikon, mens du tager Naratriptan Teva, kan øge risikoen for bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Der findes kun begrænset information, om hvorvidt Naratriptan Teva er sikkert at bruge til gravide kvinder. Indtil videre tyder denne information ikke på en øget risiko for fostermisdannelse. Din læge kan anbefale, at du ikke tager Naratriptan Teva, mens du er gravid.

Du må ikke amme dit barn i 24 timer efter, du har taget Naratriptan Teva. Hvis du udmalker modermælk, skal du kassere mælken og undlade at give den til dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Migrænesymptomerne eller medicinen kan gøre dig døs. **Hvis du bliver påvirket af dette, skal du undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.**

Naratriptan Teva indeholder lactose

Naratriptan Teva indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Naratriptan Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du tage Naratriptan Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tag først Naratriptan Teva, efter din migrænehovedpine er startet.

Tag ikke Naratriptan Teva for at forebygge et anfald.

Hvor meget skal du tage

- **Den anbefalede dosis til voksne mellem 18 og 65 år** er én 2,5 mg tablet, som synkes hel med vand.

Anvendelse af Naratriptan Teva anbefales ikke til børn under 18 år og til voksne over 65 år.

Hvornår skal du tage Naratriptan Teva

- **Det er bedst at tage Naratriptan Teva ved de første tegn på migrænehovedpinen.**
- **Naratriptan Teva** kan dog tages på et hvilket som helst tidspunkt under et anfald.

Hvis dine symptomer vender tilbage

- Du kan tage endnu en tablet efter 4 timer, medmindre du har nyre- eller leverskade.
- **Hvis du har nyre- eller leverskade**, må du ikke tage mere end én tablet inden for 24 timer.
- **Du må ikke tage mere end to tabletter inden for 24 timer.**

Hvis den første tablet ikke har nogen virkning

- **Tag ikke endnu en tablet for det samme anfald.**

Hvis Naratriptan Teva ikke giver lindring: **Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds.**

Hvis du har taget for meget Naratriptan Teva

- **Du må ikke tage mere end to Naratriptan Teva-tabletter inden for 24 timer.**
- For meget naratriptan kan gøre dig syg. Hvis du har taget mere end to tabletter inden for 24 timer: **Kontakt lægen.**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Naratriptan Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du holder op med at tage Naratriptan Teva

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner: Kontakt straks lægen eller skadestuen. (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Symptomerne på allergi omfatter kløe, udslæt, hvæsende vejrtrækning, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, totalt sammenfald (kollaps).

Hvis du får et eller flere af disse symptomer kort efter at have taget Naratriptan Teva:

Stop med at tage tabletterne. Kontakt straks lægen.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

- Utilpashed (kvalme eller opkastning), selvom dette også kan skyldes selve migrænen.
- Træthed, døsighed eller en generel utilpashed.
- Svimmelhed, føleforstyrrelser (prikkende fornemmelse), hedsure.

Hvis du får en eller flere af disse bivirkninger: **Kontakt lægen eller apotekspersonalet.**

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

- Tyngdefornemmelse, trykken, knugen eller smerter i brystet, halsen eller andre dele af kroppen. Bivirkningerne kan være voldsomme, men de fortager sig normalt hurtigt.

Hvis disse bivirkninger er vedvarende eller bliver alvorlige (især brystsmerterne):

Søg straks lægehjælp. Hos meget få personer kan symptomerne skyldes et hjerteanfald.

Andre ikke almindelige bivirkninger omfatter:

- Synsforstyrrelser (også selvom disse kan skyldes selve migrænen).
- Hurtigere hjerterytme, langsommere hjerterytme, hjertebanken.
- Let øget blodtryk, som kan vare i op til 12 timer, efter Naratriptan Teva er indtaget.

Hvis du får en eller flere af disse bivirkninger:

Kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

- Smerter nederst i venstre side af maven og blodig diarré.

Hvis du får disse symptomer:

Kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

- Hjerterproblemer, herunder brystsmerter, og hjerteanfald.
- Dårlig blodcirkulation i arme og ben, som medfører smerter og ubehag.

Hvis du får disse symptomer:

Kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken eller blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Naratriptan Teva indeholder:

- Aktivt stof: naratriptan.
1 fillovertrukket tablet indeholder 2,5 mg naratriptan (som naratriptanhydrochlorid).
- Øvrige indholdsstoffer:
Tabletterne: vandfri lactose, mikrokrySTALLINSK cellulose, kolloid vandfri silica, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.
Overtræk: hypromellose (E464), titandioxid (E171), lactose monohydrat, macrogol 3350, triacetin, quinolingult (E104), indigocarmin (E132) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Naratriptan Teva er grønne, bikonvekse, runde fillovertrukne tabletter mærket "NT 2,5" på den ene side og glat på den anden side.

Pakningsstørrelser

Naratriptan Teva fås i pakningsstørrelser á 6 eller 18 fillovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2022.