

## Indlægsseddel: Information til brugeren

# Innovair® Nexthaler® 100+6 mikrogram/dosis inhalationspulver

beclometasondipropionat, vandfri/formoterolfumaratdihydrat

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Innovair Nexthaler til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlægsseddel.dk](http://www.indlægsseddel.dk).

### Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innovair Nexthaler
3. Sådan skal du bruge Innovair Nexthaler
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

## 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Innovair Nexthaler er et pulver, der skal inhaleres gennem munden, og som bliver ført dybt ned i dine lunger. Det indeholder to aktive stoffer: vandfri beclometasondipropionat og formoterolfumaratdihydrat.

Vandfri beclometasondipropionat tilhører en gruppe af lægemidler, kaldet for kortikosteroider, som har en antiinflammatorisk effekt, som reducerer hævelse og irritation i dine luftveje.

- Formoterolfumaratdihydrat tilhører en gruppe lægemidler kaldet langtidsvirkende bronkodilatorer, der afslapper musklerne i luftvejene, så luftvejene bliver udvidet, og du får lettere ved at ånde luft ind og ud af lungerne.

Disse to indholdsstoffer gør det lettere for dig at trække vejret, fordi de lindrer dine symptomer, såsom kortåndethed, hvæsen og hoste hos patienter med astma eller KOL, og de hjælper også med at forebygge astmasymptomer.

### Astma

Innovair Nexthaler bruges til behandling af astma hos voksne.

Hvis du har fået ordineret Innovair Nexthaler, er det sandsynligvis, fordi:

- din astma ikke kan behandles tilstrækkeligt med kortikosteroider til inhalation og korttidsvirkende bronkodilatorer "efter behov".
- eller
- din astma reagerer godt på både kortikosteroider og langtidsvirkende bronkodilatorer.

### KOL

Innovair Nexthaler kan også anvendes til behandling af symptomerne på svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) hos voksne patienter. KOL er en kronisk sygdom i luftvejene i lungerne, som primært skyldes rygning.

## 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE INNOVAIR NEXTHALER

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

### Brug ikke Innovair Nexthaler:

- Hvis du er allergisk over for vandfri beclometasondipropionat eller formoterolfumaratdihydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Innovair Nexthaler (angivet i punkt 6).

### Advarsler og forsigtighedsregler

**Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Innovair Nexthaler, hvis et eller flere af følgende punkter gælder for dig:**

- Du har hjerteproblemer. Disse omfatter en hvilken som helst forstyrrelse i hjertet og/eller hjertefunktionen.
- Du har hjerterytmeforstyrrelser, såsom øget eller uregelmæssig hjertefrekvens, hurtig puls eller hjertebanken, eller hvis du har fået at vide, at dit elektrokardiogram er unormalt.
- Du har højt blodtryk.
- Du har forsnævring af arterierne (også kaldet arteriosklerose), eller hvis du ved, at du har en aneurisme (en unormal udposning på blodkarvæggen).
- Din skjoldbruskkirtel er overaktiv.
- Du har lavt indhold af kalium i blodet.
- Du har en lever- eller nyresygdom.
- Du har sukkersyge. Hvis du inhalerer store doser af formoterol, kan dit blodsukker stige. Du kan derfor have brug for flere blodsukkermålinger, når du starter med at bruge dette lægemiddel, og også i løbet af behandlingen.
- Du har en svulst i binyren (kaldet fæokromocytom).
- Du skal bedøves. Afhængigt af bedøvelsesmidlet kan det være nødvendigt at stoppe brugen af Innovair Nexthaler mindst 12 timer før bedøvelsen.
- Du bliver eller er blevet behandlet for tuberkulose (TB), eller du har en kendt virus- eller svampeinfektion i brystet.

**Hvis noget af det ovenstående vedrører dig, skal du fortælle det til lægen, før du bruger Innovair Nexthaler.**

Kontakt din læge, astmasygeplejerske eller apotekspersonalet, før du bruger inhalatoren, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge Innovair Nexthaler.

**Din læge vil muligvis måle kaliumindholdet i dit blod fra tid til anden, især hvis du har svær astma.** Ligesom mange andre bronkodilatorer kan Innovair Nexthaler forårsage et brat fald i kaliumindholdet i blodet (hypokaliæmi). Det skyldes, at iltmangel i blodet i kombination med visse andre lægemidler, som du muligvis tager sammen med Innovair Nexthaler, kan forværre faldet i kaliumindholdet i blodet.

**Hvis du bruger en inhalator til at tage store doser af kortikosteroider i lange perioder,** kan du have et øget behov for kortikosteroider i situationer med stress. Stressende situationer kan opstå i forbindelse med at skulle på hospitalet efter en ulykke, at komme alvorligt til skade eller før en operation. I sådanne situationer må lægen beslutte, om du har brug for en højere dosis kortikosteroider, og lægen kan give dig steroidtabletter eller en steroidinjektion.

**Hvis du får behov for at blive indlagt på hospitalet,** skal du huske at medtage al medicin og alle inhalatorer, herunder Innovair Nexthaler, samt al medicin eller tabletter købt uden recept (i originalpakninger, hvis muligt).

**Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.**

### Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

### Brug af anden medicin sammen med Innovair Nexthaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet hvis du tager, for nyligt har taget, eller overvejer at tage et andet lægemiddel samtidig med Innovair Nexthaler. Dette er fordi, Innovair Nexthaler kan have en påvirkning på virkningen af det andet medicin. Ligeledes kan anden medicin have en påvirkning af, hvordan Innovair Nexthaler virker.

I særlig grad skal du fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger et af følgende lægemidler:

- Nogle lægemidler kan øge effekten af Innovair Nexthaler, og din læge ønsker formentlig at monitorere dig nøje, hvis du tager et sådant lægemiddel (inkluderer lægemidler for HIV: ritonavir og cobicistat).
- Betablokkere. Betablokkere er lægemidler, som bruges til at behandle bl.a. hjerteproblemer, forhøjet blodtryk eller glaukom (øget tryk i øjet). Hvis du har brug for betablokkere (inklusive øjendråber), så vil effekten af formoterol blive reduceret eller forsvinde helt.
- Beta-adrenerge lægemidler (lægemidler der virker på samme måde som formoterol) kan øge effekten af formoterol.
- Lægemidler til behandling af anormale hjerterytmer (quinidin, disopyramid, procainamid).
- Lægemidler til behandling af allergiske reaktioner (antihistaminer som eksempelvis terfenadin).
- Lægemidler til behandling af symptomer ved depression eller psykiske forstyrrelser som monoaminoxidasehæmmere (for eksempel phenelzin og isocarboxazid) eller tricykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin og imipramin) eller phenothiaziner.
- Lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom (L-dopa).
- Lægemidler til behandling af underaktiv skjoldbruskkirtel (L-thyroxin).
- Lægemidler som indeholder oxytocin (forårsager sammentrækning af livmoderen).
- Lægemidler til behandling af mentale forstyrrelser, som monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) herunder lægemidler med lignende egenskaber såsom furazolidon og procarbazin.
- Lægemidler til behandling af hjertesygdom (digoxin).
- Andre lægemidler som bruges til behandling af astma (theophyllin, aminophyllin eller steroider).
- Diuretika (vanddrivende tabletter).

Fortæl det også til din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal bedøves i forbindelse med en operation eller ved tandlægen.

### Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

### Graviditet

Der foreligger ingen kliniske data om brugen af Innovair Nexthaler under graviditet.

Hvis du har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds. Du bør kun anvende Innovair Nexthaler under graviditeten, hvis lægen anviser det.

### Amning

Lægen vil beslutte, om du skal stoppe med at bruge Innovair Nexthaler, mens du ammer, eller om du skal undlade at amme. Følg altid lægens anvisninger nøje.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

Innovair Nexthaler påvirker sandsynligvis ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du får bivirkninger såsom svimmelhed og/eller rysten, kan det dog påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

### Innovair Nexthaler indeholder lactosemonohydrat

Lactosemonohydrat indeholder små mængder mælkeproteiner, som kan forårsage reaktioner hos allergiske patienter. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

## 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE INNOVAIR NEXTHALER

Brug altid Innovair Nexthaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet.

Innovair Nexthaler afgiver ekstrafine partikler, hvilket resulterer i, at der bliver leveret mere af hver dosis til lungerne. Derfor vil lægen eventuelt ordinere en lavere dosis med denne inhalator end med dine tidligere inhalatorer.

### Astma

Lægen vil følge dig regelmæssigt for at sikre, at du får den korrekte dosis af Innovair Nexthaler. Når din astma er kommet under god kontrol, kan lægen overveje at nedsætte dosen af Innovair Nexthaler gradvist. Du må **under ingen omstændigheder** ændre dosen uden at tale med lægen først.

**Din læge kan ordinere Innovair Nexthaler til dig til brug på to forskellige måder:**

- a) Brug af Innovair Nexthaler hver dag til behandling af astma sammen med en separat inhalator med anfaldsmedicin, der bruges til lindring af pludselig forværring af astmasymptomer, såsom åndenød, hiven efter vejret og hoste.
- b) Brug af Innovair Nexthaler både til daglig behandling af astma samt til lindring af pludselig forværring af dine astmasymptomer, såsom åndenød, hiven efter vejret og hoste.

## **a) Brug af Innovair Nexthaler sammen med en separat inhalator med anfaldsmedicin:**

### **Voksne og ældre:**

Den anbefalede dosis af dette lægemiddel er 1 eller 2 inhalationer to gange dagligt.  
Den maksimale daglige dosis er 4 inhalationer.

**Husk:** Du skal altid have din separate inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan behandle forværrede astmasymptomer eller et pludseligt astmaanfald.

## **b) Brug af Innovair Nexthaler som din eneste astmainhalator:**

### **Voksne og ældre:** Den anbefalede dosis er

1 inhalation om morgenen og 1 inhalation om aftenen.

Du skal også bruge Innovair Nexthaler som inhalator med anfaldsmedicin til behandling af pludselige astmasymptomer.

Hvis du får astmasymptomer, skal du tage en inhalation og vente nogle få minutter.  
Hvis du ikke har fået det bedre, skal du tage yderligere en inhalation.

### **Du må ikke tage mere end 6 inhalationer om dagen som anfaldsmedicin.**

### **Den maksimale daglige dosis Innovair Nexthaler er 8 inhalationer.**

Hvis du synes, du har brug for flere inhalationer om dagen for at kontrollere dine astmasymptomer, skal du spørge din læge til råds. Din behandling skal muligvis ændres.

### **Øg ikke dosis.**

Tal altid med lægen, før du øger dosis, hvis du ikke opnår tilstrækkelig virkning.

## **Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)**

### **Voksne og ældre:**

Den anbefalede dosis er to inhalationer om morgenen og to inhalationer om aftenen.

### **Sådan skal du bruge Innovair Nexthaler:**

#### **Innovair Nexthaler er til inhalationsbrug.**

Du bør om muligt stå eller sidde oprejst, når du inhalerer din medicin.

#### **Hvis du har brugt for meget Innovair Nexthaler**

- Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Innovair Nexthaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Medbring din medicin, så de kan se, hvad du har taget.
- Du kan få bivirkninger. Fortæl det til lægen, hvis du får usædvanlige symptomer, så lægen kan beslutte, om du skal have taget yderligere prøver, eller om der skal iværksættes andre tiltag.

#### **Hvis du har glemt at bruge Innovair Nexthaler**

Tag medicinen, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men blot tage den næste dosis på det rigtige tidspunkt. **Du må ikke tage en dobbeltdosis.**

#### **Hvis du holder op med at bruge Innovair Nexthaler**

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Du må ikke holde op med at bruge Innovair Nexthaler eller nedsætte dosen, heller ikke selvom du får det bedre. Hvis du ønsker at gøre dette, skal du kontakte lægen. Det er meget vigtigt, at du bruger Innovair Nexthaler hver dag, som anvist af lægen, også selvom du ikke har nogen symptomer.

#### Hvis din vejrtrækning ikke ændrer sig:

Hvis dine symptomer ikke bliver bedre, efter du har inhaleret Innovair Nexthaler, kan det være, at du bruger den forkert. Se brugsanvisningen nedenfor for at se, hvordan du skal bruge den, og/eller kontakt lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet for at blive instrueret i korrekt brug igen.

#### Hvis din astma bliver værre:

Hvis dine symptomer bliver værre, eller de er svære at få under kontrol (hvis du eksempelvis bruger din inhalator med "anfaldsmedicin" eller Innovair Nexthaler som "anfaldsmedicin" oftere end normalt), eller hvis din inhalator med "anfaldsmedicin" eller Innovair Nexthaler ikke forbedrer dine symptomer, skal du fortsætte med at bruge Innovair Nexthaler og kontakte lægen så hurtigt som muligt. Lægen vil eventuelt ændre din dosis af Innovair Nexthaler eller ordinere yderligere eller anden behandling.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## **BRUGSVEJLEDNING TIL NEXTHALER-INHALATOR**

### **A. Indhold i pakningen**

For oplysninger om indholdet af pakningen, se punkt 6.

**Hvis indholdet i pakningen ikke stemmer overens med, hvad der er beskrevet i punkt 6, skal du returnere inhalatoren til den person, der udleverede den og få en ny.**


### **B. Almene advarsler og forsigtighedsregler**

- **Tag ikke** inhalatoren ud af posen, hvis du ikke skal bruge den med det samme.
- Brug kun inhalatoren som anvist.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du får din dosis korrekt, skal du kontakte apotekspersonalet eller lægen.
- Hvis du ikke er sikker på, at dosistælleren er gået et tal ned efter en inhalation, skal du vente til din næste dosis og tage den som normalt. Du må ikke tage en ekstra dosis.

- Hold låget tillukket, indtil du skal tage en dosis fra inhalatoren.
- Opbevar inhalatoren på et rent og tørt sted, når den ikke er i brug.
- Forsøg **aldrig** at skille din Nexthaler-inhalator ad.
- Brug **ikke** din Nexthaler-inhalator:
  - Efter udløbsdatoen.
  - Hvis det er mere end 6 måneder siden, at du åbnede posen.
  - Hvis den er i stykker.
  - Hvis dosistællervinduet viser "0".
  - Hvis du ikke kan læse dosistællervinduet.

**I så tilfælde skal du bortskaffe inhalatoren eller levere den tilbage til den person, der udleverede den og få en ny. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe inhalatorer, som du ikke skal bruge mere.**

## C. Nexthaler-inhalatorens vigtigste egenskaber



Du tager en dosis fra din Nexthaler-inhalator ved at følge tre simple trin: Åbn, inhaler, luk.

## D. Det skal du gøre, før du bruger en ny Nexthaler-inhalator

### 1. Åbn posen, og tag inhalatoren ud.


- Brug ikke inhalatoren, hvis posen ikke er forseglet, eller hvis posen er i stykker – returnér den til den person, der udleverede den og få en ny.
- Brug etiketten og æsken til at skrive datoen du åbnede posen.

### 2. Kontrollér inhalatoren.

- Hvis inhalatoren ser defekt eller skadet ud, skal du returnere den til den person, der udleverede den og få en ny.

### 3. Kontrollér dosistællervinduet. Hvis inhalatoren er helt ny, viser dosistællervinduet "120".

- Brug **ikke** en ny inhalator, hvis tallet i vinduet er lavere end "120" – returner inhalatoren til den person, der udleverede den og få en ny.



## E. Sådan skal du bruge Nexthaler-inhalatoren

- Hvis du ikke er sikker på, at du får din dosis korrekt, skal du kontakte dit apotek eller din læge.
- Hvis du ikke er sikker på, at dosis-tælleren er gået ned efter en indånding, skal du vente til din næste planlagte dosis og tage den som normalt. Tag ikke en ekstra dosis.


### E.1. Åbn

#### 1. Anbring inhalatoren i stående stilling, og hold godt fast om den.

#### 2. Kontrollér antallet af resterende doser: hvis tallet er mellem "1" og "120", er der doser tilbage.

- Hvis der er et "0" i dosistællervinduet, er der ikke flere doser tilbage – bortskaf inhalatoren og få en ny.

#### 3. Åbn låget helt.



#### 4. Inden du inhalerer, skal du puste så meget ud, som du kan uden at føle ubehag.

- Pust **ikke** ud gennem inhalatoren.

### E.2. Inhaler

Om muligt skal du stå eller sidde oprejst, når du inhalerer.

#### 1. Tag inhalatoren op til munden, og anbring læberne omkring mundstykket.

- Du må **ikke** dække for lufthullet, når du holder inhalatoren.
- Du må **ikke** inhalere gennem lufthullet.

#### 2. Tag en hurtig og dyb indånding gennem munden.

- Du kan måske smage det, når du tager dosen.


- Du kan måske høre eller føle et klik, når du tager dosen.
- Du må **ikke** inhalere gennem næsen.
- Du må **ikke** fjerne inhalatoren fra læberne under inhalationen.



3. Tag inhalatoren væk fra munden.
  4. Hold vejret i 5 til 10 sekunder, eller så længe som du kan uden at føle ubehag.
  5. Pust langsom ud.
- Pust **ikke** ud gennem inhalatoren.

### E.3. Luk

1. Anbring igen inhalatoren i stående stilling, og luk låget helt.
2. Kontrollér, at dosistælleren er gået et tal ned.



3. Hvis du skal tage endnu en dosis, skal du gentage trin E.1. til E.3.

### F. Rengøring

- Det er normalt ikke nødvendigt at rengøre inhalatoren.
- Om nødvendigt kan du rengøre inhalatoren efter brug med en tør klud eller serviet.
  - Rengør **ikke** inhalatoren med vand eller anden væske. Hold den tør.

### G. Opbevaring

For information om opbevaring og bortskaffelse, se punkt 5.

### 4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Som ved anden inhalationsbehandling er der risiko for forværring af kortåndethed, hoste og hvæsende vejtrækning umiddelbart efter brug af Innovair Nexthaler. Dette kaldes **paradoxs bronkospasme**. Hvis dette forekommer, skal du **STOPPE brugen af Innovair Nexthaler øjeblikkeligt og straks benytte din inhalator med hurtigtvirkende "anfaldsmedicin"** til at behandle symptomerne. Du skal straks kontakte lægen.

Fortæl det til lægen med det samme, hvis du får allergiske reaktioner, såsom hudallergi, hudkløe, hududslæt, rødme af huden, hævelse af hud eller slimhinder, især ved øjnene, i ansigtet, på læberne og i halsen.

Andre mulige bivirkninger ved Innovair Nexthaler er anført nedenfor efter hyppighed.

Din læge vil sandsynligvis vurdere din astma og om nødvendigt sætte dig i gang med et andet behandlingsforløb. Du vil eventuelt få at vide, at du ikke skal bruge Innovair Nexthaler igen.

**Almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

- Rysten.
- Lungebetændelse (pneumoni) hos KOL-patienter.

Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Innovair Nexthaler. Det kan være tegn på lungebetændelse:

- Feber eller kulderystelser.
- Øget slimproduktion, ændring i slimens farve.
- Tiltagende hoste eller tiltagende vejtrækningsproblemer.

**Ikke almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

- Forkølelseslignende symptomer, ondt i halsen.
- Svampeinfektioner (i munden og halsen). Hvis du skyller munden eller gurgler med vand, og du børster tænder umiddelbart efter inhalation af lægemidlet, kan det være med til at forebygge disse bivirkninger.
- Forværring af dine astmasymptomer, vejtrækningsbesvær.
- Hæshed.
- Hoste.
- Usædvanligt hurtigt hjerteslag.
- Usædvanligt langsomt hjerteslag.

- Skarpe brystsmerter.
- Hovedpine.
- Kvalme.
- Træthed eller nervøsitet.
- Forandringer på elektrokardiogram (EKG).
- Lavt indhold af kortisol i urinen eller i blodet.
- Højt indhold af kalium i blodet.
- Højt blodsukker.
- Højt indhold af fedt i blodet.

**Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt** (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Sløret syn.

**Bivirkninger, der er set med lignende lægemidler til inhalation**, der indeholder beclometasondipropionat og/eller formoterol:

- Hjerteranken.
- Uregelmæssigt hjerteslag.
- Unormal eller nedsat smagssans.
- Muskelsmerter og muskelkramper.
- Rastløshed, svimmelhed.
- Angst.
- Søvnforstyrrelser.
- Nedsat indhold af kalium i blodet.
- Stigning/fald i blodtrykket.

**Brug af høje doser af inhalerede kortikosteroider i en lang periode kan medføre påvirkning af kroppen (systemisk virkning).** Disse omfatter:

- Problemer med binyrernes funktion (undertrykkelse af binyrernes funktion/binyrebarksuppression).
- Nedsat knogletæthed (udtynding af knogler).
- Hæmmet vækst hos børn og unge.
- Forhøjet tryk i øjnene (grøn stær), grå stær.
- Hurtig vægtøgning, især i ansigtet og på overkroppen.
- Søvnproblemer, depression eller uro, rastløshed, nervøsitet, opstemthed eller irritabilitet. Der er større sandsynlighed for, at disse bivirkninger opstår hos børn.
- Unormal adfærd.

#### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

#### 5. OPBEVARING

- Opbevar Innovair Nexthaler utilgængeligt for børn.
- Inden anbrud af folieposen: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Inhalatoren må først tages ud af foliepakningen umiddelbart inden første brug.
- Efter anbrud af folieposen: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
- Holdbarhed efter anbrud af folieposen: 6 måneder. Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.
- Brug ikke Innovair Nexthaler efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

#### 6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Innovair Nexthaler indeholder:**

- Aktivt stof: Beclometasondipropionat, vandfri 100 mikrogram og formoterolfumaratdihydrat 6 mikrogram.  
Dette svarer til en afgivet dosis (den dosis som kommer ud af ventilen) på 81,9 mikrogram beclometasondipropionat, vandfri og 5,0 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (som indeholder små mængder af mælkeproteiner) og magnesiumstearat.

#### Udseende og pakningsstørrelser:

Dette lægemiddel er et hvidt til næsten hvidt inhalationspulver i en plast-inhalator, der hedder Nexthaler.

Hver pakning indeholder en inhalator, som giver 120 inhalationer.

Hver inhalator leveres i en forsejlet beskyttelsespose (pakning af aluminiumsfolie).

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Stationsalleen 42, 1. sal

2730 Herlev

#### Frigivet af:

Paranova Pack A/S

Stationsalleen 42, 1. sal

DK-2730 Herlev

**Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019.**