

**Ibuprofen Medical Valley, 200 mg, 400 mg og 600 mg
filmovertrukne tabletter**

ibuprofen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Ibuprofen Medical Valley til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Medical Valley
3. Sådan skal du tage Ibuprofen Medical Valley
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ibuprofen Medical Valley er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende middel. Det tilhører gruppen af non-steroidale antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan tage Ibuprofen Medical Valley ved

- svage smerter
- gigtsygdomme
- smerter og hævelse i led og muskler
- stærke menstruationssmerter

Lægen kan have givet dig Ibuprofen Medical Valley for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Medical Valley

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ibuprofen Medical Valley, hvis du:

- er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibuprofen Medical Valley angivet i afsnit 6.
- har svært nedsat hjerte-, nyre- eller leverfunktion
- har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID)
- har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse, betændelse i tarmene (Crohns sygdom), mavesår eller maveblødninger mere end en gang
- har sår på tolvfingertarmen
- tidligere har fået vejrtrækningsproblemer, hævet tunge, læber og ansigt, astma, snue eller

- nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)
- har tendens til blødninger
- er gravid i 7. – 9. måned

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ibuprofen Medical Valley.

- Der er rapporteret om tegn på en allergisk reaktion over for dette lægemiddel, herunder vejrtrækningsproblemer, hævelse af ansigt og halsregion (angioødem) samt bryst smerter for ibuprofen. Stop øjeblikkeligt med at tage Ibuprofen Medical Valley, og kontakt straks din læge eller lægevagten, hvis du bemærker nogen af disse tegn.
- Brug af Ibuprofen Medical Valley kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde ("myokardieinfarkt") og slagtilfælde, specielt ved høje doser (2.400 mg dagligt) og ved længere tids brug.
- Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette (fx hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
- Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Ibuprofen Medical Valley, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
- Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks lægen, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
- Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Ibuprofen Medical Valley, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.
- Ibuprofen Medical Valley kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.
- Ibuprofen Medical Valley kan skjule symptomerne på betændelsessygdomme.
- Medicin der er blodfortyndende (forebyggende mod blodpropper) (fx acetylsalicylsyre/aspirin, warfarin, ticlopidin), medicin mod forhøjet blodtryk (såkaldte ACE-hæmmere fx captopril, betablokkere, angiotensin II antagonist) eller andet medicin kan blive påvirket af eller påvirke din behandling med ibuprofen. Spørg altid din læge til råds, før du tager ibuprofen sammen med andet medicin.
- Brug af Ibuprofen Medical Valley kan være forbundet med risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede børn og unge.
- Anti-inflammatoriske / smertestillende medicin som ibuprofen kan være forbundet med en let forøget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, især når de anvendes ved høje doser. Overskrid ikke den anbefalede dosis eller behandlingsvarighed.
- Hvis du har en infektion: Ibuprofen Medical Valley kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Det er derfor muligt, at Ibuprofen Medical Valley kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner i forbindelse med skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte en læge med det samme.

Tal med lægen inden du tager Ibuprofen Medical Valley, hvis du

- har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt, angina (bryst smerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, bypass operation, perifer arteriesygdom (dårlig omsætning i benene og fødderne grundet indsnævrede eller blokerede arterier), eller en hvilken som helst form for slagtilfælde (herunder "mini-slagtilfælde" eller forbigående iskæmisk anfald "TIA")
- tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod ledlidelser, samt acetylsalicylsyre)
- har astma, da astma kan forværres
- har dårlig lever

- har dårlige nyrer
- har forhøjet blodtryk, diabetes, højt kolesteroltal, har en familie hjertesygdom eller slagtilfælde, eller hvis du er ryger
- har en bindevævssygdom (fx Systemisk Lupus Erythematosus (SLE))
- har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID
- tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge risikoen for mavesår og blødning
- har ophobning af vand i kroppen.

Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner.

Vær ekstra forsigtig med Ibuprofen Medical Valley:

Alvorlige hudreaktioner, herunder eksfoliativ dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), og akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), er blevet rapporteret i forbindelse med behandling med ibuprofen. Fortæl det straks til lægen, og stop med at tage Ibuprofen Medical Valley, hvis du oplever nogen af symptomerne på de alvorlige hudreaktioner, der er beskrevet i punkt 4.

Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Det kan være livsfarligt. Ring derfor 112.

Så længe du får Ibuprofen Medical Valley, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ibuprofen Medical Valley. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af andre lægemidler sammen med Ibuprofen Medical Valley

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, inden behandling med Ibuprofen Medical Valley, hvis du tager

- lægemidler, der er antikoagulanter (dvs. fortynder blod/forhindrer koagulation f.eks aspirin/acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin)
- hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE-hæmmere)
- medicin, der reducerer forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere, såsom captopril, beta-blokkere såsom atenolol lægemidler, angiotensin-II receptorantagonister, såsom losartan)
- vanddrivende medicin (fx furosemid, thiazid)
- anden smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre, COX-2 hæmmere)
- medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
- medicin mod mani og depression (lithium og SSRI)
- medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus)
- tabletter med binyrebarkhormoner
- medicin mod HIV (zidovudin)
- medicin til afbrydelse af graviditet (mifepriston)
- medicin mod infektioner (aminoglykosider og quinolon antibioktika)
- naturlægemidler, der indeholder Ginkgo biloba.

Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen af Ibuprofen Medical Valley. Du bør derfor altid søge råd hos din læge eller apoteket, før du bruger Ibuprofen Medical Valley med andre lægemidler.

Brug af Ibuprofen Medical Valley sammen med mad og drikke

Ibuprofen Medical Valley kan tages uafhængigt af måltiderne. Du skal tage Ibuprofen Medical Valley tabletter med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Ibuprofen Medical Valley i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen. Det kan forårsage nyre- og hjerteproblemer hos dit ufødte barn. Det kan påvirke din og dit barns tilbøjelighed til at bløde og forsinke eller forlænge fødslen.

Du må kun tage Ibuprofen Medical Valley i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen. Hvis det tages i mere end et par dage fra 20 ugers graviditet og fremefter, kan Ibuprofen Medical Valley forårsage nyreproblemer hos dit ufødte barn, som kan føre til lave niveauer af fostervand, der omgiver barnet (oligohydramnios) eller forsnævring af et blodkar (ductusarteriosus) i barnets hjerte. Hvis du har brug for behandling i mere end et par dage, kan din læge anbefale yderligere overvågning.

Kvinder, der ønsker at blive gravide

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Ibuprofen Medical Valley eller kun tage Ibuprofen Medical Valley i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt. Ibuprofen Medical Valley kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling.

Amning

Ibuprofen Medical Valley kan anvendes i ammeperioden. Ibuprofen Medical Valley går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibuprofen Medical Valley kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger (svimmelhed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Ibuprofen Medical Valley indeholder lactose

Ibuprofen Medical Valley indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Ibuprofen Medical Valley

Tag altid Ibuprofen Medical Valley nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du bør anvende den laveste effektive dosis i den kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne. Hvis du har en infektion, skal du kontakte en læge med det samme, hvis symptomerne (f.eks. feber eller smerter) varer ved eller bliver værre (se punkt 2).

Du skal tage tabletterne med rigelig vand.

Den anbefalede dosis er:**Gigtsygdomme, smerter og hævelser i led og muskler****Voksne**

Du må højst tage 1 tablet på 400 mg 4 gange daglig eller 1 tablet på 600 mg 3 gange daglig (dvs. i alt 1800 mg). Lægen kan øge dosis op til 6 tabletter på 400 mg eller 4 tabletter på 600 mg daglig, dog kun i kortere tid (højst 4 – 6 uger). Følg lægens anvisning.

Menstruationssmerter

1 tablet på 400 mg, kan evt. gentages hver 6. – 8. time.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du må ikke tage Ibuprofen Medical Valley ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Ibuprofen Medical Valley

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ibuprofen Medical Valley end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas) eller hvis et barn har indtaget lægemidlet ved et uheld, så du kan få en vurdering af risikoen og rådgivning om de forholdsregler, der skal tages.

Tegn på overdosering er

- Mavesmerter, kvalme, opkastning (kan indeholde blodstriber), blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm (se også pkt. 4 nedenfor) og diarré.
- Hovedpine, øresusen, forvirring og rykvisse øjenbevægelser.
- Agitation (rastløs uro), døsighed, forvirring eller dyb bevidstløshed (koma) kan forekomme.
- I nogle tilfælde kan der udvikles kramper.
- Ved høje doser kan der forekomme sløvhed, smerter i brystet, hjertebanken, bevidstløshed, kramper (især hos børn), svaghed, svimmelhed og blod i urinen, lave kaliumniveauer i blodet, kuldefølelse, åndedrætsproblemer.
- Påvirkning af leveren, tørst pga. for højt natrium i blodet, akut nyre og leversvigt, lave kaliumniveauer i blodet.
- Protrombintiden (den tid det tager, for dit blod at størkne) kan være forlænget.
- Forværring af astma kan forekomme hos astma-patienter.
- Påvirkning af hjerte-karsystemet med for lavt blodtryk, langsom puls eller hurtig, uregelmæssig puls. Hos små børn ses også kortvarige åndedrætsstandsninger.

Hvis du har glemt at tage Ibuprofen Medical Valley

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Ibuprofen Medical Valley

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Stop med at bruge Ibuprofen Medical Valley og søg straks lægehjælp, hvis du oplever nogen af de

følgende symptomer:

- Rødlige, ikke-hævede, målformede eller cirkulære pletter på overkroppen, ofte med centrale blærer, hudafskalning, sår i mund, hals, næse, kønsorganer og øjne. Disse alvorlige hududslæt kan give feber og influenza-lignende symptomer [eksfoliativ dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse].
- Udbredt udslæt, høj legemstemperatur og hævede lymfeknuder (DRESS-syndrom).
- Et rødt, skællende, udbredt udslæt med buler under huden og blærer, ledsaget af feber. Symptomerne optræder normalt ved behandlingens start (akut generaliseret eksantematøs pustulose).

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaksi/anafylaktoide reaktioner).
- Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte.
- Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.
- Smerter over lænden, feber, blodig og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder, evt. aftagende nyrefunktion med kvalme og opkastninger pga. nyreskade.
- Leverbetændelse, gulsot, kvalme og opkastninger.
- Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).
- Forværring af astma.
- Smerter i maven, diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. betændelse i tarmen.
- Mundbetændelse med sår.
- Smerter i øjet, rødt øje og lysskyhed pga. betændelse i regnbuehinden.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber eller desorientering pga. meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdomme.
- Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven.
- Skoldkopper (variceller).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

- Akut åndenød med hoste og astmatisk vejtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt.
- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.
- Blodigt diarré pga. forværring af betændelse i tarmen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Ring 112, hvis du får:

- åndenød, angst, brystmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet
- lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning
- unormal leverfunktion.
- brystmerter, som kan være tegn på en potentielt alvorlig allergisk reaktion kaldet Kounis syndrom.

Ikke alvorlige bivirkninger**Meget almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Sure opstød/halsbrand.
- Diarré.

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Mavesmerter.
- Luft i maven.
- Træthed.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

- Kvalme og opkastninger.
- Smerter og ubehag fra maven.
- Fordøjelsesbesvær.
- Forstoppelse.
- Mavekramper.
- Mild forbigående hovedpine.
- Svimmelhed.
- Øresusen (tinnitus).
- Udslæt.
- Vand i kroppen (ødemer).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Synsforstyrrelser med sløret syn, dobbeltsyn og ændret farveopfattelse.
- Kløe.
- Mindre blødning i hud og slimhinder.
- Øget følsomhed af huden for lys.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Nedsat hørelse.
- Snue.
- Overfølsomhed.
- Søvnløshed.
- Nervøsitet.
- Let rastløshed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
- Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.
- Sløvhed.
- Forvirring.
- Koncentrationsbesvær.
- Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.
- Kulderystelser.

- Feber pga. overfølsomhed for Ibuprofen Medical Valley.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

- Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
- Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme.
- Stærkt kløende blærer eller vabler.
- Rødpletet udslæt.
- Hårtab, sygdom i hår og negle.

Ibuprofen Medical Valley kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, fx urinprøver og levertalværdier.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel

5. Opbevaring

Opbevar Ibuprofen Medical Valley utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Ibuprofen Medical Valley ved almindelig temperatur.

Tag ikke Ibuprofen Medical Valley efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ibuprofen Medical Valley indeholder:

Aktivt stof:
Ibuprofen

Øvrige indholdsstoffer:

Tablet
Mikrokrystallinsk cellulose
Lactosemonohydrat

Croscarmellosematrium
Siliciumdioxid, kolloid
Polyvinylpovidon
Majsstivelse
Natriumlaurilsulfat
Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Hydroxypropylcellulose
Hydroxypropylmethylcellulose
Polyethylenglycol
Titandioxid (E 171)

Udseende og pakningsstørrelser

Ibuprofen Medical Valley 200 mg er hvide, runde filmovertrukne tabletter.
Ibuprofen Medical Valley 400 mg er hvide, ovale filmovertrukne tabletter.
Ibuprofen Medical Valley 600 mg er hvide, ovale filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

200 mg:

Blister (PVC og Aluminiumfolie): Pakningsstørrelse 20 stk.
Blister (PVC og Aluminiumfolie) - Unitdose: Pakningsstørrelse 20 stk.
Tabletbeholder (plast, HDPE): Pakningsstørrelser 50, 60, 62,
100, 110, 112 stk.

400 mg:

Blister (PVC og Aluminiumfolie): Pakningsstørrelser 30, 50 stk
Tabletbeholder (plast, HDPE): Pakningsstørrelser 35, 62, 100, 110, 112,
250 stk.

600 mg:

Tabletbeholder (plast, HDPE): Pakningsstørrelser 30, 35, 40, 60, 62, 100,
110, 112, 250 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Medical Valley Invest AB
Brädgårdsvägen 28
23632 Höllviken
Sverige

Fremstiller

PharmaS d.o.o.
Industrijska cesta 5
44317 Potok, Popovača,
Kroatien

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 09/2024