

Indlægsseddel: Information til brugeren

Condylina[®] 5 mg/ml kutanopløsning

podophyllotoxin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Condylina til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at bruge Condylina
- Sådan skal du bruge Condylina
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Condylina er en opløsning til brug på kønsvorter (kondylomer) mod virus. Condylina virker ved at hæmme vækst af de celler, der er virus i og forhindrer, at virus trænger ind i raske celler.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CONDYLINE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Condylina, hvis du:

- er allergisk over for podophyllotoxin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Condylina (angivet i punkt 6).
- har et betændt eller blødende sår nær vorten.
- har et åbent sår ved vorten efter f.eks. et kirurgisk indgreb.
- bruger anden medicin, der indeholder podophyllin.
- er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Condylina.

Vær opmærksom på følgende:

- Undgå at få Condylina i øjne og ansigt. Hvis du får Condylina i øjnene, skal du straks skylle øjnene grundigt med rindende vand.
- Undgå at få Condylina på rask hud, da dette kan forårsage alvorlig irritation og skade på huden. Du skal vaske hænderne grundigt efter hver påføring.
- Du må kun pensle vorten, ikke den raske hud omkring vorten. Der er større risiko for bivirkninger, når du pensler et større område med Condylina.
- Brug kondom ved samleje i behandlingsperioden.

Brug af anden medicin sammen med Condylina

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Hvis du er i behandling med Antabus (disulfiram) eller metronidazol, må du ikke bruge Condylina uden først at tale med lægen.

Du kan bruge Condylina sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke bruge Condylina, hvis du er gravid. Tal med lægen.

Amning

Du må ikke bruge Condylina, hvis du ammer.
Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Condylina påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CONDYLINE

Brug altid Condylina nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Det anbefales, at behandlingen finder sted under direkte overvågning af sundhedspersonale, hvis området, der skal behandles, er større end 4 cm².

Den anbefalede dosis er

Voksne

- Du skal påføre Condylina på kønsvorterne morgen og aften 3 dage i træk. Behandlingen kan gentages efter 4 dages pause, indtil vorterne er borte.
- Rengør vorterne med sæbe og vand før hver påføring, og tør dem grundigt med f.eks. et stykke køkkenrulle.
 - Dyp vatpinden i opløsningen, og smør den på vorterne.
 - Undgå at smøre uden for vorterne.

- Brug en ny vatpind ved hver behandling.
- Lad opløsningen tørre efter påsmøring.
- Vask ikke vorterne efter påsmøring.
- Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen.

Condylone flasken har et sikkerhedslåg, som du åbner ved at trykke låget ned og samtidig dreje mod urets retning. Luk altid flasken omhyggeligt lige efter brug.

Brug til børn

Condylone bør ikke bruges til børn, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig. Børn må kun bruge Condylone efter lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Condylone

Kontakt lægen, skadestue eller sundhedspersonale, hvis du har brugt mere Condylone, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du kommer til at synke Condylone, bør du straks søge lægehjælp. Medbring flasken og denne indlægsseddel.

Hvis du har glemt at bruge Condylone

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Condylone

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Sårdannelse omkring det behandlede område.
- Irritation af huden med rødmen, ømhed, svie og kløe. Dette viser sig evt. først på 2.-3. behandlingsdag. I de fleste tilfælde forsvinder irritationen af sig selv, når behandlingen er afsluttet.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Forhudsbetændelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Condylone utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
- Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
- Brug ikke Condylone efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Condylone indeholder:

- Aktivt stof: Podophyllotoxin 5 mg/ml.
- Øvrige indholdsstoffer: Natriumlactatopløsning 60 %, mælkesyre og ethanol 96 %.

Udseende og pakningsstørrelse:

Condylone kutanopløsning 5 mg/ml findes i pakningsstørrelsen 3,5 ml i glasflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Stationsalleen 42, 1. sal

2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack A/S

Stationsalleen 42, 1. sal

DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2019.