

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Questran® 4 g pulver til oral suspension

colestyramin

05-2025
P458678-8

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Questran
3. Sådan skal du tage Questran
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Questran binder tarmens galdesyre, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyre til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet.

Du kan bruge Questran til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig virkning. Du kan også bruge Questran mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod diaré, som skyldes for meget galdesyre i tarmen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Questran

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Questran:

- hvis du er allergisk over for colestyramin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Questran (angivet i afsnit 6).
- hvis du har total stoppede galdeveje.
- hvis du har sivende eller blodig diarre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Questran, hvis du har:

- stofskifteforstyrrelser.
- diabetes.
- dårlige nyrer.
- en leversygdom.
- skrumpelever.

Vær opmærksom på at Questran kan være med til at du får for lidt A-, D-, E- og K-vitamin og folinsyre. Tal med din læge om du skal have folinsyre og vitamintilskud.

Questran kan være med til at give eller forværre forstoppelse eller hæmorider.

Questran kan ved længerevarende brug medføre syreforgiftning, især hos børn og patienter med nedsat nyrefunktion.

Brug af andre lægemidler sammen med Questran

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager

- fenylobutazon (lægemiddel til behandling af smerter og betændelse),
- non-steroidale antiinflammatoriske lægemidler (diclofenac, meloxicam, piroxicam, sulindac, tenoxicam)
- warfarin, fenprocumon (lægemidler til forebyggelse af blodpropper),
- thiazidlægemidler (hydrochlorthiazid) og furosemid (vanddrivende lægemidler)
- tetracycliner, benzylpenicillin (lægemidler til behandling af betændelse)

- phenobarbital, valproat (lægemidler til behandling af epilepsi, kramper og anfald),
- levothyroxin, liothyronin (lægemidler til behandling af stofskiftet)
- digitalis (digitoxin, digoxin) (lægemidler til behandling af hjertesvigt).
- lægemidler til behandling af hjerterytmien (amiodaron)
- celledræbende lægemidler (methotrexat)
- galdesyre (ursodeoxycholsyre)
- kolesterolsænkende lægemidler (bezafibrat, ezetimib, fluvastatin, pravastatin),
- østrogener og kombinerede orale præventionsmidler (ethinylestradiol)
- leflunomid, mycophenolat (lægemidler der reducerer immunsystemets aktivitet)
- nikotinsyre
- raloxifen (et lægemiddel mod afkalkning af knoglerne)

Ovennævnte lægemidler skal tages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter indtagelse af Questran. Denne forholdsregel vedrører især orale antikoagulantia (lægemidler der forebygger blodpropper), digitalis (lægemidler til behandling af hjertesvigt) og skjoldbruskkirtelhormoner (til behandling af stofskiftet).

Fortæl det desuden din læge, hvis du tager:

- lægemidler, der passerer fra leveren til tarmen og derefter tilbage til leveren i din krop (f.eks. østrogener), da Questran kan forstyrre den måde, disse lægemidler virker på.

Brug af Questran sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Questran i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Questran efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Questran efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Questran indeholder aspartam og propylenglycol

Dette lægemiddel indeholder 30 mg aspartam pr. brev. Aspartam er en phenylalaninkilde. Det kan være skadeligt, hvis du har phenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), en sjælden genetisk lidelse, hvor phenylalanin ophobes, fordi kroppen ikke kan fjerne det ordentligt.

Dette lægemiddel indeholder 32,5 mg propylenglycol pr. brev.

Hvis din baby er yngre end 4 uger, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet, før du giver barnet dette lægemiddel, især hvis barnet får andre lægemidler, der indeholder propylenglycol eller alkohol.

3. Sådan skal du tage Questran

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du må ikke tage Questran tørt. Du skal udrøre pulveret i vand eller anden væske inden indtagelse. Du kan også blande pulveret i mad. Du skal tage andre lægemidler mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Questran.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1-2 breve (4-8 g) 3 gange daglig.

Børn og unge under 18 år

½ brev (2 g) 2 gange daglig, evt. stigende til voksendosis.

Hvis du har taget for meget Questran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Questran, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Questran

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Questran

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Forstoppelse.

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Halsbrand, sure opstød, luftafgang fra tarmen, kvalme, diarre, mavesmerter.
- Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Vægtstigning.
- Overfølsomhedsreaktioner som nældefeber og vand i kroppen. Kontakt lægen.
- Smerter i leddene, muskelsmerter.
- Udslæt, irritation af hud og slimhindeoverflader f.eks. tunge og området omkring endetarmsåbningen.
- Opkastning, fedtdiarre (ved høje doser), huller i tænderne, synkebesvær, bøsven, hæmoriideblødning, smerte i endetarmen, smagsforstyrrelser.
- Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Svimmelhed.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Øget blødningstendens pga. K-vitaminmangel, ved længerevarende behandling (hypoprotrombinæmi).
- A-vitaminmangel og natteblindhed pga. A-vitaminmangel, D-vitaminmangel.
- Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.

- Appetitmangel/madlede.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- Fald i mængden af folinsyre i blodet hos børn.

Questran kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Questran utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen specielle opbevaringsbetingelser.

Tag ikke Questran efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Questran indeholder:

Aktivt stof: colestyramin 4 g som colestyraminchlorid.
Øvrige indholdsstoffer: xanthangummi (E415), kelcoloid (E405) (indeholder propylenglycol), vandfri citronsyre (E330), appelsinaromastof, kolloid silica og aspartam (E951).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder.

Pakningsstørrelser

Questran fås i en pakningsstørrelse á 50 endosispulvere.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstillere:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Questran® er et registreret varemærke der tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2025.