

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mupirocin Carefarm
3. Sådan skal du bruge Mupirocin Carefarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### 1. Virkning og anvendelse

Mupirocin Carefarm er et antibiotikum, der virker bakteriedræbende.

Mupirocin Carefarm anvendes til behandling af nogle særligt modstandsdygtige bakterier, som kan findes i næsen.

Lægen kan have givet dig Mupirocin Carefarm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

#### 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mupirocin Carefarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### Brug ikke Mupirocin Carefarm

- hvis du er allergisk over for mupirocin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mupirocin Carefarm (angivet i punkt 6).

#### Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå at få Mupirocin Carefarm i øjnene. Får du ved et uheld Mupirocin Carefarm i øjnene, så skyl grundigt med vand.

Hvis du får en overfølsomhedsreaktion, skal produktet tørres af og behandlingen opphøre. Tal med lægen om, hvilken behandling du skal have i stedet for.

Hvis du får mavekrampe eller vedvarende diarré skal du tale med lægen. Lægen vil undersøge om dette skyldes, at der er opstået en infektion i tarmen.

#### Brug af anden medicin sammen med Mupirocin Carefarm

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

#### Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

#### Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Mupirocin Carefarm efter aftale med lægen.

#### Amning

Erfaringer med Mupirocin Carefarm er begrænsede. Spørg lægen.

#### Trafik- og arbejdssikkerhed

Mupirocin Carefarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

#### 3. Sådan skal du bruge Mupirocin Carefarm

Brug altid Mupirocin Carefarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Bland ikke Mupirocin Carefarm med andre cremer eller salver, da dette kan nedsætte virkningen af Mupirocin Carefarm.

Vask hænderne før og efter påsmøring af Mupirocin Carefarm.

Den anbefalede dosis af Mupirocin Carefarm er 2 gange daglig i hvert næsebor i 5 til højst 10 dage.

En lille mængde næsesalve svarende til størrelsen af et tændstikhoved placeres med en vatpind i et tyndt lag i hvert næsebor. Efter påsmøring klemmes næseborene sammen et par gange.

#### Hvis du har brugt for meget Mupirocin Carefarm

Fjern forsigtigt overskydende næsesalve. Der opstår sjældent problemer ved overdosering med dette lægemiddel. Hvis du ved et uheld sluger næsesalven skal du spørge lægen, apotekspersonalet eller Giftlinjen til råds.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Mupirocin Carefarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

#### Hvis du har glemt at bruge Mupirocin Carefarm

Hvis du har glemt at påsmøre Mupirocin Carefarm, så smør næsesalven på, så snart du kommer i tanke om det. Hvis den næste dosis er inden for en time, så spring dosis over. Du må ikke bruge dobbelt mængde som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den samme dosis.

#### Hvis du holder op med at bruge Mupirocin Carefarm

Det er vigtigt at tage hele behandlingen med Mupirocin Carefarm. Hvis du holder op med at bruge Mupirocin Carefarm for tidligt, kan det være, at ikke alle bakterier er blevet dræbt eller de kan fortsætte med at vokse. Spørg lægen eller apotekspersonalet, om hvornår du kan holde op med at bruge næsesalven.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

#### 4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige allergiske reaktioner

Disse bivirkninger er meget sjældne hos personer, der bruger Mupirocin Carefarm.

Symptomer du skal holde øje med

- pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112
- udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
- hævet og kløende udslæt.

**Kontakt lægen straks, hvis du får nogle af disse symptomer. Stop med at bruge Mupirocin Carefarm.**

Mupirocin Carefarm kan give irritation af huden og allergiske reaktioner.

Hvis du får en allergisk reaktion på huden, skal du **stoppe med at bruge Mupirocin Carefarm. Fjern næsesalven og kontakt lægen så hurtigt som muligt.**

Medicin som Mupirocin Carefarm kan i sjældne tilfælde give betændelse i tyktarmen, hvilket giver diarré, ofte med blod og slim, mavesmerter og feber. Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer.

**Ikke almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

- løbende næse
- kløe, rødme, en brændende fornemmelse, prikken og/eller svie i næsen.

**Meget sjældne bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

- kløe, rødme og svie på huden.

#### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

**Mupirocin Carefarm 20 mg/g (2%) indeholder:**

Aktivt stof: Mupirocincalcium, svarende til 20 mg mupirocin i 1 g næsesalve.

Øvrige indholdsstoffer (hjelpestoffer): Hvid blød paraffin og Softisan 649.

### Udseende og pakningsstørrelse

#### Udseende

Mupirocin Carefarm er en hvidlig salve.

### Pakningsstørrelse

Tube indeholdende 3 g.

### Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  
Mail: [info@orifarm.com](mailto:info@orifarm.com)  
Tlf.: +45 6395 2700

#### Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Mupirocin Carefarm også som Bactroban Nasal.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2024.