

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Morfin SAD tabletter 10 mg

morphinhydrochloridtrihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Morfin SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfin SAD
3. Sådan skal du tage Morfin SAD
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Morfin SAD er et smertestillende lægemiddel til behandling af stærke smerter og til indledende smertebehandling før operation.

Lægen kan give dig Morfin SAD for noget andet. Spørg lægen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfin SAD

Tag ikke Morfin SAD

- hvis du er allergisk over for morfin eller morfinlignende stoffer (opioider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Morfin SAD (angivet i afsnit 6).
- hvis du er i behandling med anden morfinlignende medicin
- hvis du har nedsat tarmfunktion, eller hvis du har forstoppelse
- hvis du har vejrtrækningsproblemer, svær astma eller lungesygdom
- hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion
- hvis du har eller får pludselige, voldsomme mavesmerter

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af morfin, og at virkningen af morfin kan være nedsat efter lang tids brug. Pludseligt ophør med behandlingen kan give abstinenssymptomer.

Morfin SAD har en sløvende virkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Morfin SAD:

- hvis du har besvær med vejrtrækningen
- hvis du har hjerteflimmer eller meget hurtigt puls
- hvis du får pludselige mavesmerter
- hvis du har nedsat lever- og/eller nyrefunktion
- hvis du har kronisk forstoppelse eller forstyrrelse i tarmfunktionen
- hvis du har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet)
- hvis du har krampeanfald
- hvis du har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald
- hvis du har galdevejssygdomme
- hvis du har betændelse i bugspytkirtlen
- hvis du har et alkoholmisbrug
- hvis du har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom)
- lider af forstørret blærehalskirtel
- hvis du har for lavt stofskifte (myxødem)
- hvis du har for lavt blodtryk
- hvis du har bevidsthedsforstyrrelser
- hvis du er ældre (over 65 år)

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Morfin SAD er optaget på dopinglisten.

Brug af anden medicin sammen med Morfin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

- medicin mod kramper (chloralhydrat)

- muskelafslappende medicin
- beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner)
- medicin mod psykoser (phenothiaziner)
- anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider) (inkl. naltrexon)
- middel mod depression (tricykliske antidepressiva)
- medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere); der skal gå 14 dage mellem behandling med MAO-hæmmere og Morfin SAD
- medicin mod infektion (rifampin)
- medicin mod for meget mavesyre; der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af denne type medicin og Morfin SAD

Fortæl lægen at du behandles med Morfin SAD, hvis du skal bedøves.

Brug af Morfin SAD sammen med mad og drikke

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Morfin SAD.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal undgå at blive gravid under behandling med Morfin SAD, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention.

Hvis du er gravid, må du kun tage Morfin SAD efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Morfin SAD, efter aftale med lægen, da Morfin SAD udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Morfin SAD virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal være opmærksom på, at den sløvende virkning bliver forstærket, hvis du samtidig drikker alkohol.

Morfin SAD indeholder lactose, hvor advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen før du får denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan du tage Morfin SAD

Tabletterne skal tages sammen med rigelig væske. Tabletterne kan evt. deles. Du vil normalt få Morfin SAD af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Du må få Morfin SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Den sædvanlige dosis

Voksne

Stærke smerter: Den normale dosis er 10-30 mg hver 4. time. Lægen kan vælge at øge dosis. Følg lægens anvisning. Behandling før operation: Individuel dosering.

Børn

Stærke smerter: 0,5 mg/kg legemsvægt. Følg lægens anvisning. Behandling før operation: Individuel dosering.

Ældre

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Morfin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Morfin SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Symptomer på overdosering kan være hæmmet vejrtrækning, meget små pupiller, sygelig søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand

eller koma, slappe arme og ben, nyresvigt, kold og klam hud, langsom puls og lavt blodtryk. Alvorlig overdosering kan medføre åndedrætsstop, hjertestop eller død.

Hvis du har glemt at bruge Morfin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis

Hvis du holder op med at tage Morfin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer (f.eks. rastløshed, opkastning, krampes, irritabilitet).

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Psykiske bivirkninger kan forekomme i forbindelse med behandling med morfin, og varierer fra person til person i sværhedsgrad og art (afhængigt af personlighed og behandlingsvarighed).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Ikke alvorlige: Hæmmet vejrtrækning (kan være alvorligt ved høje doser); sløvhed; døsighed (aftager som regel efter nogle dage); hovedpine; forstoppelse; kvalme; opkastning; mundtørhed; humørsvingninger (normalt opstemthed, lejlighedsvis utilfredshed og irritation).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Ikke alvorlige: Snurrende, prikkende fornemmelser eller følelsesløshed i huden; uklarhed; svimmelhed; små pupiller; kortåndethed/astmalignende anfald/åndenød/åndedrætsbesvær; nedsat hosterefleks; sure opstød/halsbrand; diaré; vandladningsbesvær; udslæt; nældefeber; kløe; øget svedtendens; rygsmerter; appetitløshed; urinvejsinfektion; kraftesløshed og svaghed; kulderystelser; feber; hævede fødder, ankler og hænder; depression; forvirring; søvnløshed; aktivitetsændring; adfærdsændring (f.eks. ændring i beslutningsmønster); forbigående hallucinationer; mareridt (især hos ældre); desorientering; abnorm fortolkning af sanseindtryk.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Alvorlige: Øget tryk i kraniet pga. blødninger eller skader i hovedet; besvimelse; kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng (kontakt læge eller skadestue); pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (allergisk reaktion) (kan være livsfarligt. Ring 112); væske i lungerne. Abstinenssymptomer (opkastninger, hyperaktivitet, irritabilitet, rastløshed, stoppet næse, øget appetit, rysten, krampes og skinger gråd) er set hos spædbørn af mødre, der har fået morfin.

Ikke alvorlige: Hjertebanken; smagsforstyrrelse; urinvejskrampes; opstemthed; angst; ophidselse; slaphed; rysten; krampes; muskelstivhed; svimmelhed evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling på grund af lavt blodtryk; synsforstyrrelser (herunder tågesyn, dobbeltsyn og rykvisse, ufrivillige øjenbevægelser); psykisk og fysisk afhængighed; nedsat sexlyst; impotens; manglende menstruation; ansigtsrødmen; galdevejskrampes; utilpashed; nedsat virkning af medicinen.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytskirtlen.

Ikke alvorlige: Langsom puls (kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112); hurtig puls (kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112); astmaanfald hos overfølsomme; for højt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Høje doser kan medføre smerter og forøget smertefølelse (som ikke kan fjernes med yderligere morfin) krampes og pludselige ryk i musklerne.

Morfin SAD kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver som forhøjet levertal og øget udskillelse af et hormon (ADH).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Opbevar Morfin SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Morfin SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Morfin SAD tabletter, 10 mg indeholder

- Aktivt stof: Morphinhydrochloridtrihydrat.
- Øvrige indholdsstoffer: Gelatine; kartoffelstivelse; lactose; magnesiumstearat; talcum (E553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Morfin SAD 10 mg er en rund, hvid til svagt gullighvid tablet med skrå kanter og delekærv.

Morfin SAD findes i pakningsstørrelser på 10 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2024

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk

Vnr. 701094-04