

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dobutrex, koncentrat til infusionsvæske, opløsning, 12,5 mg/ml

dobutamin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dobutrex
3. Sådan skal du tage Dobutrex
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dobutrex indeholder et lægemiddelstof som hedder dobutamin.

Dobutrex anvendes ved af blodtryksfald på grund af hjertesvigt samt andre former for kredsløbssvigt.

Dobutrex virker ved at øge hjertets sammentrækningskræft.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dobutrex

Tag ikke Dobutrex:

- hvis du er allergisk over for dobutamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dobutrex (angivet i pkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Dobutrex.

Brug af andre lægemidler sammen med Dobutrex

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

- Ascorbinsyre (C-vitamin), carvedilol (middel mod forhøjet blodtryk) og entacapon (middel mod Parkinson), eller andre COMT-hæmmere øger virkningen af Dobutrex.
- Beta-blokkere nedsætter virkningen af Dobutrex.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Dobutrex.

Graviditet:

Dobutrex bør ikke anvendes af gravide på grund af manglende viden.

Amning:

Dobutrex bør ikke anvendes af ammende på grund af manglende viden. Det vides ikke om dobutamin udskilles af modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant.

3. Sådan skal du tage dobutamin

Dette lægemiddel er beregnet til infusion, og administreres af lægen, sygeplejersker eller andet sundhedspersonale.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hyppighed	Bivirkninger
Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):	Kvalme Hjertebanken, hjerterytmeforstyrrelser, åndenød Brystsmerter Hovedpine
Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):	Hjertekampe For lidt kalium i blodet
Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):	Forhøjet blodtryk, lavt blodtryk, årebetændelse Allergisk hævelse af ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, anafylaktiske chok – en akut alvorlig allergisk tilstand, betændelse i hjertemuskulaturen
Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data	Problemer med hjertemusklen (stress kardiomyopati også kendt som Takotsubo-syndrom), der viser sig ved brystsmerter, åndenød, svimmelhed, besvimelse, uregelmæssige hjerteslag, når dobutamin bruges til stress-ekkokardiografi

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mereinformation om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Brugsfærdig opløsning skal anvendes indenfor 24 timer. Kræver ingen særlige opbevaringstemperaturer.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dobutrex indeholder:

- Aktivt stof: dobutamin
- Øvrige indholdsstoffer: natriummetabisulfit; sterilt vand; evt. natriumhydroxid og/eller saltsyre til pH-justering.

Udseende og pakningsstørrelser:

Konc. til infusionsvæske, opl. 12,5 mg/ml, 5 x 20 ml, ampuller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Nordic ApS
Marielundsvej 46A
2730 Herlev

Fremstiller:

Siegfried Hameln
Langes Feld 13
317889 Hameln
Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2025

