

Indlægsseddel: Information til brugeren
KLYX® 1 mg/ml + 250 mg/ml rektalvæske, opløsning
docusatnatrium/sorbitol

03-2022
P107489-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge KLYX
3. Sådan skal du bruge KLYX
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

KLYX er et afføringsmiddel, der indføres i endetarmen. KLYX virker ved at øge vandet i afføringen. Hård afføring bliver blød, og afføringen lettes. Væsken i tarmen giver dig en naturlig trang til afføring. KLYX virker efter ca. 5-20 minutter.

Du kan bruge KLYX ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation og undersøgelser af tarmen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge KLYX

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke KLYX

- hvis du er allergisk over for docusatnatrium, sorbitol eller et af de øvrige indholdsstoffer i KLYX (angivet i afsnit 6).
- hvis du lider af manglende eller nedsat passage i tarmen, f.eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen.
- hvis du har smerter i maven af ukendt årsag.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger KLYX.

- Du må kun bruge KLYX i kort tid. Hvis du bruger KLYX i længere tid kan du komme til at lide af mangel på vand og salte. Hvis du dagligt har brug for et afføringsmiddel, skal du tale med lægen.
- Du må ikke bruge afføringsmidler, der indføres i endetarmen, hvis du har blødninger eller betændelse i tarmen, med mindre det er din læge, der har sagt, at du skal anvende KLYX før undersøgelse.
- Tal med din læge, hvis du har hæmorroider eller rifter ved endetarmen.

Brug af anden medicin sammen med KLYX

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Hvis du bruger andre afføringsmidler, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af dem. Tal med din læge.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Du kan bruge KLYX under graviditet, men anden medicin er mere velegnet. Tal med din læge. Du kan bruge KLYX i forbindelse med fødsel.

Amning:

Du kan bruge KLYX, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdsikkerhed

KLYX påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

KLYX indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216)

KLYX indeholder konserveringsmidlerne methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216). De kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge KLYX

Brug altid KLYX nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne:

Ved forstoppelse eller ved tarmtømning skal du bruge et KLYX på 120 ml, eller ved undersøgelse af tarmen et KLYX på 240 ml, hvis det er nødvendigt.

Brug til børn:


Du må ikke give KLYX til børn.

Før du bruger KLYX, kan du opvarme flasken i vandbad til kroppens temperatur.


Hvis virkningen af KLYX er for stærk eller for svag, så henvend dig til din læge eller til apoteket.

Brugsanvisning:

1. For at beskytte studsens, er studsens på flasken forsynet med en hætte (figur 1).



2. Tag hætten af ved at hive med tilstrækkelig kraft (figur 2).
3. Drej det yderste af spidsen af (figur 3).
4. Nu er produktet klar til brug (figur 4).
5. Smør spidsen enten med vaseline eller ved at presse et par dråber KLYX ud.
6. Læg dig ned på venstre side med bøjede ben.
7. Før spidsen forsigtigt ind i endetarmen og pres langsomt væsken ud (figur 5).



8. Træk spidsen ud, mens beholderen stadig er sammenpresset.
9. Forsøg at holde væsken i tarmen i ca. 5-10 minutter.

Der vil normalt være lidt væske tilbage i flasken efter brug.

Hvis du har brugt for meget KLYX

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af KLYX, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at bruge KLYX

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge KLYX

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. Kraftige allergiske reaktioner (specielt hos børn), hvor du kan få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær eller besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. Nældfeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Irritation i endetarmen ved længere tids brug. Smerter og blødning fra endetarmen. Smerter i maven og utilpashed. Mangel på salte i blodet ved længere tids brug (elektrolyttab).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke KLYX efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

KLYX indeholder:

- Aktive stoffer: docusatnatrium og sorbitol.
1 ml rektalvæske, opløsning indeholder 1 mg docusatnatrium og 250 mg sorbitol.
- Øvrige indholdsstoffer:
methylparahydroxybenzoat (E 218),
propylparahydroxybenzoat (E 216),
natriumhydroxid (til pH justering), saltsyre (til pH justering) og rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

KLYX er en ufarvet, ikke helt klar, lidt tyktflydende væske.

Pakningsstørrelser:

120 ml, 240 ml, 10 x 120 ml og 10 x 240 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

KLYX® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V.

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2022.