

Indlægsseddel: Information til brugeren
Norethisteron/estrogen 2care4 0,5 mg/1 mg, tabletter
Norethisteronacetat/estradiol

10-2024
P058630A-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norethisteron/estrogen 2care4
3. Sådan skal du tage Norethisteron/estrogen 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Norethisteron/estrogen 2care4 er et hormonprodukt for kontinuerlig brug. De indeholder en kombination af to forskellige hormoner, et østrogen og et gestagen (estradiol og norethisteronacetat, og det anvendes til såkaldt hormonal substitutionsbehandling (hormonerstatning). Norethisteron/estrogen 2care4 anvendes til kvinder efter overgangsalderen, når der er gået mindst 1 år efter sidste naturlige menstruation.

Hvad Norethisteron/estrogen 2care4 anvendes til

Lindring af symptomer i overgangsalderen

I overgangsalderen falder kvindens østrogenproduktion. Dette kan medføre symptomer som varme i ansigtet, på halsen og brystet (hedeture). Norethisteron/estrogen 2care4 mildner disse symptomer efter overgangsalderen. Lægen vil ordinere Norethisteron/estrogen 2care4 til dig, hvis dine symptomer alvorligt hæmmer dig i din hverdag.

Forebyggelse af knogleskørhed

Efter overgangsalderen kan nogle kvinder udvikle skøre knogler (knogleskørhed). Du bør diskutere alle behandlingsmuligheder med din læge. Hvis du har øget risiko for knoglebrud på grund af knogleskørhed, eller ikke kan bruge anden lægemiddel, kan du anvende Norethisteron/estrogen 2care4 til at forebygge knogleskørhed efter overgangsalderen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norethisteron/estrogen 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Sygehistorie og regelmæssige kontroller

Hormonal substitutionsbehandling indebærer nogle risici, der skal overvejes, når det skal besluttet, om du skal begynde på behandlingen eller fortsætte med den.

Erfaringerne med at behandle kvinder med for tidlig overgangsalder (pga. æggestokkesvigt eller operation) er begrænsede. Hvis du er kommet for tidligt i overgangsalderen, kan risikoen ved at anvende hormonal substitutionsbehandling være anderledes. Tal med din læge.

Før du begynder eller genoptager hormonal substitutionsbehandling, vil din læge gennemgå din og din families sygehistorie. Lægen vil måske beslutte at foretage en fysisk undersøgelse. Dette kan om nødvendigt omfatte en undersøgelse af dine bryster og/eller en gynækologisk undersøgelse.

Når du er startet med Norethisteron/estrogen 2care4, skal du komme til regelmæssig kontrol hos lægen (mindst én gang om året). Her kan du diskutere fordele og risici ved at fortsætte med Norethisteron/estrogen 2care4 med lægen.

Efter lægens anvisning skal du regelmæssigt have undersøgt brysterne (brystscreening).

Tag ikke Norethisteron/estrogen 2care4:

- hvis du er **allergisk** over for østrogen, gestagener eller et af de øvrige indholdsstoffer i Norethisteron/estrogen 2care4 (angivet i afsnit 6);
- hvis du har eller har haft **brystkræft**, eller hvis du har mistanke om, at du har brystkræft;
- hvis du har **kræft, der er følsom over for østrogen**er som f.eks. kræft i livmoderslimhinden, eller har mistanke om, at du har det;
- hvis du har **blødninger fra skeden og ikke kender årsagen**;
- hvis du har **overdreven vækst af livmoderslimhinden** (endometriehyperplasi);
- hvis du har eller har haft **en blodprop i en blodåre** (dyb venetrombose) f.eks. i benet (dyb venetrombose) **eller i lungerne** (lungeemboli);
- hvis du har en **forstyrrelse i blodets størkningsevne** (som f.eks. protein C-, protein S- eller antitrombinmangel);
- hvis du har eller har nylig har haft sygdom pga blodpropper i blodårerne, som f.eks. **et hjerteslag, et slagtilfælde eller hjertekrampe** (angina pectoris);
- hvis du har eller har haft en **leversygdom** og dine leverprøver ikke er blevet normale igen;
- **hvis du har en sjælden blodsygdom, der kaldes "porfyri"**, som er arvelig.

Hvis du oplever en af ovennævnte tilstande for første gang under behandling med Norethisteron/estrogen 2care4, skal du omgående holde op med at tage tabletterne og kontakte din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Norethisteron/estrogen 2care4.

Før du begynder behandlingen, skal du fortælle det til lægen, hvis du tidligere har haft et af nedenstående problemer, da disse kan vende tilbage eller blive værre under behandlingen med Norethisteron/estrogen 2care4. I bekræftende fald skal du konsultere lægen oftere for at blive checket:

- godartede muskelknuder i livmoderen;
- vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose) eller tidligere har haft overdreven vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi);
- øget risiko for at udvikle blodpropper (se "Blodpropper i en blodåre (trombose)");
- øget risiko for at få østrogenfølsom brystkræft (hvis du f.eks. har en moder, en søster eller mormor, der har haft brystkræft);
- forhøjet blodtryk;
- en leversygdom som f.eks. en godartet leversvulst;
- sukkersyge;
- galdesten;
- migræne eller kraftig hovedpine;
- en sygdom i immunsystemet, der påvirker mange af kroppens organer (systemisk lupus erythematosus, SLE);
- epilepsi;
- astma
- en sygdom, der påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose);
- et meget højt fedtindhold i blodet (triglycerider);
- væskeophobning pga. hjerte- eller nyreproblemer;
- arvelig og erhvervet angioødem.

Hold op med at tage Norethisteron/estrogen 2care4 og kontakt øjeblikkeligt lægen

Hvis du oplever noget af følgende, når du får hormonal substitutionsbehandling:

- en af de tilstande, der er nævnt i punktet "Tag ikke Norethisteron/estrogen 2care4";
- en gulfarvning af din hud eller af det hvide i dine øjne (gulsot). Det kan være tegn på en leversygdom;
- hævelser i ansigt, tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær eller nældefeber, sammen med vejrtrækningsbesvær, hvilket tyder på et angioødem;
- en stor stigning i dit blodtryk (symptomer kan være hovedpine, træthed, svimmelhed);
- migræneagtig hovedpine for første gang;
- hvis du bliver gravid;
- hvis du har tegn på en blodprop, som f.eks.
 - smertefulde hævelser og rødme på benene,
 - pludselig smerte i brystet,
 - vejrtrækningsbesvær.

Se yderligere under "Blodpropper i en blodåre (trombose)".

Bemærk: Norethisteron/estrogen 2care4 er ikke en p-pille. Hvis det er mindre end 12 måneder siden, du havde din sidste menstruation, eller du er under 50 år, kan du stadig være nødt til at anvende yderligere prævention for at undgå graviditet. Bed din læge om råd.

Hormonal substitutionsbehandling og kræft

Overdreven vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometrie cancer)

Hvis du får hormonal substitutionsbehandling kun med østrogene, vil det øge risikoen for overdreven vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometrie cancer). Gestagenet i Norethisteron/estrogen 2care4 beskytter dig mod denne ekstra risiko.

Uregelmæssig blødning

Du kan få uregelmæssig blødning eller pletblødning i de første 3-6 måneder, hvor du tager Norethisteron/estrogen 2care4.

Hvis den uregelmæssige blødning:

- fortsætter i mere end de første 6 måneder,
- begynder efter at du har taget Norethisteron/estrogen 2care4 i mere end 6 måneder,
- fortsætter efter at du er stoppet med at tage Norethisteron/estrogen 2care4 ,

skal du dog så hurtigt som muligt tale med din læge.

Brystkræft

Der er påvist øget risiko for brystkræft ved hormonerstatningsbehandling (HRT) med kombineret østrogen-progestogen eller med østrogen alene. Den øgede risiko afhænger af, hvor længe du bruger HRT. Den øgede risiko viser sig inden for 3 års brug. Efter ophør af HRT falder den øgede risiko med tiden, men risikoen kan bestå i 10 år eller mere, hvis du har brugt HRT i mere end 5 år.

Sammenligning

Ud af 1.000 kvinder i alderen 50-54 år, der ikke får hormonerstatningsbehandling, diagnosticeres i gennemsnit 13-17 med brystkræft i løbet af en periode på 5 år.

Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med østrogen alene i 5 år, vil der være 16-17 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 0-3 tilfælde).

Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med kombineret østrogen og gestagen i 5 år, vil der være 21 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 4-8 tilfælde).

Ud af 1.000 kvinder i alderen 50-59 år, der ikke får HRT, diagnosticeres i gennemsnit 27 med brystkræft i løbet af en periode på 10 år.

Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med østrogen alene i 10 år, vil der være 34 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 7 tilfælde)

Blandt kvinder på 50 år, der påbegynder HRT med kombineret østrogen og gestagen i 10 år, vil der være 48 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. yderligere 21 tilfælde).

Tjek dine bryster regelmæssigt. Kontakt lægen, hvis du mærker forandringer som f.eks.:

- indtrækning af huden;

- ændringer af brystvorterne;
- knuder, som kan ses eller føles.

Du anbefales desuden at deltage i mammografiscreeningsprogrammer, hvis du får det tilbudt. I forbindelse med mammografiscreening er det vigtigt, at du oplyser sygeplejersken eller sundhedspersonalet, som foretager undersøgelsen, at du tager hormonal substitutionsbehandling, da dette lægemiddel kan påvirke resultatet af mammografien ved at øge vævstætheden i dine bryster. Der hvor tætheden af vævet i brystet er forøget, kan mammografien måske ikke påvise alle knuder.

Kræft i æggestokkene

Kræft i æggestokkene (ovariecancer) ses sjældent

- langt sjældnere end brystkræft. Hormonal substitutionsbehandling med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen er blevet forbundet med en let øget risiko for kræft i æggestokkene.

Risikoen for kræft i æggestokkene afhænger af kvindens alder. Eksempel: Blandt kvinder i alderen 50-54 år, som ikke tager hormonal substitutionsbehandling, diagnosticeres kræft i æggestokkene hos ca. 2 ud af 2.000 kvinder i løbet af en periode på 5 år. Blandt kvinder, som har taget hormonal substitutionsbehandling i 5 år, vil der være ca. 3 tilfælde for hver 2.000 brugere (dvs. ca. 1 yderligere tilfælde).

Virkning af hormonal substitutionsbehandling på hjerte og kredsløb

Blodpropper i en blodåre (trombose)

Risikoen for en **blodprop i en blodåre** er omkring 1,3 til 3 gange højere hos kvinder, der får hormonal substitutionsbehandling end hos kvinder, der ikke får det, især i det første år.

Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop når lungerne, kan den forårsage brystmerter, åndenød, besvimelse eller endog død.

Du har større risiko for at få en blodprop, efterhånden som du bliver ældre, og hvis noget af følgende gælder for dig. Fortæl det til lægen, hvis noget af følgende gælder for dig:

- du ikke kan gå i længere tid på grund af en større operation, tilskadekomst eller sygdom (se også pkt. 3. "Hvis du skal opereres");
- du er svært overvægtig (BMI > 30 kg/m²);
- du har problemer med blodets størkning, som kræver langtidsbehandling med et lægemiddel, der anvendes til at forebygge blodpropper;
- hvis en af dine nære slægtinge har haft en blodprop i ben, lunger eller i et andet organ;
- du har systemisk lupus erythematosus;
- du har kræft.

Vedrørende tegn på en blodprop se "Hold op med at tage Norethisteron/estrogen 2care4 og kontakt øjeblikkeligt lægen".

Sammenligning

Hos kvinder i 50erne, der ikke får hormonal substitutionsbehandling, kan i gennemsnit 4-7 ud af 1000 kvinder forventes at få en blodprop i en blodåre i løbet af en 5-årig periode. Hos kvinder i 50erne, der har fået hormonal substitutionsbehandling med østrogen-gestagen i mere end 5 år, vil der være 9-12 tilfælde hos 1000 brugere (dvs. 5 ekstra tilfælde).

Hjertesygdom (hjerteanfald)

Der er ingen beviser for, at hormonal substitutionsbehandling vil forebygge hjerteanfald.

Kvinder over 60 år, der får hormonal substitutionsbehandling med østrogen-gestagen, har en lidt større sandsynlighed for at få en hjertesygdom end kvinder, der ikke får hormonal substitutionsbehandling.

Slagtilfælde

Risikoen for at få et slagtilfælde er omkring 1,5 gange større hos kvinder, der får hormonal substitutionsbehandling, end hos kvinder, der ikke gør. Antallet af ekstra tilfælde med slagtilfælde på grund af hormonal substitutionsbehandling stiger med alderen.

Sammenligning

Hos kvinder i 50erne, der ikke får hormonal substitutionsbehandling, kan i gennemsnit 8 ud af 1000 kvinder forvente at få et slagtilfælde i løbet af en 5-årig periode. Hos kvinder i 50erne, der får hormonal substitutionsbehandling, vil der være 11 tilfælde ud af 1000 kvinder i løbet af 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde).

Andre tilstande

- Hormonal substitutionsbehandling forebygger ikke hukommelsestab. Der er nogen tegn på, at der er et større hukommelsestab hos kvinder, der begynder med at få hormonal substitutionsbehandling efter de 65 år. Bed din læge om råd.
- Hos kvinder med arveligt angioødem kan hormonal substitutionsbehandling øge eller forværre symptomerne.

Brug af andre lægemidler sammen med Norethisteron/estrogen 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af **Norethisteron/estrogen 2care4**. Dette kan medføre uregelmæssig blødning. Det gælder følgende lægemidler:

- lægemidler til behandling af **epilepsi** (som f.eks. phenobarbital, phenytoin, og carbamazepin);
- lægemidler til behandling af tuberkulose (som f.eks. rifampicin og rifabutin);
- lægemidler til behandling af **HIV-infektioner** (som f.eks. nevirapin, efavirenz, nelfinavir, telaprevir og ritonavir);
- urtelægemidlet **prikbladet perikon** (Hypericum perforatum).

HRT kan påvirke virkningen af andre lægemidler:

- Lægemidler mod epilepsi (lamotrigin), da det kan øge hyppigheden af anfald.
- Lægemidler mod hepatitis C-virus (HCV) (såsom kombinationsregimet ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden dasabuvir samt et regime med glecaprevir/pibrentasvir) kan forårsage stigninger i blodprøveresultater for leverfunktion (stigning i ALAT-leverenzym) hos kvinder, der bruger hormonelle kontrazeptiva af kombinationstypen (CHC'er) med ethinylestradiol. Norethisteron/estrogen 2care4 indeholder østradiol i stedet for ethinylestradiol. Det vides ikke, om der kan forekomme en stigning i ALAT-leverenzym, når Norethisteron/estrogen 2care4 bruges sammen med dette HCV-kombinationsregime.

Norethisteron/estrogen 2care4 kan øge eller nedsætte virkningen af andre lægemidler:

– Virkningen af cyclosporin (anvendes f.eks. til forebyggelse af afstødning af transplantater, behandling af symptomer på gigt eller psoriasis) kan øges.

Lægemidler, der indeholder ketoconazol (et svampemiddel) kan øge effekten af Norethisteron/estrogen 2care4.

Laboratorieprøver

Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager Norethisteron/estrogen 2care4, da Norethisteron/estrogen 2care4 kan påvirke resultaterne fra visse prøver.

Graviditet og amning

Norethisteron/estrogen 2care4 er til brug for kvinder i overgangsalderen. Hvis du bliver gravid, skal du straks stoppe med at tage Norethisteron/estrogen 2care4 og kontakte din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Norethisteron/estrogen 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Norethisteron/estrogen 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Norethisteron/estrogen 2care4

Tag altid Norethisteron/estrogen 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

- Den sædvanlige dosis er en tablet dagligt uden pause mellem blisterkortene.
- Tag den første tablet ud af blisterpakningen svarende til den ugedag, hvor du begynder at tage Norethisteron/estrogen 2care4 (f.eks. "MA" for mandag). Tag derefter én tablet hver dag i pilens retning, indtil der ikke er flere tabletter tilbage i blisterpakningen. Start på en ny blisterpakning den næste dag.
- Tabletterne skal sluges med tilstrækkelig mængde vand, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag.

Din læge vil sigte mod at ordinere den laveste dosis til at behandle dine symptomer så kort som det er nødvendigt. Tal med din læge, hvis du synes denne dosis er for stærk eller ikke stærk nok.

Hvis du har taget for meget Norethisteron/estrogen 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Norethisteron/estrogen 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Efter en overdosis kan du opleve ømhed i brystet, få kvalme eller opkastning, have uregelmæssig menstruation, føle dig ked af det, træt, få akne eller tabe mere hår på kroppen, hovedet og i ansigtet.

Hvis du af fejltagelse tager en ekstra dosis skal du alligevel tage den almindelige dosis næste dag.

Hvis du har glemt at tage Norethisteron/estrogen 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det (inden for 12 timer fra det sædvanlige tidspunkt). Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Hvis du holder op med at tage Norethisteron/estrogen 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du fortælle kirurgen, at du tager Norethisteron/estrogen 2care4. Måske skal du stoppe med at tage Norethisteron/estrogen 2care4 4 til 6 uger før operationen for at nedsætte risikoen for en blodprop (se afsnit 2. "Blodpropper i en blodåre (trombose)"). Spørg lægen om, hvornår du kan begynde at tage Norethisteron/estrogen 2care4 igen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger plejer at være milde til moderate og hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at stoppe behandlingen.

Følgende sygdomme ses hyppigere hos kvinder, der får hormonal substitutionsbehandling sammenlignet med kvinder, der ikke får det:

- brystkræft;
- overdreven vækst af livmoderslimhinden eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi eller cancer);
- kræft i æggestokkene;
- blodpropper i en blodåre i benene eller lungerne (venøs tromboemboli);
- hjertesygdom;
- slagtilfælde;
- muligt hukommelsestab hvis hormonal substitutionsbehandling påbegyndes efter 65-årsalderen.

Se afsnit 2 for yderligere oplysninger om disse bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan indtræffe under behandling med Norethisteron/estrogen 2care4:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- Vaginalblødning.
- Smerter i brysterne og brystspænding.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

- Svampeinfektion i skeden eller betændelse i skeden.
- Væskeophobning i kroppen.
- Depression eller forværring af igangværende depression.
- Migræne eller forværret migræne, hovedpine.
- Kvalme.
- Rygsmerter.
- Brystødemer eller brystforstørrelse.
- Godartede knuder (tumorer) i livmoderslimhinden (myom) eller forværring eller tilbagekomst af godartede knuder (tumorer) i livmoderslimhinden.
- Hævelse af arme og ben (perifere ødemer).
- Vægtstigning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

- Overfølsomhed (allergiske reaktioner).
- Nervøsitet.
- Overfladisk venebetændelse (trombose) kombineret med blodprop.
- Mavesmerter, oppustethed, ubehag eller luft i maven.
- Unormal (sygeligt kraftig) hårvækst, akne, hårtab.
- Kløe.
- Nældefeber.
- Krampe i benene.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

- Blodpropper i lungerne (se også afsnit 2. "Det skal du vide, før du begynder at tage Norethisteron/estrogen 2care4").
- Dyb venebetændelse kombineret med blodprop.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

- Anafylatiske reaktioner (pludselige, alvorlige, muligt livstruende allergiske reaktioner).

Følgende bivirkninger er set med anden hormonal substitutionsbehandling:

- galdeblæresygdom
- forskellige hudsygdomme:
 - misfarvning af huden, især i ansigtet eller på halsen, kendt som "graviditetspletter" (chloasma)
 - smertefulde rødlige hudknuder (erytema nodosum)
 - udslet med velafgrænset rødmen eller sår (erytema multiforme)
- øjenthørhed
- ændringer i tårefilmens sammensætning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Norethisteron/estrogen 2care4 utilgængeligt for børn.

Tag ikke Norethisteron/estrogen 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger**Norethisteron/estrogen 2care4 indeholder:**

- Aktive stoffer: 1 mg estradiol (som estradiolvalerat) og 0,5 mg norethisteronacetat.
- Øvrige indholdsstoffer: Copovidon, lactosemonohydrat, magnesiumstearat og majsstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser**Udseende**

Hvide, runde, bikonvekse tabletter, 6 mm i diameter.

Pakningsstørrelser

Kalenderblisterkort med 84 tabletter.

**Indehaver af markeds-
føringstilladelsen:**

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Norethisteron/estrogen 2care4 svarer til Cliovelle®.

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2024.