

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ferro Duretter 100 mg, depottabletter

ferrosulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Tag altid Ferro Duretter nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ferro Duretter
3. Sådan skal du tage Ferro Duretter
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ferro Duretter er et jernpræparat for voksne og unge over 12 år. Jernet udløses jævnt fra depottabletten over et stykke tid. Du kan tage Ferro Duretter til at forebygge og behandle jernmangel. Jernmangel kan f.eks. opstå, hvis du får for lidt jern i maden, hvis du har blødt meget, eller hvis du er bloddonor. Hvis din læge har sagt, at du skal tage Ferro Duretter for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ferro Duretter

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisninger.

Tag ikke Ferro Duretter, hvis du

- er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ferro Duretter (angivet i punkt 6)
- har forsnævring eller forandringer i spiserøret, mavesækken eller tarmen pga. sår, betændelse eller svulster
- har en sygdom hvor jern ophobes i kroppen (hæmokromatose eller hæmosiderose)
- har en sygdom, der kaldes hudporfyri, hvor der forekommer blærer eller sår på hudområder, der har været udsat for sollys
- har andre former for blodmangel (anæmi), som ikke ledsages af jernmangel, f.eks. hæmolytisk anæmi
- har fået flere blodtransfusioner
- har fået jernpræparater parenteralt (via en vene).

Advarsler og forsigtighedsregler

På grund af risiko for mundsår og misfarvning af tænderne må tabletterne ikke suges, tygges eller opløses i munden, men skal synkes hele med vand. Hvis du ikke kan følge disse anvisninger, skal du kontakte lægen.

Inden du tager Ferro Duretter, skal du tale med lægen, hvis du

- har sår og/eller betændelse i mavesæk eller tarm
- har besvær med at synke. Hvis tabletten forbliver i mundhulen, kan der opstå skader i mund og spiserør eller betændelse i mundhulen
- har nedsat nyre- eller leverfunktion
- har blodmangel, der ikke skyldes jernmangel, men anden sygdom

- har et alkoholmisbrug
- er på speciel diæt eller tager andre jerntilskud
- får eller har fået gentagne blodtransfusioner.

Hvis du ved et uheld kommer til at få en tablet galt i halsen, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt. Grunden hertil er, at der er risiko for sår og forsnævring af bronkierne, hvis tabletten kommer ned i luftvejene. Dette kan resultere i en vedvarende hoste, at man hoster blod op og/eller føler sig forpustet, også selv om man fik tabletten galt i halsen, flere dage eller måneder før disse symptomer indtraf. Der er derfor behov for, at du bliver undersøgt hurtigt, så man er sikker på, at tabletten ikke beskadiger dine luftveje.

Vær opmærksom på følgende

- Ferro Duretter kan give forgiftninger hos børn.
- Ferro Duretter kan farve afføringen mørk.
- Den anbefalede dosis bør ikke overskrides (se afsnittet ”Hvis du har taget for mange Ferro Duretter”).

Brug af andre lægemidler sammen med Ferro Duretter

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

De fleste påvirkninger kan undgås, hvis du tager Ferro Duretter 2–4 timer før eller efter dine andre lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager lægemidler mod

- betændelse (infektioner) (ciprofloxacin, doxycyclin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracykliner)
- halsbrand og sure opstød (antacida)
- for højt blodtryk eller dårligt hjerte (captopril, methyldopa)
- leddegigt (penicillamin)
- Parkinsons sygdom (levodopa, carbidopa)
- for lavt stofskifte (levothyroxin)
- knoglelidelser f.eks. knogleskørhed (alendronat, clodronat, risedronat)
- afstødning efter transplantation (mykofenolatmofetil)
- zinkmangel (f.eks. zink i kosttilskud og vitaminer).

Brug af Ferro Duretter sammen med mad og drikke

Du kan tage Ferro Duretter i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Ferro Duretter, depottabletter med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ferro Duretter.

Graviditet

Hvis du er gravid, bør du kontakte din læge, før du tager Ferro Duretter.

Amning

Hvis du ammer, bør du kontakte din læge, før du tager Ferro Duretter.

Frugtbarhed

Der er ingen data vedrørende Ferro Duretters indflydelse på frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ferro Duretter påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Ferro Duretter

Synk tabletterne hele med vand. Du må ikke sutte på eller tygge tabletterne eller opløse dem i munden. Du må ikke tage depottabletterne, imens du ligger ned. Tag altid Ferro Duretter nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge fra 12 år

Behandling af jernmangel: 1 depottablet 2 gange dagligt.

Forebyggende mod jernmangel: 1 depottablet hver aften.

Graviditet: 1 depottablet hver aften fra 20. graviditetsuge.

Bloddonorer: 1 depottablet 1 gang dagligt i 14 dage efter tapning.

Børn

Bør ikke anvendes til børn under 12 år, da doseringsformen ikke er egnet til in-dividuel til-passet dosering som påkrævet hos børn.

Hvis du har taget for mange Ferro Duretter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Ferro Duretter, depottabletter end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag tabletglas eller blisterpakning med. Symptomer på overdosering er i første omgang forbigående mavesmerter, opkastning, diarré evt. med blodig afføring, væsketab og træthed. Efter 6-24 timer kan tilstanden blive alvorlig med feber, krampes og shock samt hjerte-, lever- og nyreskader.

Hvis du har glemt at tage Ferro Duretter

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede:

- Kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede:

- Synkebesvær og smerter bag brystbenet pga.sårdannelse eller forsnævring i spiserøret. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Hududslæt.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data):

- Mundsår (i tilfælde af forkert brug, dvs. hvis tabletterne tygges, suges eller opløses i munden).
- Mørkfarvet afføring.
- Forsnævring af bronkierne i luftvejene (hvis tabletten utilsigtet kommer ned i luftvejene).

Alle patienter, men især ældre patienter og patienter, der har svært ved at synke, kan risikere sårdannelse i svælget eller spiserøret (som forbinder munden med maven). Hvis tabletten kommer ned i luftvejene er der risiko for sårdannelse i bronkierne (de store luftpassager i lungerne), som kan resultere i forsnævring af bronkierne (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Ferro Duretter utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den original emballage for at beskytte mod fugt.
- Tag ikke Ferro Duretter efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ferro Duretter 100 mg, depottabletter indeholder:

Aktivt stof: Jern (Fe⁺⁺) i form af tørret ferrosulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Ascorbinsyre, polyethylen, povidon, carbomer, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 6000, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), paraffin special.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Ferro Duretter 100 mg er runde, gule depottabletter, mærket A/DD.

Pakningsstørrelser

Plastbeholder: 100 stk.

Blisterpakning: 200 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

SE-194 26 Upplands Väsby

Sverige

Fremstiller

Richard Bittner AG, Ossiacherstrasse 7, 9560 Feldkirchen, Østrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2023