

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kloramfenikol 2care4 10 mg/g (1%) øjensalve

chloramphenicol

10-2022
P105968-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol 2care4
3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol 2care4 er et bakteriehæmmende lægemiddel (antibiotikum) til behandling af øjenbetændelse.

Øjensalven kan anvendes til både børn og voksne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Kloramfenikol 2care4

- hvis du er allergisk over for chloramphenicol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kloramfenikol 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Kloramfenikol 2care4, hvis du har en knoglemarvssygdom, eller nogen i din familie har eller har haft alvorlige blodsygdomme.

Vær opmærksom på, at du:

- ikke må bruge Kloramfenikol 2care4 sammen med kontaktlinser
- ikke bør bruge Kloramfenikol 2care4 længere end 2 uger, da der ellers er risiko for udvikling af bivirkninger og resistens (medicinen virker ikke).

Brug af andre lægemidler sammen med Kloramfenikol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Andre lægemidler kan ændre virkningen af Kloramfenikol 2care4, eller Kloramfenikol 2care4

kan ændre virkningen af andre lægemidler. Tal derfor med din læge, hvis du tager andre lægemidler mod infektion (penicillin, cefalosporiner, gentamicin, tetracyklin, polymyxin B) eller lægemidler, der kan have en indvirkning på knoglemarven.

Hvis du bruger andre lægemidler i øjnene, skal du vente ca. 5 minutter, efter du har brugt Kloramfenikol 2care4, før du bruger det næste lægemiddel.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Kloramfenikol 2care4 under graviditet.

Amning

Du kan bruge Kloramfenikol 2care4, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kloramfenikol 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol 2care4

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brugsanvisning

Træk ned i det nederste øjenlåg og tryk ½ cm salve ud i lommen mellem øje og øjenlåg. Luk øjet og fordel salven ved at massere let på øjenlåget.

Selvom der sker en bedring efter få dage, er det vigtigt at fortsætte behandlingen i den periode, lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn: Salven anvendes 3 - 6 gange dagligt, i det antal dage lægen har sagt. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn

Din læge kan udskrive en lavere dosis til nyfødte for at nedsætte risikoen for bivirkninger.

Behandlingen må højst vare 10 - 14 dage.

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Kloramfenikol 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har brugt for meget øjensalve, kan du skylle øjet med vand eller saltvand.

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Det bedste resultat opnås, når doseringen følges.

Hvis du holder op med at bruge Kloramfenikol 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Brændende, sviende fornemmelse og irritation i øjnene, rødme i det hvide område af øjet, ny infektion (muligvis med bakterier, der ikke kan behandles), allergiske reaktioner.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Betændelse i synsnerven, der kan medføre blindhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Påvirkning af knoglemarven ved langvarig brug, væskeophobning under huden især ved læber og hals.

Ikke alvorlige: Sløvhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker og tendens til infektioner, nældefeber, udslæt, øjenbetændelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Kloramfenikol 2care4 utilgængeligt for børn.

Inden anbrud: Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Holdbarhed efter anbrud: 1 måned. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Kloramfenikol 2care4 efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kloramfenikol 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: chloramphenicol. 1 g øjensalve indeholder 10 mg chloramphenicol.
- Øvrige indholdsstoffer: paraffinolie og gul, blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser

Kloramfenikol 2care4 øjensalve er en gul salve, der findes i pakningsstørrelser à 5 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Kloramfenikol 2care4 svarer til Kloramfenikol DAK.

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2022.