

Medikinet 5 mg tabletter

Medikinet 10 mg tabletter

Medikinet 20 mg tabletter

methylphenidathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du/dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. - Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. - Lægen har ordineret Medikinet til dig/dit barn personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du/dit barn har. - Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du/dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
--

Oversigt over indlægssedlen:

- 1** Virkning og anvendelse
- 2** Det skal du vide, for du/dit barn begynder at tage Medikinet
- 3** Sådan skal du/dit barn tage Medikinet
- 4** Bivirkninger
- 5** Opbevaring
- 6** Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](#)

1 VIRKNING OG ANVENDELSE

Anvendelse

Medikinet anvendes til at behandle 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder' (ADHD).

- det anvendes til børn og unge i alderen 6 til 18 år,
- det anvendes kun efter at anden form for behandling er forsøgt, som ikke involverer lægemidler, fx rådgivning og adfærdsterapi.

Medikinet bruges ikke til behandling af ADHD hos børn under 6 år eller hos voksne. Det vides ikke, om det er sikkert eller gavnligt for disse aldersgrupper.

Virkning

Medikinet forøger aktiviteten i dele af hjernen, som ikke er aktive nok. Medicinen kan hjælpe med at skærpe opmærksomheden (opmærksomhedsspændvidde), øge koncentrationen og mindske impulsiv adfærd.

Medicinen er givet som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter:

- psykologisk,
- uddannelsesmæssig og
- social behandling.

Behandling med Medikinet må kun påbegyndes af og videreføres under tilsyn af en specialist i adfærdsforstyrrelser hos børn og unge. Selv om der ikke er nogen helbredelse for ADHD, kan det styres ved hjælp af behandlingsprogrammer.

Om ADHD

Børn og unge med ADHD har:

- svært ved at sidde stille
- svært ved at koncentrere sig

Det er ikke deres skyld, at de har svært ved disse ting.

Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. Men med ADHD kan hverdagen volde problemer. Børn og unge med ADHD kan have svært ved indlæring og lektielæsning. De har svært ved at opføre sig ordentligt i hjemmet, i skolen eller andre steder. ADHD påvirker ikke barnets eller den unges intelligens.

2 DET SKAL DU VIDE, FØR DU/DIT BARN BEGYNDER AT TAGE MEDIKINET

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Medikinet

hvis du/dit barn:

- er allergisk over for methylphenidathydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)
- har en skjoldbruskkirtelsygdom
- har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
- har en svulst i binyrerne (fæokromocytom)
- har problemer i forhold til spisning, når du ikke føler dig sulten eller ønsker at spise - såsom "anoreksi"
- har meget højt blodtryk eller forsnavring af blodkar, som kan give smerter i arme og ben
- på noget tidspunkt har haft hjerteproblemer - såsom et hjerteanfald, uregelmæssig hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, en hjertesygdom eller er født med en hjertelidelse
- har haft et problem med blodkarrene i hjernen - såsom et slagtilfælde, udposning og svækkelse af en del af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar, eller betændelse i blodkar (vasculitis)
- i øjeblikket tager eller inden for de sidste 14 dage har taget et antidepressivt middel (en monoaminoxidasehæmmer) - se afsnittet 'Brug af anden medicin sammen med Medikinet'
- har psykiske problemer såsom:
 - en 'psykopatisk' eller 'borderline' personlighedsstruktur
 - unormale tanker eller visioner eller en sygdom kaldet 'skizofreni'
 - tegn på tungsind såsom:
 - o tanker om at tage livet af sig
 - o en svær depression, hvor du føler dig meget trist, værdiløs og uden håb
 - o en mani, hvor du føler dig overgearet, overdrevent aktiv og uden hæmninger.

Du/dit barn må ikke tage methylphenidathydrochlorid, hvis noget af ovenstående passer på dig/dit barn. Hvis du ikke er sikker, så tal med din læge eller apoteket, for du/dit barn tager methylphenidathydrochlorid. Dette skyldes, at methylphenidathydrochlorid kan gøre disse problemer værre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Medikinet, hvis du/dit barn

- har lever- eller nyreproblemer
- har problemer med at synke eller sluge hele tabletter
- har haft anfald (krampe, krampetanfald, epilepsi) eller unormale værdier ved hjernescanninger (EEG-målinger)
- på noget tidspunkt har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika
- er kvinde og er begyndt at menstruere (se afsnittet 'Graviditet og amning')
- har ensartede (stereotype), gentagne, ufrivillige bevægelser i en del af kroppen eller frembringer ensartede (stereotype), gentagne lyde og ord (tics)
- har forhøjet blodtryk
- har en hjertelidelse, som ikke er nævnt i afsnittet 'Tag ikke Medikinet'
- har psykiske problemer, som ikke er nævnt i afsnittet 'Tag ikke Medikinet'. Andre psykiske problemer omfatter:
 - humørsvingninger (fra manisk til depressiv tilstand - kaldet 'bipolar lidelse')
 - begynder at blive aggressiv eller fjendtlig, eller aggressionen bliver værre
 - ser, hører eller føler ting, som ikke er der (hallucinationer)
 - tror ting, som ikke er virkelige (vrangforestillinger)
 - plages af usædvanlig mistænksomhed (paranoia)
 - føler uro, angst eller anspændthed
 - føler dig deprimeret eller skyldig.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis noget af ovenstående passer på dig/dit barn, for behandlingen påbegyndes. Dette skyldes, at methylphenidathydrochlorid kan gøre disse problemer værre. Din læge vil føre tilsyn med, hvordan medicinen påvirker dig/dit barn.

Under behandlingen kan drenge og unge mænd opleve vedvarende erektioner. Dette kan være smertefuld og kan indtræffe på ethvert tidspunkt. Det er vigtigt at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis din erektion varer længere end to timer, navnlig hvis du har smerter.

Undersøgelser, som din læge vil udføre, før du/dit barn begynder at tage methylphenidathydrochlorid
Disse undersøgelser vil afgøre, om methylphenidathydrochlorid er den rette medicin for dig/dit barn. Din læge vil tale med dig om:

- anden medicin, som du/dit barn får
- om der er fortilfælde af pludselig, uforklarlig død i familien
- andre medicinske problemer (såsom hjerteproblemer), som du eller din familie eventuelt kunne have
- hvorдан du/dit barn har det, fx er du/dit barn helt ovenpå eller helt nede, har du/dit barn mærkelige tanker, eller har du/dit barn haft nogle af disse følelser før i tiden
- hvorvidt der er en arvelig disposition for 'tics', dvs. ensartede (stereotype), gentagne, ufrivillige bevægelser i en del af kroppen eller frembringelse ensartede lyde og ord
- eventuelle psykiske eller adfærdsmæssige problemer, du/dit barn eller andre familemedlemmer på et tidspunkt har haft.

Din læge vil diskutere, om du/dit barn har risiko for humørsvingninger (fra manisk til depressiv tilstand - kaldet 'bipolar lidelse'). Lægen vil kontrollere din/dit barns mentale sundhed og tjekke, om der i din familie har været fortilfælde af selvmord, bipolar sygdom eller depression. Det er vigtigt, at du giver så mange informationer som muligt. Dette vil hjælpe din læge til at afgøre, om methylphenidathydrochlorid er den rette medicin for dig/dit barn. Din læge kan beslutte, at andre medicinske undersøgelser er nødvendige, for du/dit barn begynder at tage medicinen.

Narkotikatest

Dette lægemiddel kan give et positivt resultat ved narkotikatest.

Atleter skal være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan give positive resultater ved dopingtests.

Brug af anden medicin sammen med Medikinet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du/dit barn tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tag ikke methylphenidathydrochlorid, hvis du/dit barn:

- tager et lægemiddel, som tilhører en gruppe, som kaldes 'monoaminoxidasehæmmere' (MAO-hæmmere), der anvendes til depression, eller har taget en MAO-hæmmer inden for de sidste 14 dage. Kombinationen af MAO-hæmmere og methylphenidathydrochlorid kan medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

Hvis du/dit barn tager anden medicin, kan methylphenidathydrochlorid have indflydelse på, hvor godt den virker, eller give bivirkninger. Hvis du/dit barn får nogle af følgende lægemidler, skal du kontakte din læge eller apoteket, for du/dit barn tager methylphenidathydrochlorid:

- anden medicin mod depression
- medicin for alvorlige psykiske lidelser
- medicin mod epilepsi
- medicin, der anvendes til at sænke eller øge blodtrykket
- nogle produkter mod hoste og forkølelse, der indeholder ingredienser, som kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt at forhøre sig på apoteket, for du køber et af disse produkter
- medicin, som virker blodfortyndende for at forebygge blodpropper.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget af den medicin, du/dit barn får, er omfattet af listen ovenfor, så forhør dig hos din læge eller på apoteket, før du/dit barn tager methylphenidathydrochlorid.

Hvis du/dit barn skal have foretaget en operation

Fortæl det til lægen, hvis du/dit barn skal have foretaget en operation. Methylphenidathydrochlorid bør ikke tages den dag, operationen udføres, hvis der anvendes en bestemt type anæstesi. Dette skyldes, at der er risiko for en pludselig stigning i blodtrykket under operationen.

Brug af Medikinet sammen med mad og drikke

Indtagelse af Medikinet sammen med mad kan hjælpe til at undgå mavesmerter, kvalme eller opkastning.

Brug af Medikinet sammen med alkohol

Du/dit barn må ikke drikke alkohol, mens du/dit barn tager denne medicin. Alkohol kan forværre bivirkningerne af medicinen. Husk, at nogle fødevarer og medicin indeholder alkohol.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, for du tager nogen form for medicin.

De foreliggende data tyder ikke på, at der er større risiko for fødselsdefekter overordnet set, men det kan ikke udelukkes, at der er en lidt forhøjet risiko for misdannelser af hjertet, når produktet anvendes i graviditetens første tre måneder. Din læge vil kunne give dig flere oplysninger om denne risiko. Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, for du/din datter bruger methylphenidathydrochlorid, hvis du/din datter:

- er seksuelt aktiv. Lægen vil rådgive dig/din datter om prævention.
- er gravid, har mistanke om, at du/dit barn er gravid eller planlægger at blive gravid. Lægen vil afgøre, om du/din datter bør tage methylphenidathydrochlorid.
- ammer eller planlægger at amme. Det er muligt, at methylphenidathydrochlorid udskilles i modermælk. Derfor vil lægen beslutte, om du/din datter bør amme og samtidig tage methylphenidathydrochlorid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekan. Det betyder, at Medikinet kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og enden til at færdes sikkert i trafikken.

Du/dit barn kan føle svimmelhed, dosighed have problemer med at fokusere, have sløret syn, hallucinationer eller andre CNS-bivirkninger ved indtagelse af methylphenidathydrochlorid. Hvis det sker, kan det være farligt fx at køre bil, betjene maskiner, køre på cykel, ride eller klatre i træer.

Medikinet indeholder lactose

Kontakt lægen, før du/dit barn tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du/dit barn ikke tåler visse sukkerarter.

3 SÅDAN SKAL DU/DIT BARN TAGE MEDIKINET

Tag altid Medikinet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den maksimale daglige dosis er 60 mg.

- Lægen vil som regel starte behandlingen med en lav dosis på 5 mg methylphenidat én eller to gange dagligt, om morgenen og til frokost, og gradvist øge den efter behov.
- Lægen vil fortælle dig hvilken tabletstyrke du skal tage dagligt.
- For at undgå problemer med at falde i søvn bør den sidste dosis generelt ikke tages senere end 4 timer inden sengetid.

Din læge vil tage nogle prøver

- for du/dit barn starter behandlingen – for at sikre, at Medikinet er sikkert og effektivt.
- efter du/dit barn er startet på behandlingen – de vil blive taget mindst hver 6. måned, men måske oftere. De vil også blive taget, hvis dosis ændres.
- disse prøver vil omfatte:
 - kontrol af appetitten
 - måling af højde og vægt
 - måling af blodtryk og hjerterytme
 - kontrol af problemer med humøret, sindstilstanden eller andre usædvanlige følelser. Eller hvis disse er blevet værre, mens du/dit barn har taget Medikinet.

Administrationsmåde

Dette lægemiddel er beregnet til oral brug/via munden.

Du/dit barn bør synke tabletterne hele sammen med et glas vand. Hvis det er nødvendigt, kan tabletterne deles i to halvdelen. Tag tabletterne sammen med eller efter et måltid.

Hvis du/dit barn ikke får det bedre efter 1 månedes behandling

Hvis du/dit barn ikke får det bedre efter 1 månedes behandling, så fortæl det til din læge. Lægen kan beslutte, at du eller dit barn har brug for en anden behandling.

Langtidsbehandling

Det er ikke nødvendigt at tage Medikinet for evigt. Hvis du/dit barn tager Medikinet i mere end et år, bør lægen stoppe behandling for en kort tid, fx i løbet af en skoleferie. Dette vil vise, om medicinen stadig er nødvendig.

Hvis du/dit barn ikke bruger Medikinet korrekt

Hvis Medikinet ikke anvendes korrekt, kan dette medføre unormal adfærd. Det kan også betyde, at du/dit barn udvikler en afhængighed af medicinen. Fortæl det til din læge, hvis du/dit barn nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika. Lægen har ordineret Medikinet til dig/dit barn personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre, selvom de har de samme symptomer, som du/dit barn har.

Hvis du/dit barn har taget for meget Medikinet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du/dit barn har taget mere Medikinet, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Fortæl hvor meget Medikinet du/dit barn har taget. Du kan få brug for medicinsk behandling.

Tegn på overdosering kan omfatte: opkastning, følelse af uro, rysten, øget forekomst af ukontrollerede bevægelser, muskeltrækninger, anfald (eventuelt efterfulgt af koma), stor glædefølelse, forvirring, se, føle eller høre ting, som ikke er virkelige (hallucinationer), svedtendens, rødmen, hovedpine, høj feber, ændringer i hjerterytmen (langsom, hurtigt eller uregelmæssig), forhøjet blodtryk, udvidede pupiller, tørre slimhinder i næse og mund, muskelspasmer, feber og rødbrun urin, som kan være mulige tegn på unormal nedbrydning af muskler (rhabdomyolyse).

Hvis du/dit barn har glemt at tage Medikinet

Du/dit barn må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du/dit barn holder op med at tage Medikinet

Hvis du/dit barn pludselig holder op med at tage Medikinet, kan ADHD symptomerne komme igen eller uønskede reaktioner, såsom depression, kan forekomme. Din læge vil måske gradvist reducere den daglige dosis af medicinen, for du/dit barn stopper helt. Tal med din læge, for du/dit barn stopper med at tage Medikinet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4 BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Din læge vil tale med dig om disse bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du/dit barn har nogle af nedenstående bivirkninger, så skal du straks kontakte en læge:
Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer - uregelmæssige hjerteslag (palpitationer) - personlighedsændringer. - kraftig tænderskæren (bruxisme)
Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer - at tænke på eller have lyst til at tage livet af sig - føle eller høre ting, som ikke er virkelige, de er tegn på en psykose - ukontrolleret tale og ukontrollerede kropsbewægelser (Tourettes syndrom) - tegn på allergi, såsom udslæt, kløe, nældefeber, hævelse af ansigt, læber, tungen eller andre dele af kroppen, åndenød, hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær - humørsvingninger, humørændringer.
Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer følelse af at være overgearet, overdrevent aktiv og uden hæmninger (mani).
Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer - hjerteanfald - anfald (krampe, epilepsi med krampe) - afskalning af huden eller lilla/røde pletter - ufrivillige muskelspasmer, som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesystem – på grund af en midlertidigt manglende blodtilførsel til hjernen - lammelser eller problemer med bevægelser og syn, besvær med at tale (disse kan være tegn på problemer med blodkarrene i hjernen) - fald i antallet af blodlegemer (røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader), som kan gøre dig mere sårbar over for infektioner, og gør, at du bløder og lettere får blå mærker - en pludselig stigning i kropstemperaturen, meget højt blodtryk og svære krampe ('malignt neuroleptikasyndrom'). Det er ikke sikkert, at denne bivirkning er forårsaget af methylphenidathydrochlorid eller andre lægemidler, der eventuelt tages i kombination med methylphenidathydrochlorid.
Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data - uønskede tanker, som bliver ved med at vende tilbage - uforklarlig besvimelse, bryst smerter, åndenød (disse kan være tegn på hjerteproblemer).
Hvis du har nogle af de bivirkninger, som er nævnt ovenfor, skal du straks kontakte en læge.

Andre bivirkninger omfatter følgende, hvis de bliver værre, bør du fortælle det til din læge eller på apoteket:

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

- nedsat appetit
- hovedpine
- nervøsitet
- svært ved at falde i søvn
- kvalme
- tør mund.

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

- ledsmerter
- høj temperatur (feber)
- usædvanligt hårtal eller udtynding af håret
- følelse af usædvanlig søvnighed eller slovhed
- manglende appetit
- panikanfald
- nedsat sexlyst
- tandpine
- kløe, udslæt eller opsvulmet, rødt, kløende udslæt (nældefeber)
- overdreven svedtendens
- hoste, ondt i halsen eller næsen og irritation i halsen, åndenød eller bryst smerter
- ændringer i blodtrykket (normalt højt blodtryk), hurtigt hjerterytme (takykardi), kolde hænder eller fødder
- rysten og skælven, svimmelhed, ufrivillige bevægelser, følelse af indre rastløshed, overdreven aktivitet
- følelse af at være aggressiv, nervøs, rastløs, angst, deprimeret, stresset, irritable og unormal adfærd, søvnforstyrrelser, træthed
- mavesmerter, diarré, kvalme, mavegener, fordøjelsesbesvær, tørst og opkastning. Disse bivirkninger forekommer normalt i starten af behandlingen, og kan lindres ved samtidig fødeindtag.

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

- forstoppelse
- ubehag i brystet
- blod i urinen
- dobbeltsyn, sløret syn
- muskelsmerter, muskeltrækninger, muskelspændinger
- forhøjelse af levertestresultater (ses i en blodprøve)
- vrede, følelse af gråd, overdreven bevidsthed om omgivelserne, anspændthed.

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

- ændringer i seksualdriften
- følelse af desorientering
- forstørrede pupiller, problemer med at se
- udvikling af bryster hos mænd
- rødme af huden, røde, opsvulmede hududslæt.

Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

- hjerteanfald
- pludselig død
- muskelkrampe
- små røde mærker på huden
- betændelse eller blokerede arterier i hjernen
- unormal leverfunktion, herunder leversvigt og koma
- ændringer i testresultaterne - herunder lever og blodprøver
- selvmordsforsøg (herunder fuldbdyrdet selvmord), unormal tænkning, manglende følelser eller sindsbevægelser, at gøre tingene igen og igen, at være besat af en ting
- fingre og tæer er følelsesløse, prikkende og skifter farve (fra hvid til blå, derefter til rød), når det er koldt ("Raynauds fænomen").

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data

- migræne
- meget høj feber
- langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag
- et større anfald ("grand mal krampe")
- at tro ting, som ikke er virkelige, forvirring
- stærke mavesmerter, ofte med kvalme og opkastning
- problemer med blodkarrene i hjernen (apopleksi, cerebral arteritis eller cerebral okklusion)
- manglende evne til at få eller opretholde erektion (erektil dysfunktion)
- vedvarende og til tider smertefulde erektioner, eller hyppigere erektioner
- overdreven, ukontrolleret tale
- manglende evne til at styre din vandladning (inkontinens)
- krampe i kæbemusklerne, der gør det vanskeligt at åbne munden (trismus)
- stammen
- næseblod.

Virkninger på væksten

Når methylphenidathydrochlorid bruges i mere end et år, kan det medføre lavere vækst hos nogle børn. Dette forekommer hos færre end 1 ud af 10 børn.

- Stagnation i vægt eller højde kan forekomme.
- Lægen vil omhyggeligt følge din/dit barns højde og vægt, samt hvad du/dit barn spiser.
- Hvis du/dit barn ikke vokser som forventet, kan behandling med methylphenidathydrochlorid stoppes i en kort periode.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du/dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5 OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletlet eller skraldepanden.

6 PAKNINGSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Medikinet indeholder:

Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid

Medikinet 5 mg tabletter:

Hver tablet indeholder 5 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 4,35 mg methylphenidat.

Medikinet 10 mg tabletter:

Hver tablet indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 8,65 mg methylphenidat.

Medikinet 20 mg tabletter:

Hver tablet indeholder 20 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 17,30 mg methylphenidat.