

Indlægsseddel: Information til brugeren**Mucomyst®****200 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning****acetylcystein**

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, sundheds- eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Mucomyst til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, sundheds- eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucomyst
3. Sådan skal du tage Mucomyst
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mucomyst er et slimløsende læge-middel, som kan bruges ved hoste med sejt slim. Mucomyst virker ved at gøre sejt slim mere tyndtflydende og derved lettere at hoste op.

Mucomyst indåndes (inhaleres) ved hjælp af en forstøvermaskine (nebulisator) drevet af komprimeret luft (se punkt 3). Opløsningen forstøves så den kan indåndes.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MUCOMYST

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tag ikke Mucomyst:

- hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mucomyst (angivet i punkt 6).
- hvis du for nylig har hostet blod op.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, sundheds- eller apoteks-personalet, før du tager Mucomyst:

- hvis du lider af uforklarlig vejrtrækningsbesvær eller tidligere har haft vejrtrækningsbesvær (bronkospasme).
- hvis du lider af astma.

Mucomyst kan give en stor mængde slim, som skal suges væk, hvis du ikke selv kan hoste det op, så det ikke lukker for luftvejene.

Brug af andre lægemidler sammen med Mucomyst

Fortæl det altid til lægen eller apoteks-personalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept, lægemidler købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Mucomyst kan påvirke behandling med anden medicin såsom:

- Visse antibiotika, f.eks. cephalexin.
- Blodfortyndende lægemidler. Hvis du er i behandling med blodfortyndende lægemidler, bør du kontakte din læge.

Hvis du både er i behandling med Mucomyst og antibiotika, bør du tage de to slags medicin med 1-2 timers mellemrum. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er i tvivl.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Mucomyst efter aftale med lægen.

Amning

Der er ingen erfaring med anvendelse af Mucomyst hos ammende kvinder. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucomyst påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Mucomyst indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 28,35 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr. ml. Dette svarer til 1,42% af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MUCOMYST

Tag altid Mucomyst nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Lægen fastlægger doseringen, så den passer til den enkelte patient. Følg derfor altid lægens anvisning.

Den anbefalede dosis er:

0,6-1 g (3-5 ml) som inhaleres 3-4 gange dagligt.

Du skal bruge Mucomyst inhalationsvæske med et forstøverapparat (nebulisator) drevet af komprimeret luft. Nebulisatoren forstøver opløsningen, som indåndes gennem munden. Tal med din læge eller sundhedspersonalet. Lægen eller sundhedspersonalet kan fortælle dig, hvilken nebulisator du kan anvende med Mucomyst.

Sådan anvendes Mucomyst med nebulisator:

- Brug en nebulisator drevet af komprimeret luft. Lægen eller sundhedspersonalet kan fortælle dig, hvilken nebulisator du kan anvende med Mucomyst.
- Anvend en ren nebulisator. Fabrikanten af nebulisatoren, kan vejlede dig omkring rengøring af udstyret.
- Træk Mucomyst opløsning op af hætteglasset med sprøjte og kanyle. Kanylen sættes igennem den grå gummimembran, og opløsning trækkes op i sprøjten.
- Kom Mucomyst opløsning i nebulisatorens kammer.
- Følg nebulisatorens instruktioner og inhaler Mucomyst med det samme. Lægen eller sundhedspersonalet kan fortælle dig hvilke indstillinger du skal anvende for nebulisator og komprimeret luft.
- Hvis du skal inhalere en stor mængde Mucomyst opløsning over længere tid, er det nødvendigt at spæde den resterende mængde i nebulisator kammeret op med tilsvarende mængde sterilt vand, når $\frac{3}{4}$ af opløsningen er brugt.
- Hvis der er overskydende opløsning i hætteglasset, skal det opbevares i køleskab.
- Rengør nebulisatoren efter brug med Mucomyst. Fabrikanten af nebulisatoren kan vejlede dig omkring rengøring af udstyret.

Bemærk: Acetylcystein reagerer med visse gummikvaliteter samt jern og kobber. Inhalationsapparaturer, hvor disse materialer indgår, bør undgås.

Hvis du får vejrtrækningsbesvær, skal du holde op med at tage Mucomyst og straks kontakte lægen.

Hvis du har taget for meget Mucomyst

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Mucomyst, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomerne på overdosering med Mucomyst kan være fordøjelsesbesvær i form af ubehag (sure opstød) eller smerter i maven.

Hvis du har glemt at tage Mucomyst

Du må ikke taget en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Forsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Mucomyst

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød (bronkospasme) kan forekomme hos astmatikere. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Udslæt, kløe og nældefeber.
- Snue.
- Kvalme, diarré, mundbetændelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Mucomyst utilgængeligt for børn.
- Uåbnet glas: Opbevares under 25 °C.
- Åbnet glas: Opbevares i ved 2 - 8 °C.
- Holbar i 4 uger efter første åbning.
- Åbningsdatoen kan angives på æsken og glasset, hvor der er gjort plads til det.
- Brug ikke Mucomyst efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER**Mucomyst indeholder:**

- Aktivt stof: Acetylcystein 200 mg/ml.
- Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumedetat, natriumhydroxid og sterilt vand.

Udseende

Mucomyst opløsning er en klar væske.

Mucomyst har en meget speciel lugt, som normalt kun opfattes i starten af inhalationen.

Pakningsstørrelser

Mucomyst findes i pakningstørrelserne 1 x 10 ml og 10 x 10 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Stationsalleen 42, 1. sal

2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack A/S

Stationsalleen 42, 1. sal

DK-2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2019