

Indlægsseddel: Information til brugeren
Lymecyclin 2care4 300 mg hårde kapsler
lymecyclin
Styrkeangivelsen 300 mg svarer til indholdet af tetracyclin

04-2025
P534337-1

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lymecyclin 2care4
3. Sådan skal du tage Lymecyclin 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lymecyclin 2care4 tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes tetracyclin-antibiotika.

Lymecyclin 2care4 bruges til at behandle moderat til svær akne.

Det forhindrer bakterievækst ved infektioner som:

- Akne. Viser sig ved hudorme (sorte eller gullige), som folk normalt omtaler som bumser. Lymecyclin 2care4 angriber bakterierne, som er en af de primære årsager til akne. Navnet på disse bakterier er *propionibacterium acnes*. Hvis du ikke er sikker på, hvorfor du har fået ordineret dette lægemiddel, skal du tale med din læge.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lymecyclin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Lymecyclin 2care4

- hvis du er allergisk over for lymecyclin, andre tetracyclin-antibiotika eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lymecyclin 2care4 (angivet i afsnit 6).
- hvis du nogensinde tidligere har haft nyresygdom
- hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer
- hvis du tager systemiske retinoider inklusive orale retinoider (disse omfatter nogle andre typer lægemidler, der bruges til at behandle akne).

Lymecyclin 2care4 må ikke anvendes til børn under 8 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lymecyclin 2care4

- hvis du har haft problemer med leveren

- hvis du har haft problemer med nyrerne
- hvis du lider af systemisk lupus erythematosus (en allergisk lidelse som medfører ledsmerter, hududslæt eller feber)
- hvis du lider af myasthenia gravis (en sygdom som svækker musklerne).

Du bør undgå direkte sollys eller kunstigt sollys fra solarier. Hvis du oplever ubehag i huden, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og søge råd hos din læge.

Fortæl det til lægen, hvis du får svær, vedvarende diarré under behandlingen, da det kan være en alvorlig tarmsygdom (pseudomembranøs colitis), der kræver omgående behandling (se afsnit 4).

Børn og unge

Lymecyclin 2care4 anbefales ikke til børn under 12 år, da det kan forårsage varig misfarvning af tændernes emalje og påvirke knoglernes udvikling.

Brug af andre lægemidler sammen med Lymecyclin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Tag ikke følgende lægemidler samtidig med Lymecyclin 2care4, da de kan påvirke, hvor godt Lymecyclin 2care4 virker. Tag dem mindst to timer før Lymecyclin 2care4 eller to timer efter:

- midler mod dårlig fordøjelse
- lægemidler mod mavesår, der indeholder bismuth og sucralfat
- quinapril (mod forhøjet blodtryk)
- kosttilskud der indeholder calcium, aluminium, magnesium, zink eller jern
- didanosin (bruges til behandling af hiv).

Fortæl din læge, hvis du tager noget af følgende:

- systemiske retinoider inklusive orale retinoider (til behandling af akne) eller lægemidler, der indeholder høje doser af vitamin A (lægemidler mod mangel på vitamin A) (se "Tag ikke Lymecyclin 2care4")
- antikoagulanter (til at forhindre blodpropper)
- vanddrivende lægemidler (til behandling af nyresygdom, hjertesygdom eller for højt blodtryk)
- behandling med lithium, da dette lægemiddel kan forhøje niveauerne af lithium.

Brug af Lymecyclin 2care4 sammen med mad og drikke

Optagelsen af Lymecyclin 2care4 påvirkes ikke af moderate mængder mælk (f.eks. et glas). Lymecyclin 2care4 bør altid tages med et glas vand og et let måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Lymecyclin 2care4, hvis du er gravid eller ammer.

Brug af lægemidler som Lymecyclin 2care4 kan påvirke normal vækst af tænder, der er under udvikling og føre til varig misfarvning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget forsøg om påvirkninger på evnen til at køre og betjene maskiner.

3. Sådan skal du tage Lymecyclin 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Voksne og børn over 12 år

Moderat til alvorlig akne

Den sædvanlige dosis af Lymecyclin 2care4 er 1 kapsel 1 gang dagligt, helst om morgenen. Lymecyclin 2care4 kapsler skal altid tages med et glas vand, i en siddende eller stående position for at undgå skader i spiserøret. De bør altid tages med et let måltid uden mejeriprodukter.

Længden af behandlingen med Lymecyclin 2care4 afhænger af, hvor hurtigt din tilstand forbedres. Ved akne tager det normalt mindst 8 til 12 uger. Din læge kan beslutte at fortsætte behandlingen i højst 6 måneder.

Børn

Anvend ikke Lymecyclin 2care4 til børn under 8 år. Lymecyclin 2care4 anbefales ikke til børn under 12 år, da det kan forårsage varig misfarvning af tændernes emalje og påvirke knogleudviklingen.

Nedsat nyrefunktion

Hvis du har problemer med nyrerne, kan din læge vælge at sætte din dosis ned.

Hvis du har taget for meget Lymecyclin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lymecyclin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Lymecyclin 2care4

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du blot tage den, når du kommer i tanke om det og fortsætte som hidtil, med mindre det er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må aldrig tage flere kapsler, end din læge har ordineret.

Hvis du holder op med at tage

Lymecyclin 2care4

Akne reagerer langsomt på antibiotika. Det er vigtigt, at du tager al den Lymecyclin 2care4, som din læge har ordineret til dig. Hvis du stopper med at tage Lymecyclin 2care4 for hurtigt, kan din akne eller infektion blive værre eller komme tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage dine kapsler og straks fortælle det til din læge eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital.

Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres fra de forhåndenværende data)

- Alvorlig allergisk reaktion som medfører hævelse i ansigt, tunge og hals der kan medføre svære vejrtræknings- og synkeproblemer (angioødem) eller allergisk reaktion med feber, hududslæt, hævelse og af og til blodtryksfald.
- Alvorlig sygdom med svær afskalning og hævelse på huden, blæredannelse på hud, mund, øjne, kønsorganer og feber. Hududslæt med pink-røde pletter især på håndfladen eller fodsåler, som kan få blærer.
- Alvorlig, vedvarende eller blodig diarré (som kan være forbundet med mavesmerter eller feber). Denne bivirkning kan forekomme efter behandling med antibiotika og kan være et tegn på alvorlig tarmbetændelse.
- Symptomer, som synsforstyrrelser eller hovedpine, kan skyldes øget tryk i hjernen (intrakraniell hypertension). Hvis der er tegn på øget tryk i hjernen, skal du stoppe med at tage Lymecyclin 2care4.

Lymecyclin 2care4 kan også give følgende bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

- kvalme
- mavesmerter
- diarré
- hovedpine.

Mavegener kan lindres ved at tage kapslerne med mad.

Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres fra de forhåndenværende data)

- synsforstyrrelser
- svimmelhed
- betændelse i tungen
- opkastning
- gulfarvning af hud og øjne (gulsot)
- leverbetændelse (hepatitis)
- øget hudfølsomhed over for sollys

- øget tryk i hjernen
- ændringer i antal/type af visse blodceller
- smerte i den øverste del af maven
- ændringer i visse blodprøver (leverfunktionsprøver)
- feber
- kløe, udslæt på huden eller nældefeber
- betændelse i tarmen
- depression
- mareridt.

Følgende bivirkninger kan forekomme under behandling med den lægemiddelklasse, som Lymecyclin 2care4 tilhører (tetracycliner):

- betændelse eller sår dannelse i spiserøret, der giver smerter eller besvær med at synke eller smertefuld halsbrand
- problemer med at synke
- betændelse i bugspytkirtlen
- leverskade
- systemisk lupus erythematosus
- misfarvning af tænder
- forandringer i blodet (nedsat antal røde blodlegemer, øget antal af visse hvide blodlegemer)
- forhøjet niveau af urinstof i blodet, hvilket kan forstærkes, hvis du tager vanddrivende lægemidler med tetracyclin
- betændelse og ømhed i tunge, mund, kinder, gummer eller læber
- ømhed eller kløe i området ved kønsorganerne
- gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller genitalerne
- infektion i endetarmen
- forhøjet tryk i hjernen (benign intrakraniell hypertension), hvor symptomerne omfatter hovedpine, opkastning, synsforstyrrelser (sløret syn, blinde pletter, dobbeltsyn) eller varigt synstab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.
Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lymecyclin 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: lymecyclin. 1 hård kapsel indeholder 408 mg lymecyclin svarende til 300 mg tetracyclin.
- Øvrige indholdsstoffer: kolloid silica, magnesiumstearat.
Kapselskal: titandioxid (E171), gelatine.
Kapselhætte: indigocarmin (E132), sort jernoxid (E172), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), gelatine.

Udseende og pakningsstørrelser

Hård gelatinekapsel størrelse 0, blå hætte og hvid kapselskal.

20 og 100 hårde kapsler i Al/Al blister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4

Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4

Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2025.