

Patientkort for valproat

Delepsine, Delepsine Retard, Deprakine Retard, Orfiril, Orfiril Long, Orfiril Retard:

Hvad du skal vide og gøre

Alle piger og kvinder som bruger valproat og som kan blive gravide:

- Valproat kan skade et ufødt barn alvorligt når det tages af moderen under graviditet.
- Brug altid effektiv prævention uden afbrydelse under hele din behandling med valproat.
- Hvis du tror du er gravid: Bestil en akuttid hos din læge.

- Få en konsultation hos din læge mindst en gang om året.

Mænd der bruger valproat:

- Der er en mulig risiko for bevægelses- og mentale udviklingsforstyrrelser hos børn når valproat tages af faderen i de 3 måneder inden befrugtning.
- Diskuter denne mulige risiko og behovet for effektiv prævention med din læge.

Patientkort for valproat

Delepsine, Delepsine Retard, Deprakine Retard, Orfiril, Orfiril Long, Orfiril Retard:

Hvad du skal vide og gøre

- Valproat er en effektiv behandling mod epilepsi og bipolar lidelse.

Dette gælder for alle piger og kvinder, der bruger valproat, som kan blive gravide, og mænd der bruger valproat:

- Læs indlægssedlen grundigt inden brug.

- Stop aldrig med at tage valproat, medmindre din læge siger det, da din sygdom kan blive forværret.
- Hvis du overvejer at få et barn, må du ikke stoppe med at tage valproat eller afbryde din prævention før du har talt med din læge.
- Bed din læge om at give dig patientvejledningen.

Gem dette kort, så du altid ved hvad du skal gøre

VV-PV-0550218_V1.0_07/2024

Dette patientkort er baseret på engelsk version 5.2, jan. 2024, godkendt af Lægemiddelstyrelsen juni 2024