

Patientkort

Dette patientkort opfylder betingelserne for markedsføringstilladelsen og er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Godkendt af Lægemiddelstyrelsen 16. maj 2025

Vigtige oplysninger til patienter

Hav altid dette kort på dig for at oplyse sundhedspersonale om, at du er i behandling med ipilimumab alene.



Hvis du har nogen tegn eller symptomer, skal du straks fortælle det til din læge

MULIGE BIVIRKNINGER



MAVE OG TARM

Diarré (vandig, løs eller blød afføring), blod i afføringen eller mørkfarvet afføring, flere afføringer end normalt, smerter eller ømhed i maveregionen, kvalme, opkastning



ØJNE

Røde øjne, smerter i øjnene, synsforstyrrelser eller sløret syn



Hormon-kirtler

Hurtig hjerterytme, svedudbrud, vægtøgning eller tab, føle sig kold, hårtab, forstoppelse, dybere stemme, feber, træthed, hovedpine, svimmelhed eller besvimmelse, mere sulten eller tørstig end normalt, trang til at lade vandet, adfærdsændringer (f.eks. mindre sexlyst, irritabilitet eller glemsomhed)



Lever

Gulfarvning af øjnene eller huden (gulsot), smerter i højre side af maveregionen, mørkfarvet urin eller blødning



Lunger

Vejrtrækningsbesvær, host og brystsmerter



Nerver

Muskelsvaghed, følelsesløshed eller snurrende fornemmelse i ben, arme eller ansigt, svimmelhed, besvimmelse eller problemer med at vågne



Hud

Hududslæt med eller uden kløe, tør hud, blærer på huden og/eller afskalning af huden, mundsår, hævelse af ansigt eller lymfekirtler

ANDRE VIGTIGE BIVIRKNINGER

Alvorlige infusionsreaktioner:

- Reaktioner på at injicere ipilimumab i blodbanen kan forekomme, normalt under eller inden for 24 timer efter indgivelse af en dosis
- Fortæl det straks til din læge eller sygeplejerske, hvis du får disse symptomer under en infusion med ipilimumab: kulderystelser eller rystelser; kløe eller udslæt; rødmen; åndedrætsbesvær; svimmelhed; feber; eller en følelse af at besvime

VIGTIGT

- Fortæl din læge om tidligere sygdomme
- Tidlig behandling af bivirkninger reducerer sandsynligheden for, at ipilimumab-behandling skal stoppes midlertidigt eller permanent
- Tegn og symptomer, der kan forekomme milde, kan hurtigt forværres, hvis de ikke behandles
- **FORSØG IKKE** at behandle disse symptomer selv

- Tegn og symptomer kan være forsinkede og kan forekomme uger til måneder efter din sidste ipilimumab-injektion

For yderligere oplysninger, se indlægssedlen for ipilimumab på www.ema.europa.eu, www.indlaegsseddel.dk eller kontakt Medicinsk Information på 45 28 01 28

VIGTIGE oplysninger til sundhedspersonale

- Denne patient er i behandling med ipilimumab monoterapi
 - Immunrelaterede bivirkninger (irAR'er) kan forekomme når som helst under behandlingen eller måneder efter, at den er ophørt
 - Tidlig diagnose og korrekt behandling er væsentlig for at minimere livstruende komplikationer
 - Konsultation med en onkolog eller anden speciallæge kan være nyttig til håndtering af organspecifikke irAR'er
- Sundhedspersonale henvises til ipilimumab produktresuméet (SmPC) på www.ema.europa.eu, www.indlaegsseddel.dk eller til at ringe til Medicinsk Information på 45 28 01 28 eller e-mail medinfo.denmark@bms.com for mere information

Den sundhedsfaglige person, der behandler denne patient med ipilimumab, skal udfylde afsnittet "Min læges kontaktoplysninger" i dette Patientkort

Min læges kontaktoplysninger (lægen som udskrev ipilimumab)

Lægens navn:.....

Telefonnummer, åbningstid:.....

Telefonnummer udenfor åbningstid:.....

Mine kontaktoplysninger

Patientens navn:.....

Patientens telefonnummer:.....

Nærmeste pårørendes navn og telefonnummer (i nødstilfælde):.....