

2D CODE № 8222

- Husk at tage Eliquis regelmæssigt som anvist. Hvis du har glemt en morgendosis, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det og eventuelt tage den sammen med din aftendosis. Hvis du har glemt en aftendosis, må du kun tage den samme aften. Du må ikke tage to doser næste morgen, men skal i stedet forsætte behandlingen som normalt næste dag med en dosis to gange dagligt som anbefalet.
- Stop ikke med at tage Eliquis uden først at tale med lægen, da du har risiko for at få et slagtilfælde eller få andre komplikationer.

- Juli 2024**

Cutting

- Juli 2024

Cutting

Cutting

Non-Print Swatches:

	Profile
	Technical Info


Date: 17 Sep 2024 **Time:** 09:54
Superseded Artwork Number: 1346343A5
CMO Artwork Number: 1346343A6
CMO Drawing: AC002
BMS Template: N/A
OLV Barcode Type/Value: 2D = 8222
SITE/CMO: CATALENT ANAGNI
CMO Description: ALERT CARD ELIQUIS TAB 2.5/5MG DK/NO

Font Family: FS Joey
Body text size: 9pt
Smallest text size: 8pt (Excluding artwork code)



Perigord
LIFE SCIENCE
SOLUTIONS
A TECH MAHINDRA COMPANY

Confidentiality agreement: Artwork may not be altered in any way without express permission from MS&T Artwork



Jeg er i blodfortyndende behandling med Eliquis (apixaban) for at forebygge blodpropper

Oplysninger til sundhedspersonalet

- Eliquis (apixaban) er et oralt antiokoagulans, der virker ved direkte selektiv hæmning af faktor Xa.
- Eliquis kan øge risikoen for blødning. I tilfælde af større blødning, skal det straks seponeres.
- Behandling med Eliquis kræver ikke rutinemæssig monitorering af eksponering. En kalibreret kvantitativ test for anti-faktor Xa kan være nyttig i særlige situationer, f.eks. ved overdosering og akut kirurgi (protrombintid (PT), international normaliseret ratio (INR) og aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) frarådes) – se produktresuméet.
- Et middel til at reversere anti-faktor Xa-aktiviteten af apixaban er tilgængeligt.

Du skal udfylde disse felter eller bede din læge om at gøre det

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Indikation: _____

Dosis: _____ mg to gange dagligt

Lægens navn: _____

Lægens telefonnummer: _____



Jeg står på antikoagulasjonsbehandling med Eliquis (apiksaban) for å forebygge blodpropp.

Informasjon til helsepersonell

- Eliquis (apiksaban) er et oralt antikoagulantia som virker direkte ved selektiv hemming av faktor Xa.
- Eliquis kan øke risikoen for blødning. Dersom en alvorlig blødning oppstår, skal Eliquis seponeres umiddelbart.
- Behandling med Eliquis krever ikke rutinemessig overvåking av eksponering. En kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse kan være nyttig i helt spesielle tilfeller, f.eks. overdose og akuttkirurgi (protrombintid (PT), internasjonalt standardisert skala (INR) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) koagulasjonstester anbefales ikke) – se SPC.
- Et middel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban er tilgjengelig.

Vennligst fyll ut denne delen eller be legen om å gjøre det

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Indikasjon: _____

Dose: _____ mg to ganger daglig

Legens navn: _____

Legens telefonnummer: _____



**Bristol Myers Squibb**

MS&T Artwork: Dublin BAMS Artwork Number: PRD-002799-2 Version: 01 Trade Name: Eliquis Component: Alert Card Market(s): Denmark Norway European Union	Print Swatches: PMS Process Black PMS 1645 PMS 683	Non-Print Swatches: Profile Technical Info
--	---	--

MS&T Artwork Dublin

Date: 17 Sep 2024 Superseded Artwork Number: 1346343A5 CMO Artwork Number: 1346343A6 CMO Drawing: AC002 BMS Template: N/A OLV Barcode Type/Value: 2D = 8222 SITE/CMO: CATALENT ANAGNI CMO Description: ALERT CARD ELIQUIS TAB 2.5/5MG DK/NO	Time: 09:54
--	--------------------

Font Information

Font Family: FS Joey Body text size: 9pt Smallest text size: 8pt (Excluding artwork code)
--



Confidentiality agreement: Artwork may not be altered in any way without express permission from MS&T Artwork

