

Tresiba® (insulin degludec)

Information om den insulinstyrke, som din læge har ordineret

Hvad er Tresiba®, og hvad anvendes det til?

Tresiba® er en basalinsulin, der skal tages én gang dagligt. Tresiba® anvendes til at behandle sukkersyge (diabetes mellitus) hos voksne, unge og børn fra 1-års-alderen¹. Det hjælper kroppen med at sænke blodsukkerniveauet. Tresiba® doseres én gang dagligt. Hvis du ikke har mulighed for at tage en dosis på det sædvanlige tidspunkt, kan du ændre doseringstidspunktet. Der skal dog altid gå mindst 8 timer mellem injektionerne.

Tresiba® fås i to forskellige styrker

Tresiba® fås i to styrker: 100 E/ml og 200 E/ml. Tresiba® 200 E/ml FlexTouch® pen har dobbelt så mange insulinenheder pr. ml. Din læge vil ordinere den styrke, der passer til dig.

Begge penne har en dosistæller i dosisvinduet, som viser den nøjagtigt indstillede dosis. Det betyder, at den dosis, der vises i vinduet, er den dosis, du får, uanset hvilken styrke der er tale om. Brug altid dosistælleren til at indstille dosis. Tæl ikke antal klik. **Dosis skal ikke konverteres, hvis du skifter fra den ene styrke til den anden.** Kontrollér, hvor mange enheder der er valgt i dosisvinduet/tælleren, inden du injicerer Tresiba®.

Tresiba® 100 E/ml styrke

- 80 enheder er maks. dosis pr. injektion
- Lysegrøn
- Indeholder 300 enheder insulin i 3 ml



Tresiba® 200 E/ml styrke

- 160 enheder er maks. dosis pr. injektion
- Mørkegrøn
- Indeholder 600 enheder insulin i 3 ml



Sådan genkender du din ordinerede styrke

Det er vigtigt at være sikker på, at du bruger den korrekte styrke, – det vil sige den, som din læge har ordineret. “Tresiba® 100 E/ml” eller “Tresiba® 200 E/ml” står tydeligt angivet på pennens etiket og på pakningen.

Desuden er pakningen og etiketten til Tresiba® 100 E/ml lysegrøn, mens pakningen og etiketten til Tresiba® 200 E/ml er mørkegrøn med striber. På pakningen og etiketten til Tresiba® 200 E/ml er der også en rød boks, som tydeligt angiver, hvilken styrke der er tale om.



**Tresiba® 200 E/ml pakning
3 penne per pakning**

**Tresiba® 100 E/ml pakning
5 penne per pakning**



Hvis du er farveblind, kan du også kende Tresiba® 200 E/ml på de to fremhævede prikker på trykknappen.



Tresiba® 100 E/ml



Tresiba® 200 E/ml

Sådan undgår du forveksling

Hvis du er blind eller ser dårligt og derfor ikke kan læse tælleren i dosisvinduet på pennen, må du ikke bruge denne pen uden hjælp. Få hjælp af en person, med normalt syn, som har fået undervisning i at bruge Tresiba®.

Kontrollér altid etiketten, når du får Tresiba® udleveret på apoteket og inden hver injektion, så du undgår utilsigtet forveksling af de forskellige styrker af Tresiba® og andre insulinprodukter, som du tager.

Hvis du bruger den forkerte styrke eller det forkerte insulinprodukt, risikerer du at tage for meget eller for lidt insulin. For meget insulin kan føre til hypoglykæmi eller lavt blodsukker. Tal med din læge for at få mere information.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Følg alle instruktioner i indlægssedlen. Spørg din læge, sygeplejerske eller på apoteket, hvis du har brug for hjælp.

Hvem må ikke tage Tresiba®

- Se kontraindikationer i henhold til indlægssedlen.

Hvis du oplever bivirkninger

Bivirkninger af Tresiba®, herunder fejlmedicinering, skal indberettes til Novo Nordisk på kundeservicedanmark@novonordisk.com eller til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Referencer: 1. Tresiba® (produktresumé)