

Sikkerhedsanbefaling for patienten
Behold venligst dette kort på dig

Patient informationskort

Vigtige sikkerhedsoplysninger for akutberedskab/skadestue

Jinarc® kan forårsage leverskade. Der skal udføres leverfunktionstest (blodprøver) regelmæssigt (hver måned i de første 18 måneder, derefter hver 3. måned). Ved tegn på leverskade eller unormale stigninger i ASAT og ALAT, skal behandlingen med Jinarc® øjeblikkeligt afbrydes.

Jinarc® kan øge urinproduktionen markant, hvilket kan forårsage svær dehydrering eller et stort vandtab.

Symptomer på dehydrering kan være øget tørst, mundtørhed, træthed, mindsket urinudskillelse, hovedpine, tør hud, svimmelhed, forvirring, øget hjerterytme og nedsat elasticitet i huden.

Yderligere oplysninger på www.indlaegsseddel.dk

Patientens navn:

Dato for første ordination af Jinarc®:

Lægens navn:

Hospitalets navn:

Hospitalets telefonnummer:

Vigtige sikkerhedsoplysninger for patienter

Jinarc® kan påvirke din leverfunktion.

Søg læge, hvis du får symptomer som træthed, appetitløshed, mavesmerter, feber, mørk urin, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot), alvorlig dehydrering, kvalme, opkast, kløe eller influenzalignende syndrom (led- og muskelsmerter med feber).

Jinarc® kan forårsage alvorlig dehydrering.

Drik rigeligt med væske for at undgå dehydrering og væsketab. Søg læge, hvis du ikke er i stand til at drikke væske.